ثانوية سلمان الفارسي بنين

حيزنا يميزنا

الثاني عشر علمي

الفترة الأولى

الكيمياء

اسئلة اختبارات
وإجاباتها النموذجية

2025/2024

مدير المدرسة
أ. خالد البطي

دولة الكويت عدد الصفحات (7)

وزارة التربية

التوجيه الفني العام للعلوم

امتحان الفترة الدراسية الأولى -للعام الدراسي 2023 / 2024 م

المجال الدراسي: الكيمياء للصف الثاني عشر علمي - الزمن: ساعتان

==========

أولاً: الأسئلة الموضوعية (إجبارية) (22درجات)

السؤال الأول:

أ - ضع علامة (✓) بين القوسين أمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من الجمل التالية :(6= 1× 6)

1- عندما يقل حجم كمية معينة من الغاز إلى النصف عند ثبوت درجة الحرارة، فإنّ ضغط الغاز:

( ) يزيد إلى الضعف ( ) يقل إلى النصف

( ) لا يتغير ( ) يقل إلى الربع

2- أقل درجة حرارة يساوي فيها متوسط الطاقة الحركية لجسيمات الغاز صفراً هي:

( ) 273 °C ( ) 100K ( ) -273°C ( ) 0°C

3- الكربون (الفحم) لا يتفاعل بسرعة مع أكسجين الهواء الجوي في درجة حرارة الغرفة لأن:

( ) الأكسجين يكون في الحالة الغازية والكربون (الفحم) يكون في الحالة الصلبة

( ) غاز الأكسجين لا يتصادم مع الكربون (الفحم) الصلب

( ) كمية الأكسجين غير كافية دائماً للتفاعل

( ) التصادمات بين جزيئات الأكسجين والكربون (الفحم) غير فعالة وغير نشطة

4- إذا كانت قيمة ثابت الاتزان(K_{eq}) لتفاعل عكوس متزن تساوي($1.5X10^{-10}$) فإن هذا يدل على أنّ:

( ) عند الاتزان ، سرعة التفاعل في الاتجاه الطردي أكبر من سرعة التفاعل في الاتجاه العكسي

( ) التفاعل يسير باتجاه تكوين كميات كبيرة من المواد الناتجة

( ) موضع الاتزان يقع باتجاه تكوين المواد المتفاعلة

( ) عند الاتزان ، سرعة التفاعل في الاتجاه العكسي أكبر من سرعة التفاعل في الاتجاه الطردي

صفوة معلمي الكويت

5- الصيغة الكيميائية للحمض المرافق للماء هي :

( ) H_3O^+ ( ) OH^- ( ) H_2O ( ) O^{2-}

6- في محلول حمض النيتريك HNO_3 الذي درجة حرارته 25 °C يكون :

( ) تركيز كاتيون الهيدرونيوم H_3O^+ أكبر من 1×10^{-7} M

( ) تركيز كاتيون الهيدرونيوم H_3O^+ أقل من 1×10^{-7} M

( ) تركيز أنيون الهيدروكسيد OH^- أكبر من 1×10^{-7} M

( ) تركيز كاتيون الهيدرونيوم H_3O^+ يساوي 1×10^{-7} M

ب-اكتب كلمة (صحيحة) بين القوسين المقابلين للعبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) بين القوسين المقابلين للعبارة غير الصحيحة في كل مما يلي :(5 ×1 =5)

1- يشغل (0.25 mol) من غاز الهيدروجين في الظروف القياسية حجماً وقدره (0.25 L). [----]

2- تحدث التفاعلات الكيميائية جميعها بالسرعة نفسها عند الظروف نفسها. [----]

3- الأنزيمات مواد محفّزة حيويّة تسرّع من التفاعلات بإيجاد آلية ذات حاجز طاقة تنشيط أكبر. [----]

4- أكاسيد الفلزات القلوية تتفاعل مع الماء وتكوّن محاليل قاعدية. [----]

5- يعتبر حمض الكربونيك (H_2CO_3) حمض ثنائي البروتون. [----]

درجة السؤال الأول

11

صفوة معلمي الكويت

السؤال الثاني:

أ – اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية :(5 ×1 =5)

1- يتناسب حجم كمية معينة من الغاز تناسباً طردياً مع درجة حرارته المطلقة بالكلفن عند ثبات الضغط وكمية الغاز. [----------]

2- الضغط الناتج عن أحد مكونات خليط غازي إذا شغل حجماً مساوياً لحجم الخليط عند درجة الحرارة نفسها. [----------]

3- الذرات والأيونات والجزيئات يمكن أن تتفاعل وتكوّن نواتج عندما يصطدم بعضها ببعض ، بطاقة حركية كافية في الاتجاه الصحيح. [----------]

4- المادة التي لديها القدرة على استقبال زوج أو أكثر من الإلكترونات لتكون رابطة تساهمية. [----------]

5- القيمة السالبة للوغاريتم العشري لتركيز أنيون الهيدروكسيد OH^-. [----------]

ب - إملأ الفراغات في الجمل والمعادلات التالية بما يناسبها علمياً :(6 ×1 =6)

1- عينة من غاز الهيدروجين موضوعة في إناء حديد حجمه ثابت ، تحت ضغط (151.95 kPa) وعند درجة (303K) ،فإذا أصبح ضغطها (227.95 kPa) ، فإنّ درجة حرارتها تصبح K ----------

2- عدد الجسيمات الموجودة في (2L) من غاز الهيدروجين ----------عدد الجسيمات الموجودة في (2L) من غاز الأكسجين عند نفس الظروف من الضغط و درجة الحرارة .

3- في النظام المتزن التالي: $CO_{(g)} + 2H_{2(g)} \rightleftharpoons CH_3OH_{(g)}$

يزداد إنتاج الميثانول الناتج عند ---------- تركيز الهيدروجين .

4- قيمة ثابت الاتزان K_{eq} تتغيّر بتغيّر ----------.

5- المركبات التي تتفكك لتعطي كاتيونات الهيدروجين في المحلول المائي تعتبر---------- حسب مفهوم أرهينيوس.

6- في المحاليل المتعادلة ، تركيز كاتيون الهيدرونيوم ---------- تركيز أنيون الهيدروكسيد .

درجة السؤال الثاني _____ 11

صفوة معلمي الكويت

ثانياً: الأسئلة المقالية

المطلوب الإجابة عن ثلاثة أسئلة كاملة بجميع فروعها

السؤال الثالث:

أ – أجب عن المسألة التالية : (1 × 4 = 4)

عينة من غاز الكلور تشغل حجماً قدره (18 L) عند درجة (18°C) وتحت ضغط (101.3 kPa) .

والمطلوب:

احسب حجم هذه العينة من الغاز عند درجة (237 K) و تحت ضغط (50.65 kPa) ؟

ب– علل لما يلي تعليلاً علمياً سليماً: (4 × 1½ = 6)

1– للغازات قدرة عالية على الانتشار.

2- التفاعل $AgNO_{3(aq)} + NaCl_{(aq)} \rightarrow AgCl_{(s)} + NaNO_{3(aq)}$

لا يعتبر من التفاعلات العكوسة .

3– حمض الأسيتيك CH_3COOH يعتبر من الأحماض أحادية البروتون .

4– يسلك أنيون النيتريت (NO_2^-) كقاعدة فقط حسب نظرية برونستد – لوري.

درجة السؤال الثالث ____ 10

صفوة معلمي الكويت

السؤال الرابع:

أ- إدرس التفاعلات الكيميائية العكوسة في الجدول التالي عند 25°C ثم أكمل المطلوب: (6 = 1 × 6)

وجه المقارنة	$PCl_{5(g)} + Heat \rightleftharpoons PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)}$	$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)} + Heat$
تعبير ثابت الاتزان K_{eq}		
عند زيادة درجة الحرارة على النظام المتزن،يختل الاتزان ويسير بالاتجاه: (الطردي–العكسي)		
عند زيادة الضغط على النظام المتزن،يختل الاتزان ويسير بالاتجاه: (الطردي–العكسي)		

ب – أجب عن المسألة التالية: (4 = 1 ×4)

محلول لحمض H_2SO_4 تركيزه (0.05 M) عند 25°C:

$$H_2SO_4 \longrightarrow 2H^+ + SO_4^{-2}$$

المطلوب حساب :

1- تركيز كاتيون الهيدرونيوم في المحلول؟

2- قيمة الأس الهيدروجيني (pH) لهذا المحلول؟

3- تركيز أنيون الهيدروكسيد في المحلول؟

4- قيمة الأس الهيدروكسيدي (pOH) لهذا المحلول؟

درجة السؤال الرابع _____ 10

صفوة معلمي الكويت

السؤال الخامس:

أ – أجب عن المسألة التالية: (1 × 4 = 4)

أذيبت كمية من غاز الأمونيا في الماء وترك المحلول حتى حدث الاتزان التالي:

$$NH_{3(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons NH_4^+{}_{(aq)} + OH^-{}_{(aq)}$$

وعند الاتزان وجد أنّ تركيز أنيون الهيدروكسيد يساوي (0.002 M) , والأمونيا يساوي (0.016 M)

احسب قيمة ثابت الاتزان (K_{eq}) لهذا التفاعل.

ب- أكمل الفراغات في الجدول التالي بما يناسبها: (6 x 1 = 6)

صيغة المركب	اسم المركب
HF	
	هيدروكسيد الليثيوم
$HClO_3$	
	حمض الكبريتوز
H_3PO_4	
	هيدروكسيد الألمنيوم

درجة السؤال الخامس

10

صفوة معلمي الكويت

السؤال السادس:

أ – أجب عن المسألة التالية : $(1 \times 4 = 4)$

غاز النيتروجين N_2 الموجود في إناء حجمه (1.5 L) و تحت ضغط (96.25 kPa)

و عند درجة (0°C) ، علماً بأنّ (N = 14) (R = 8. 31)

المطلوب : احسب كتلة الغاز ؟

ب – قارن بين كل مما يلي : (6 × 1 = 6)

وجه المقارنة	الغاز المثالي	الغاز الحقيقي
احتمال الإسالة بالضغط والتبريد (يمكن – لايمكن)		
وجه المقارنة	**حمض برونستد - لوري**	**قاعدة برونستد - لوري**
من خلال التفاعل التالي: $NH_4^+{}_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+{}_{(aq)} + NH_{3(g)}$		
وجه المقارنة	**pOH = 3**	**pOH = 10**
نوع المحلول عند 25°C: (حمضي / قلوي)		

درجة السؤال السادس _____ 10

انتهت الأسئلة

صفوة معلمي الكويت

دولة الكويت عدد الصفحات (8)

وزارة التربية

التوجيه الفني العام للعلوم

امتحان الفترة الدراسية الأولى -للعام الدراسي 2022 / 2023 م

المجال الدراسي: الكيمياء للصف الثاني عشر علمي - الزمن: ساعتان

أولاً: الأسئلة الموضوعية (إجبارية) (20درجات)

السؤال الأول:

أ- ضع علامة (✓) بين القوسين أمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من الجمل التالية :(5 =1× 5)

1- عند ثبات درجة الحرارة، بزيادة الضغط الواقع على كمية معينة من الغاز إلى الضعف فإن حجمها :

( ) يزيد إلى الضعف ( ) يقل إلى النصف

( ) يزيد إلى ثلاث أضعاف ( ) يقل إلى الربع

2- الحجم الذي يشغله (0.25 mol) من غاز النيون Ne عند الظروف القياسية من الضغط ودرجة الحرارة (STP) :

( ) 22.4 L ( ) 11.2 L

( ) 5.6 L ( ) 0.25 L

3- تعمل المادة المحفّزة على :

( ) زيادة سرعة التفاعل مع استهلاك المادة المحفّزة. ( ) إيجاد آلية بديلة ذات طاقة تنشيط أكبر.

( ) تقليل سرعة التفاعل مع استهلاك المادة المحفّزة. ( ) إيجاد آلية بديلة ذات طاقة تنشيط أقل.

4- الصيغة الكيميائية للقاعدة المرافقة للماء هي :

( ) H_3O^+ ( ) OH^-

( ) H_2O ( ) O^{2-}

5- أضعف الأحماض التالية المتساوية التركيز وعند نفس درجة الحرارة :

( ) حمض الفورميك ($K_a=1.8x10^{-4}$) ( ) حمض الهيدروفلوريك ($K_a=6.7x10^{-4}$)

( ) حمض الأسيتيك ($K_a=1.8x10^{-5}$) ( ) حمض الهيدروسيانيك ($K_a=7x10^{-11}$)

صفوة تعلمي الكويت

ب-اكتب كلمة (صحيحة) بين القوسين المقابلين للعبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) بين القوسين المقابلين للعبارة غير الصحيحة في كل مما يلي :(5= 1× 5)

1- يختلف سلوك الغاز الحقيقي عن سلوك الغاز المثالي في إمكانية إسالة الحقيقي بالتبريد والضغط . [ ]

2- غبار الفحم المعلّق في هواء المناجم أخطر من كتل الفحم الكبيرة على العمّال. [ ]

3- تتغير قيمة ثابت الاتزان K_{eq} بتغيّر تركيز المواد المتفاعلة والناتجة عن التفاعل الكيميائي. [ ]

4- قواعد لويس لها القدرة على منح البروتونات عند تفاعلها مع مادة أخرى. [ ]

5- يحتوي المحلول المائي لحمض الأستيك على كاتيونات الهيدرونيوم وأنيونات الأسيتات وجزيئات الحمض نفسه. [ ]

10 درجة السؤال الأول

السؤال الثاني:

أ - اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية :(5= 1× 5)

1- عند ثبات الحجم فإن ضغط كمية معينة من الغاز يتناسب طردياً مع درجة حرارتها المطلقة. [ ]

2- الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة عند درجة الحرارة والضغط نفسيهما تحتوي على أعداد متساوية من الجسيمات . [ ]

3 – إذا حدث تغير في أحد العوامل التي تؤثر في نظام متزن ديناميكياً، يعدّل النظام نفسه إلى حالة إتزان جديدة بحيث يبطل أو يقلل من تأثير هذا التغير. [ ]

4- المركبات التي تتأين لتُعطي أنيونات الهيدروكسيد OH^- في المحلول المائي. [ ]

5- القيمة السالبة للّوغاريتم العشري لتركيز كاتيون الهيدرونيوم. [ ]

صفوة تعلمي الكويت

ب - إملأ الفراغات في الجمل والمعادلات التالية بما يناسبها علمياً :(5= 1× 5)

1- إذا سُمح للهواء بالخروج من إطار مطاطي لدراجة فإن الضغط داخله سوف ---------

2- الضغط الذي يمارسه (0.1 mol) من غاز مثالي ، (R = 8.31) محبوس في دورق حجمه (0.5 L) عند درجة حرارة 25°C يعادل ---------

3- في النظام المتزن التالي : $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$

عند تقليل حجم الوعاء، فإن ذلك يؤدي إلى إزاحة موضع الإتزان في اتجاه ---------

4- عند ذوبان هيدروكسيد الصوديوم في الماء المقطر عند (25°C) ، فإن قيمة الأس الهيدروجيني للمحلول الناتج ---------

5- يتأين حمض الفسفوريك H_3PO_4 على--------- مراحل .

درجة السؤال الثاني

10

صفوة معلمي الكويت

ثانياً: الأسئلة المقالية (إجبارية) (32 درجة)

أجب عن جميع الأسئلة التالية

السؤال الثالث:

أ- علل لما يلي تعليلاً علمياً سليماً: (3 × 1 = 3)

1- يأخذ الغاز شكل الوعاء الذي يحتويه.

2- في النظام المتزن التالي:

$$FeCl_{3(aq)} + 3KSCN_{(aq)} \rightleftharpoons Fe(SCN)_{3(aq)} + 3KCl_{(aq)}$$

أحمر دموي

يقل تركيز $Fe(SCN)_3$ (اللون الأحمر الدموي) عند إضافة المزيد من كلوريد البوتاسيوم KCl

---

3- لا يعتبر غاز الميثان CH_4 حمضاً .

ب- أكمل الجدول التالي: (5 × 1 = 5)


صيغة المركب	اسم المركب
HBr	
$Mg(OH)_2$	
	حمض البيركلوريك
	حمض الكبريتيك
H_2CO_3	

صفوة معلمي الكويت

ج – أجب عن المسألة التالية : $(1 \times 4 = 4)$

يشغل غاز عند ضغط (115 kPa) ودرجة حرارة (25°C) حجماً يساوي (1000 mL)، وعند ارتفاع درجة الحرارة إلى (125°C) يزداد ضغط الغاز إلى (605 kPa) ،

احسب حجم الغاز في ظروف تغيّر درجة الحرارة والضغط؟



درجة السؤال الثالث

12

صفوة معلمي الكويت

السؤال الرابع:

أ – اقرأ الفقرة التالية ثم أكمل المطلوب: (1 × 5 = 5)

وعاء مغلق حجمه (5L) يحتوي على الغازات التالية والتي لا تتفاعل مع بعضها البعض:

(0.5 mol) من غاز A

(0.1 mol) من غاز B

(0.6 mol) من غاز C

وذلك عند درجة حرارة (273K) ، علماً بأن (R = 8.31)

المطلوب1 : باستخدام قانون الغاز المثالي ، أكمل الجدول التالي:

الغاز	الضغط الجزئي للغاز
A	
B	
C	

المطلوب2 : أجب عن الأسئلة التالية :

في الوعاء الحاوي على الغازات الثلاثة عند ثبات الحجم ودرجة الحرارة، فإنّ الضغط الكلي P_T

أكبر من 500 kPa ، حدّد مدى صحة العبارة مع التفسير ؟

العبارة : (صحيحة – خاطئة) ----------

التفسير :

صفوة معلمي الكويت

ب – أجب عن المسألة التالية: (1 × 5 = 5)

مخبار مدرّج مغلق سعته (0.5 L) يحتوي على غازي SO_2 , O_2 ، وحدث الإتزان التالي :

$$2SO_{2\,(g)} + O_{2\,(g)} \rightleftharpoons 2SO_{3(g)}$$

وعند 25°C ، وجد أن عدد مولات المواد عند الإتزان كالآتي:

(O_2 = 0.02 mol) , (SO_2= 0.01 mol) , (SO_3= 0.04 mol)

والمطلوب:

احسب قيمة ثابت الإتزان K_{eq} ؟

درجة السؤال الرابع ــــــــ / 10

السؤال الخامس.

أ – أجب عن المسألة التالية: (1 × 5 = 5)

محلول مائي تركيز كاتيون الهيدرونيوم فيه يساوي (0.01 M) ، عند درجة حرارة 25 °C .

المطلوب:

1-احسب تركيز أنيون الهيدروكسيد في المحلول ؟

2-قيمة الأس الهيدروكسيدي للمحلول ؟

3-ما نوع المحلول؟ (حمضي – قاعدي) ----------

صفوة تعليمي الكويت

ب – قارن بين كل مما يلي : (5 × 1 = 5)

وجه المقارنة	$2HCl_{(aq)} + 2Na_{(s)} \rightarrow 2NaCl_{(aq)} + H_{2(g)}\uparrow$	$H_2O_{(l)} + CO_{2(g)} \rightleftharpoons H_2CO_{3(aq)}$
نوع التفاعل الكيميائي: (عكوس - غير عكوس)		
وجه المقارنة	$2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2SO_{3(g)}$ + حرارة	$N_{2(g)} + O_{2(g)}$ + حرارة $\rightleftharpoons 2NO_{(g)}$
عند خفض درجة الحرارة على النظام، يُزاح موضع الاتزان جهة تكوين : (النواتج - المتفاعلات)		
وجه المقارنة	$K_{eq} < 1$	$K_{eq} > 1$
التفاعل المفضّل جهة تكوين : (النواتج - المتفاعلات)		
وجه المقارنة	حمض برونستد – لوري	قاعدة برونستد – لوري
(يعطي H^+ / تستقبل H^+)		
وجه المقارنة	pH = 5	pH = 9
نوع المحلول: (حمضي – قلوي)		

درجة السؤال الخامس _____ / 10

انتهت الأسئلة

صفوة معلمي الكويت

دولة الكويت عدد الصفحات: (7)

وزارة التربية

التوجيه الفني العام للعلوم

نموذج الإجابة

امتحان الفترة الدراسية الأولى -العام الدراسي 2023 / 2024 م

المجال الدراسي: الكيمياء للصف الثاني عشر علمي - الزمن: ساعتان



أولاً: الأسئلة الموضوعية (إجبارية) (22درجات)

السؤال الأول:

أ- ضع علامة (✓) بين القوسين أمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من الجمل التالية :(6= 1× 6)

1- عندما يقل حجم كمية معينة من الغاز إلى النصف عند ثبوت درجة الحرارة، فإنّ ضغط الغاز: ص19

(✓) يزيد إلى الضعف ( ) يقل إلى النصف

( ) لا يتغير ( ) يقل إلى الربع



2- أقل درجة حرارة يساوي فيها متوسط الطاقة الحركية لجسيمات الغاز صفراً هي: ص29

( ) 273°C ( ) 100K (✓) −273°C ( ) 0°C

3- الكربون (الفحم) لا يتفاعل بسرعة مع أكسجين الهواء الجوي في درجة حرارة الغرفة لأن:ص66

( ) الأكسجين يكون في الحالة الغازية والكربون (الفحم) يكون في الحالة الصلبة

( ) غاز الأكسجين لا يتصادم مع الكربون (الفحم) الصلب

( ) كمية الأكسجين غير كافية دائماً للتفاعل

(✓) التصادمات بين جزيئات الأكسجين والكربون (الفحم) غير فعالة وغير نشطة

4- إذا كانت قيمة ثابت الاتزان(K_{eq}) لتفاعل عكوس متزن تساوي($1.5X10^{-10}$) فإن هذا يدل على أنّ:ص74

( ) عند الاتزان ، سرعة التفاعل في الاتجاه الطردي أكبر من سرعة التفاعل في الاتجاه العكسي

( ) التفاعل يسير باتجاه تكوين كميات كبيرة من المواد الناتجة

(✓) موضع الاتزان يقع باتجاه تكوين المواد المتفاعلة

( ) عند الاتزان ، سرعة التفاعل في الاتجاه العكسي أكبر من سرعة التفاعل في الاتجاه الطردي

وزارة التربية

التوجيه الفني العام للعلوم

صفوة معلمي الكويت

نموذج الإجابة

5- الصيغة الكيميائية للحمض المرافق للماء هي : ص103

H_3O^+(✓) OH^- ( ) H_2O ( ) O^{2-} ( )

6- في محلول حمض النيتريك HNO_3 الذي درجة حرارته 25°C يكون : ص114

(✓) تركيز كاتيون الهيدرونيوم H_3O^+ أكبر من 1×10^{-7} M

( ) تركيز كاتيون الهيدرونيوم H_3O^+ أقل من 1×10^{-7} M

( ) تركيز أنيون الهيدروكسيد OH^- أكبر من 1×10^{-7} M

( ) تركيز كاتيون الهيدرونيوم H_3O^+ يساوي 1×10^{-7} M

شبكة بالكويت Telegram @ykuwait_sel_home

ب-اكتب كلمة (صحيحة) بين القوسين المقابلين للعبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) بين القوسين المقابلين للعبارة غير الصحيحة في كل مما يلي :(5= 1× 5)

1- يشغل (0.25 mol) من غاز الهيدروجين في الظروف القياسية حجماً وقدره (0.25 L). ص46[خطأ]

2- تحدث التفاعلات الكيميائية جميعها بالسرعة نفسها عند الظروف نفسها. ص66 [خطأ]

3- الأنزيمات مواد محفّزة حيويّة تسرّع من التفاعلات بإيجاد آلية ذات حاجز طاقة تنشيط أكبر. ص68 [خطأ]

4- أكاسيد الفلزات القلوية تتفاعل مع الماء وتكوّن محاليل قاعدية. ص101 [صحيحة]

5- يعتبر حمض الكربونيك (H_2CO_3) حمض ثنائي البروتون. ص99 [صحيحة]

درجة السؤال الأول

11

كنترول القسم العلمي
لجنة تقدير الدرجات

صفوة معلمي الكويت

وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم

نموذج الإجابة

السؤال الثاني:

أ – اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية :(5 ×1 =5)

1- يتناسب حجم كمية معينة من الغاز تناسباً طردياً مع درجة حرارته المطلقة بالكلفن عند ثبات الضغط وكمية الغاز.ص29 [قانون تشارلز]

2- الضغط الناتج عن أحد مكونات خليط غازي إذا شغل حجماً مساوياً لحجم الخليط عند درجة الحرارة نفسها. ص50 [الضغط الجزئي]

3- الذرات والأيونات والجزيئات يمكن أن تتفاعل وتكوّن نواتج عندما يصطدم بعضها ببعض، بطاقة حركية كافية في الاتجاه الصحيح. ص64 [نظرية التصادم]

4- المادة التي لديها القدرة على استقبال زوج أو أكثر من الإلكترونات لتكوّن رابطة تساهمية. ص104 [حمض لويس]

5- القيمة السالبة للوغاريتم العشري لتركيز أنيون الهيدروكسيد OH^-. ص117 [الأس الهيدروكسيدي/pOH] أو

ب - إملأ الفراغات في الجمل والمعادلات التالية بما يناسبها علمياً :(6= 1× 6)

1- عينة من غاز الهيدروجين موضوعة في إناء حديد حجمه ثابت ، تحت ضغط (151.95 kPa) وعند درجة (303K) ،فإذا أصبح ضغطها (227.95 kPa) ، فإنّ درجة حرارتها تصبح K ---454.54--- ص32 (مراجعة التوجيه)

2- عدد الجسيمات الموجودة في (2L) من غاز الهيدروجين ---يساوي--- عدد الجسيمات الموجودة في (2L) من غاز الأكسجين عند نفس الظروف من الضغط و درجة الحرارة . ص46

3- في النظام المتزن التالي: $CO_{(g)} + 2H_{2(g)} \rightleftharpoons CH_3OH_{(g)}$

يزداد إنتاج الميثانول الناتج عند ---زيادة--- تركيز الهيدروجين . ص78

4- قيمة ثابت الاتزان K_{eq} تتغيّر بتغيّر --- درجة الحرارة فقط. ص 79

5- المركبات التي تتفكك لتعطي كاتيونات الهيدروجين في المحلول المائي تعتبر---أحماض--- حسب مفهوم أرهينيوس. ص 98

6- في المحاليل المتعادلة ، تركيز كاتيون الهيدرونيوم --- يساوي --- تركيز أنيون الهيدروكسيد. ص 114

درجة السؤال الثاني _____ 11

شبكة باكويت
Telegram @kuwait_net_home
كنترول القسم العلمي لجنة تقدير الدرجات
وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم
معلمي الكويت

نموذج الإجابة

ثانياً: الأسئلة المقالية

المطلوب الإجابة عن ثلاثة أسئلة كاملة بجميع فروعها

السؤال الثالث:

أ – أجب عن المسألة التالية : (1 × 4 = 4)

عينة من غاز الكلور تشغل حجماً قدره (18 L) عند درجة (18°C) وتحت ضغط (101.3 kPa) .

والمطلوب:

احسب حجم هذه العينة من الغاز عند درجة (237 K) و تحت ضغط (50.65 kPa) ؟ ص34

درجة $T_1 = 18 + 273 = 291\ K$

درجة ونصف $P_1V_1 / T_1 = P_2V_2 / T_2$

درجة $V_2 = P_1.V_1 .T_2 / T_1.P_2$

نصف درجة $V_2 = 101.3 \times 18 \times 237 / 291 \times 50.65$

$V_2 = 29.319\ L$

أو أي طريقة أخرى صحيحة

ب– علل لما يلي تعليلاً علمياً سليماً: (4 × 1½ = 6)

1– للغازات قدرة عالية على الانتشار. ص 15

أو

لأنه طبقا للنظرية الحركية للغازات لا توجد قوي تجاذب أو تنافر بين جسيمات الغاز و الفراغ بين جسيماتها كبير و تتحرك بحرية في جميع الاتجاهات .

2- التفاعل $AgNO_{3(aq)} + NaCl_{(aq)} \rightarrow AgCl_{(s)} + NaNO_{3(aq)}$

لا يعتبر من التفاعلات العكوسة . ص 70

أو

لأن التفاعل يحدث في اتجاه واحد حتى يكتمل بحيث لا تستطيع المواد الناتجة من التفاعل أن تتحد بعضها مع بعض لتكوين المواد المتفاعلة مرة أخرى.

3– حمض الأسيتيك CH_3COOH يعتبر من الأحماض أحادية البروتون . ص 100

لأنه يحتوي على 3 ذرات هيدروجين مرتبطة بذرة الكربون بروابط قطبية ضعيفة لذلك فهي غير قابلة للتأين ،

أو توجد ذرة هيدروجين واحدة مرتبطة بذرة الأكسجين ذات السالبية الكهربائية العالية وهي قابلة للتأين . أو معادلة تأين كيميائية

4– يسلك أنيون النيتريت (NO_2^-) كقاعدة فقط حسب نظرية برونستد – لوري. ص 102

لأن له القدرة فقط على استقبال بروتون من الماء .

أو

$NO_2^-{}_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftharpoons OH^-{}_{(aq)} + HNO_{2\,(aq)}$

درجة السؤال الثالث: 10

كنترول القسم العلمي
لجنة تقدير الدرجات

وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم

قوة معلمي الكويت

نموذج الإجابة

السؤال الرابع: ص77-80

أ- إدرس التفاعلات الكيميائية العكوسة في الجدول التالي عند 25°C ثم أكمل المطلوب: (6 × 1 = 6)

وجه المقارنة	$PCl_{5(g)} + Heat \rightleftharpoons PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)}$	$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)} + Heat$
تعبير ثابت الاتزان K_{eq}	$K_{eq}=[PCl_3].[Cl_2]/[PCl_5]$ ص74	$K_{eq}=[NH_3]^2/[N_2].[H_2]^3$ ص74
عند زيادة درجة الحرارة على النظام المتزن، يختل الاتزان ويسير بالاتجاه: (الطردي-العكسي)	الطردي ص79 أو النواتج	العكسي ص78 أو المتفاعلات
عند زيادة الضغط على النظام المتزن يختل الاتزان ويسير بالاتجاه: (الطردي-العكسي)	العكسي ص80 أو المتفاعلات	الطردي ص80 أو النواتج

ب – أجب عن المسألة التالية: (4 ×1 = 4)

محلول لحمض H_2SO_4 تركيزه (0.05 M) عند 25°C : ص115

$$H_2SO_4 \longrightarrow 2H^+ + SO_4^{-2}$$

المطلوب حساب :

1- تركيز كاتيون الهيدرونيوم في المحلول؟

$[H_3O^+] = 1 \times 0.05 = 0.05$ أو $[H_3O^+] = 2 \times 0.05 = 0.1\ M$

2- قيمة الأس الهيدروجيني (pH) لهذا المحلول؟

1.3 أو $pH = -\log [H_3O^+] = -\log [0.1] = 1$

3- تركيز أنيون الهيدروكسيد في المحلول؟

2×10^{-13} أو $[OH^-] = 1X10^{-14} / 0.1\ M = 1X10^{-13}\ M$

4- قيمة الأس الهيدروكسيدي (pOH) لهذا المحلول؟

12.7 أو $pOH = -\log [OH^-] = -\log [1X10^{-13}] = 13$ أو $pOH = 14 - pH = 13$

كنترول القسم العلمي لجنة تقدير الدرجات

درجة السؤال الرابع 10

وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم

صفوة معلمي الكويت

نموذج الإجابة

السؤال الخامس: (1 × 4 = 4)

أ – أجب عن المسألة التالية:

أذيبت كمية من غاز الأمونيا في الماء وترك المحلول حتى حدث الاتزان التالي:

$$NH_{3(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons NH_4^+{}_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

وعند الاتزان وجد أنّ تركيز أنيون الهيدروكسيد يساوي (0.002 M) , والأمونيا يساوي (0.016 M)

احسب قيمة ثابت الاتزان (K_{eq}) لهذا التفاعل. ص69-81

$[OH^-] = [NH_4^+]$ 0.002M — درجة

$K_{eq} = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]} = \frac{[0.002][0.002]}{[0.016]}$ — درجة ونصف — درجة ونصف

$K_{eq} = 0.25X10^{-3}$

أو 2.5×10^{-4}

ب- أكمل الفراغات في الجدول التالي بما يناسبها: (6 × 1 = 6)

صيغة المركب	اسم المركب
HF	حمض الهيدروفلوريك ص108
LiOH	هيدروكسيد الليثيوم ص110
$HClO_3$	حمض الكلوريك ص110
H_2SO_3	حمض الكبريتوز ص110
H_3PO_4	حمض الفسفوريك ص110
$Al(OH)_3$	هيدروكسيد الألمنيوم ص111

أو فلوريد الهيدروجين

كنترول القسم العلمي
لجنة تقدير الدرجات

درجة السؤال الخامس: ____ / 10

وزارة التربية

التوجيه الفني العام للعلوم

صفوة معلمي الكويت

نموذج الإجابة

السؤال السادس:

أ – أجب عن المسألة التالية : (1 × 4 = 4)

غاز النيتروجين N_2 الموجود في إناء حجمه (1.5 L) و تحت ضغط (96.25 kPa)
و عند درجة (0°C)، علماً بأنّ (N = 14) (R = 8. 31)

المطلوب : احسب كتلة الغاز ؟

$T = 0+273 = 273K$ درجة

$PV = nRT$ درجة

$96.52 \times 1.5 = n \times 8.31 \times 273$ درجة

$n = 0.0636$ mol

$ms = n \times Mwt$ درجة

$= 0.0636 \times 28$ درجة

$= 1.78$ g



كنترول القسم العلمي
لجنة تقدير الدرجات

ب – قارن بين كل مما يلي : (6 × 1 = 6)

وجه المقارنة	الغاز المثالي	الغاز الحقيقي
احتمال الإسالة بالضغط والتبريد (يمكن – لايمكن)	لا يمكن ص41	يمكن ص41
وجه المقارنة	حمض برونستد – لوري	قاعدة برونستد - لوري
من خلال التفاعل التالي: $NH_4^+{}_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+{}_{(aq)} + NH_{3(g)}$	NH_4^+ ص104	H_2O ص104
وجه المقارنة	pOH = 3	pOH = 10
نوع المحلول عند 25°C: (حمضي / قلوي)	قلوي ص118	حمضي ص118

درجة السؤال السادس ــــــ / 10

انتهت الأسئلة

وزارة التربية
التوجيه الفني العام للمدارس

شبكة معلمي الكويت

دولة الكويت عدد الصفحات (8)

وزارة التربية

التوجيه الفني العام للعلوم

امتحان الفترة الدراسية الأولى -للعام الدراسي 2022 / 2023 م

المجال الدراسي: الكيمياء للصف الثاني عشر علمي - الزمن: ساعتان

أولاً: الأسئلة الموضوعية (إجبارية) (20درجات)

نموذج الإجابة

السؤال الأول:

أ - ضع علامة (✓) بين القوسين أمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من الجمل التالية : (5= 1× 5)

1- عند ثبات درجة الحرارة، بزيادة الضغط الواقع على كمية معينة من الغاز إلى الضعف فإن حجمها : ص29

( ) يزيد إلى الضعف (√) يقل إلى النصف

( ) يزيد إلى ثلاث أضعاف ( ) يقل إلى الربع

2- الحجم الذي يشغله (0.25 mol) من غاز النيون Ne عند الظروف القياسية من الضغط ودرجة الحرارة (STP) : ص 47

( ) 22.4 L ( ) 11.2 L

(√) 5.6 L ( ) 0.25 L

3- تعمل المادة المحفّزة على : ص67

( ) زيادة سرعة التفاعل مع استهلاك المادة المحفّزة. ( ) إيجاد آلية بديلة ذات طاقة تنشيط أكبر.

( ) تقليل سرعة التفاعل مع استهلاك المادة المحفّزة. (√) إيجاد آلية بديلة ذات طاقة تنشيط أقل.

4- الصيغة الكيميائية للقاعدة المرافقة للماء هي : ص103

( ) H_3O^+ (√) OH^-

( ) H_2O ( ) O^{2-}

5- أضعف الأحماض التالية المتساوية التركيز وعند نفس درجة الحرارة : ص127

( ) حمض الفورميك ($K_a=1.8x10^{-4}$) ( ) حمض الهيدروفلوريك ($K_a=6.7x10^{-4}$)

( ) حمض الأسيتيك ($K_a=1.8x10^{-5}$) (√) حمض الهيدروسيانيك ($K_a=7x10^{-11}$)

وزارة التربية

التوجيه الفني العام للعلوم

موقع معلمي الكويت

ب-اكتب كلمة (صحيحة) بين القوسين المقابلين للعبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) بين القوسين المقابلين للعبارة غير الصحيحة في كل مما يلي :(5= 1× 5)

نموذج الإجابة

1- يختلف سلوك الغاز الحقيقي عن سلوك الغاز المثالي في إمكانية إسالة الحقيقي بالتبريد والضغط .ص41 [صحيحة]


2- غبار الفحم المعلّق في هواء المناجم أخطر من كتل الفحم الكبيرة على العمّال. ص67 [صحيحة]

3- تتغير قيمة ثابت الاتزان K_{eq} بتغيّر تركيز المواد المتفاعلة والناتجة عن التفاعل الكيميائي.ص80 [خطأ]

4- قواعد لويس لها القدرة على منح البروتونات عند تفاعلها مع مادة أخرى. ص104 [خطأ]

5- يحتوي المحلول المائي لحمض الأستيك على كاتيونات الهيدرونيوم وأنيونات الأسيتات وجزيئات الحمض نفسه.ص126 [صحيحة]





درجة السؤال الأول

السؤال الثاني:

أ - اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية :(5= 1× 5)

1- عند ثبات الحجم فإن ضغط كمية معينة من الغاز يتناسب طردياً مع درجة حرارتها المطلقة. ص32 [قانون جاي – لوساك]

2- الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة عند درجة الحرارة والضغط نفسيهما تحتوي على أعداد متساوية من الجسيمات . ص46 [فرضية أفوجادرو]

3 – إذا حدث تغير في أحد العوامل التي تؤثر في نظام متزن ديناميكياً، يعدّل النظام نفسه إلى حالة إتزان جديدة بحيث يبطل أو يقلل من تأثير هذا التغير. ص77 [مبدأ لوشاتليه]

4- المركبات التي تتأين لتُعطي أنيونات الهيدروكسيد OH^- في المحلول المائي. [قواعد أرهينيوس ص98]

5- القيمة السالبة للّوغاريتم العشري لتركيز كاتيون الهيدرونيوم. ص116 [الأس الهيدروجيني]

قوة معلمي الكويت

نموذج الإجـــابة

ب - إملأ الفراغات في الجمل والمعادلات التالية بما يناسبها علمياً :(5= 1× 5)

1- إذا سُمح للهواء بالخروج من إطار مطاطي لدراجة فإن الضغط داخله سوف يقل/ ينخفض ص18

2- الضغط الذي يمارسه (0.1 mol) من غاز مثالي، (R = 8.31) محبوس في دورق حجمه (0.5 L) عند درجة حرارة 25°C يعادل 495.276 kPa ص 38


3- في النظام المتزن التالي : $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$ ص79

عند تقليل حجم الوعاء، فإن ذلك يؤدي إلى إزاحة موضع الإتزان في اتجاه المواد الناتجة/ الطردي/NH_3

4- عند ذوبان هيدروكسيد الصوديوم في الماء المقطر عند (25°C) ، فإن قيمة الأس الهيدروجيني للمحلول الناتج تزداد / ترتفع ص 114

5- يتأين حمض الفسفوريك H_3PO_4 على ثلاث مراحل . ص 128





درجة السؤال الثاني





صفوة معلمي الكويت

نموذج الإجابة

ثانياً: الأسئلة المقالية (إجبارية) (32 درجة)

أجب عن جميع الأسئلة التالية

السؤال الثالث:

أ – علل لما يلي تعليلاً علمياً سليماً: (3 × 1 = 3)

1- يأخذ الغاز شكل الوعاء الذي يحتويه. ص 15

لأن لاتوجد قوى تنافر أو تجاذب بين جسيمات الغاز، وبالتالي يتحرك الغاز بحرية داخل الوعاء الذي يشغله وينتشر.

2- في النظام المتزن التالي:

$$FeCl_{3(aq)} + 3KSCN_{(aq)} \rightleftharpoons Fe(SCN)_{3(aq)} + 3KCl_{(aq)}$$

أحمر دموي

يقل تركيز $Fe(SCN)_3$ (اللون الأحمر الدموي) عند إضافة المزيد من كلوريد البوتاسيوم KCl ص 78

لأنه بزيادة تركيز كلوريد البوتاسيوم KCl سيختل موضع الإتزان وسيتجه التفاعل إلى تعديل موضع إتزانه حسب مبدأ لوشاتلييه إلى الإتجاه الذي يقلل تركيز هذه المادة أي يتجه التفاعل بالإتجاه العكسي أي إتجاه تكوين المتفاعلات فتقل شدة اللون الأحمر .

3- لا يعتبر غاز الميثان CH_4 حمضاً . ص 99

لأن ذرات الهيدروجين الأربع في مركب الميثان مرتبطة بذرة الكربون بروابط قطبية ضعيفة، وبالتالي لا يحتوي الميثان على ذرات هيدروجين قابلة للتأين.

ب- أكمل الجدول التالي: (5 × 1 = 5)

صيغة المركب	اسم المركب	
HBr	حمض الهيدروبروميك	ص108
$Mg(OH)_2$	هيدروكسيد المغنيسيوم	ص100
$HClO_4$	حمض البيركلوريك	ص110
H_2SO_4	حمض الكبريتيك	ص110
H_2CO_3	حمض الكربونيك	ص 110

وزارة التربية
الموجه الفني العام للعلوم
معلمي الكويت

نموذج الإجـابة

ج – أجب عن المسألة التالية : $(1 \times 4 = 4)$

يشغل غاز عند ضغط (115 kPa) ودرجة حرارة (25°C) حجماً يساوي (1000mL)، وعند ارتفاع درجة الحرارة إلى (125°C) يزداد ضغط الغاز إلى (605 kPa) ،
احسب حجم الغاز في ظروف تغيّر درجة الحرارة والضغط ؟

ص38

$T_1 = 25 + 273 = 298\ K$ ½ درجة

$T_2 = 125 + 273 = 398\ K$ ½ درجة

$V = 1000/1000 = 1L$ ½ درجة

$P_1V_1 / T_1 = P_2V_2 / T_2$ درجة ونصف

$V_2 = P_1 . V_1 . T_2 / P_2 . T_1$

$V_2 = 115 \times 1 \times 398 / 605 \times 298$ درجة

$V_2 = 0.25\ L$

درجة السؤال الثالث

12

وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم
صفوة معلمي الكويت

امتحان الفترة الدراسية الأولى – الكيمياء للصف الثاني عشر علمي- العام الدراسي 2022-2023م

نموذج الإجـابة

السؤال الرابع:

أ – اقرأ الفقرة التالية ثم أكمل المطلوب: **(5 = 5 × 1)**

وعاء مغلق حجمه (5L) يحتوي على الغازات التالية والتي لا تتفاعل مع بعضها البعض:

(0.5 mol) من غاز A

(0.1 mol) من غاز B

(0.6 mol) من غاز C

وذلك عند درجة حرارة (273K) ، علماً بأن (R = 8.31) ص45

المطلوب1 : باستخدام قانون الغاز المثالي ، أكمل الجدول التالي. 3 درجات

الغاز	الضغط الجزئي للغاز
A	P=nRT/V=0.5x8.31x273/5=226.8kPa
B	P=nRT/V=0.1x8.31x273/5=45.37kPa
C	P=nRT/V=0.6x8.31x273/5=272.2kPa



المطلوب2 : أجب عن الأسئلة التالية :

في الوعاء الحاوي على الغازات الثلاثة عند ثبات الحجم ودرجة الحرارة، فإنّ الضغط الكلي P_T أكبر من 500 kPa ، حدّد مدى صحة العبارة مع التفسير ؟ ص49

العبارة : (صحيحة – خاطئة) صحيحة درجة

التفسير : في الوعاء المغلق غازات لا تتفاعل مع بعضها البعض و كل غاز يمارس ضغطاً خاصاً به ومستقلاً عن الضغط الذي تمارسه الغازات الأخرى والضغط داخل الوعاء يساوي مجموع الضغوط الجزئية لكل غاز حسب قانون دالتون للضغوط الجزئية حيث:

$P_T = P_A + P_B + P_C$ درجة ص50



صفوة معلمي الأردن

ب – أجب عن المسألة التالية: (1 × 5 = 5)

مخبار مدرّج مغلق سعته (0.5 L) يحتوي على غازي SO_2 , O_2 ، وحدث الإتزان التالي :

نموذج الإجابة

$$2SO_{2\,(g)} + O_{2\,(g)} \rightleftharpoons 2SO_{3(g)}$$

وعند 25°C ، وجد أن عدد مولات المواد عند الإتزان كالآتي:

$(O_2 = 0.02 \text{ mol})$, $(SO_2 = 0.01 \text{ mol})$, $(SO_3 = 0.04 \text{ mol})$

والمطلوب: ص74

احسب قيمة ثابت الإتزان K_{eq} ؟

$$[SO_3] = 0.04/0.5 = 0.08 \text{ mol/L}$$

$$[SO_2] = 0.01/0.5 = 0.02 \text{ mol/L}$$

$$[O_2] = 0.02 / 0.5 = 0.04 \text{ mol/L}$$

$$K_{eq} = [SO_3]^2 / [SO_2]^2 \times [O_2]$$

$$K_{eq} = (0.08)^2 / (0.02)^2 \times (0.04)$$

$$K_{eq} = 400$$



درجة السؤال الرابع

10

السؤال الخامس:

أ – أجب عن المسألة التالية: (1 × 5 = 5)

محلول مائي تركيز كاتيون الهيدرونيوم فيه يساوي (0.01 M) ، عند درجة حرارة 25 °C .

المطلوب:

1-احسب تركيز أنيون الهيدروكسيد في المحلول ؟ ص115

$Kw = [H^+] . [OH^-]$ درجتين

$$1x10^{-14} = 0.01 \cdot [OH^-]$$

$$[OH^-] = 1x10^{-14} / 0.01 = 1x10^{-12} \text{ M}$$

2-قيمة الأس الهيدروكسيدي للمحلول ؟

$pOH = -\log[OH^-]$ درجتين

$= 12$

3-ما نوع المحلول؟ (حمضي – قاعدي) درجة



صفوة معلمي الكويت

ب – قارن بين كل مما يلي : **نموذج الإجـابة** **(5 × 1 = 5)**

وجه المقارنة	$2HCl_{(aq)} + 2Na_{(s)} \rightarrow 2NaCl_{(aq)} + H_{2(g)}\uparrow$	$H_2O_{(l)} + CO_{2(g)} \rightleftharpoons H_2CO_{3(aq)}$
نوع التفاعل الكيميائي: (عكوس - غير عكوس)	غير عكوس، ص70	عكوس، ص72
وجه المقارنة	$2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2SO_{3(g)}$ + حرارة	$N_{2(g)} + O_{2(g)}$ + حرارة $\rightleftharpoons 2NO_{(g)}$
عند خفض درجة الحرارة على النظام، يُزاح موضع الاتزان جهة تكوين : (النواتج - المتفاعلات)	النواتج ص78	المتفاعلات ص79
وجه المقارنة	$K_{eq} < 1$	$K_{eq} > 1$
التفاعل المفضّل جهة تكوين : (النواتج - المتفاعلات)	المتفاعلات ص74	النواتج ص74
وجه المقارنة	حمض برونستد – لوري	قاعدة برونستد – لوري
(يعطي H^+ / تستقبل H^+)	يعطي H^+ ص105	تستقبل H^+ ص105
وجه المقارنة	pH = 5	pH = 9
نوع المحلول: (حمضي – قلوي)	حمضي ص116	قلوي ص116

درجة السؤال الخامس ــــــ 10

انتهت الأسئلة

وزارة التربية
الموجه الفني العام للعلوم

معلمي الكويت

دولة الكويت **عدد الصفحات (7)**

وزارة التربية

التوجيه الفني العام للعلوم

امتحان الفترة الدراسية الأولى -للعام الدراسي 2021 / 2022 م

المجال الدراسي: الكيمياء للصف الثاني عشر علمي - الزمن: ساعتان

أولاً: الأسئلة الموضوعية(إجبارية) (20درجات)

السؤال الأول:

أ - ضع علامة (✓) بين القوسين أمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من الجمل التالية: (5 × 1= 5)

1- كمية معينة من غاز حجمها يساوي V وضغطها يساوي P ، فإذا تمّ مضاعفة الضغط إلى أن أصبح 4P عند ثبوت درجة الحرارة ، فإن حجمها يصبح:

( ) 4V ( ) ½V ( ) ¼V ( ) 3V

2- إحدى التغيرات التالية لا تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي.

( ) زيادة درجة الحرارة. ( ) زيادة تركيز المواد المتفاعلة.

( ) زيادة حجم الجسيمات المتفاعلة. ( ) إضافة المادة المحفزة .

3- في التفاعل المتزن التالي : $PCl_{5(g)} \rightleftharpoons PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)}$

فإن زيادة الضغط على النظام يؤدي إلى :

( ) إزاحة الإتزان نحو تكوين النواتج. ( ) لا يتأثر النظام بزيادة الضغط.

( ) إزاحة الإتزان نحو تكوين المتفاعلات . ( ) تتغير قيمة ثابت الإتزان K_{eq} .

4- إحدى المركبات التالية يمكن إعتبارها حمضاً حسب نظرية أرهينيوس:

( ) NH_3 ( ) CH_4 ( ) NaOH ( ) HCl

5- تركيز كاتيون الهيدرونيوم [H_3O^+] في المحلول المائي لحمض الأسيتيك عند (25°C) :

( ) يساوي تركيز انيون الهيدروكسيد ( ) أكبر من $1X10^{-7}$

( ) أقل من $1X10^{-7}$ ( ) أقل من تركيز انيون الهيدروكسيد

صفوة معلمي الكويت

ب - أملأ الفراغات في الجمل والمعادلات التالية بما يناسبها علمياً : (5 =1 × 5)

1 – عينة من غاز موضوعة في إناء عند درجة (-50 °C) فإنّ درجة حرارتها المطلقة تساوي ---------

2–عينة من غاز الهيدروجين حجمها (5L) وضغطها (101.3 kPa.) ودرجة حرارتها (300K) ، فإذا أصبح ضغطها (202.6 kPa) ، ودرجة حرارتها (327K) فإن حجمها سيكون مساوياً ----------

3– في النظام المتزن التالي:

$$C_{(s)} + CO_{2\,(g)} \rightleftharpoons 2CO_{(g)}$$

يعبر عن ثابت الإتزان للتفاعل السابق بالعلاقة : K_{eq}= ----------

4–حسب نظرية التصادم ، فإنّ الجسيمات التي تفتقر إلى طاقة حركية كافية والإندفاع بالإتجاه الصحيح فإنه -------- تفاعل بينها .

5– ---------- $+ H_3O^+_{(aq)} \rightleftharpoons H_2O_{(l)} + HPO_4^{2-}{}_{(aq)}$

درجة السؤال الثاني

10

صفوة معلمي الكويت

ثانياً: الأسئلة المقالية (إجبارية) (36 درجة)

أجب عن جميع الأسئلة التالية

السؤال الثالث:

أ- علل لما يلي تعليلاً علمياً سليماً: (3 × 2 = 6)

1-تستخدم الغازات في الوسائد الهوائية التي تعمل على حماية الركاب في السيارات؟

2- سرعة تفاعل الكربون مع الأكسجين عند درجة حرارة الغرفة تساوي صفراً؟

3- التفاعل التالي:

$$CH_3COOH_{(\ell)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftharpoons CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

من التفاعلات العكوسة المتجانسة .

صفوة معلمي الكويت

ب – أجب عن المسألة التالية : $(1 \times 3 = 3)$

عينة من غاز الهيليوم تشغل حجماً قدره (410 L) عند درجة (27C°) و تحت ضغط (91kPa)

والمطلوب:

أ – حساب عدد مولات الهيليوم في هذه العينة (R=8.31):

ب – حساب حجم الهيليوم إذا أصبح الضغط (60.78 kPa) عند ثبوت درجة الحرارة:

ج – أجب عن المسألة التالية: $(1 \times 3 = 3)$

أدخل مزيج من (H_2 , NO) في وعاء سعته (2L) وعند درجة حرارة معينة حدث الاتزان التالي:

$$2NO_{(g)} + 2H_{2(g)} \rightleftharpoons N_{2(g)} + 2H_2O_{(g)}$$

وعند الاتزان وجد أن المخلوط يحتوي على (0.02mol) من غاز (H_2) ، (0.02mol) من غاز (NO) ، (0.15 mol) من غاز (N_2) ، (0.3 mol) من بخار الماء .

احسب قيمة ثابت الأتزان K_{eq} ؟

درجة السؤال الثالث

12

صفوة معلمي الكويت

السؤال الرابع:

أ – ماذا يحدث في الحالات التالية ؟ (4 × 2 = 8)

1-لحجم عينة من غاز الأكسجين كان حجمها 10L عند درجة حرارة 300 K وذلك عند رفع درجة الحرارة إلى 600 K عندما يكون الضغط ثابتاً .

الحدث : ----------

السبب : ----------

2- لتوهج رقاقة خشبية عند وضعها في مخبار مملوء بغاز الأكسجين.

الحدث : ----------

السبب : ----------

3- لموضع الاتزان في النظام المتزن التالي عند زيادة تركيز $H_2CO_{3\,(aq)}$

$$H_2CO_{3\,(aq)} \rightleftharpoons CO_{2(g)} + H_2O_{(\ell)}$$

الحدث : ----------

السبب : ----------

4-لقيمة تركيز كاتيون الهيدرونيوم عند إضافة حمض للماء المقطر.

الحدث : ----------

السبب : ----------

ب- أجب عن المسألة التالية: (4 ×1 = 4)

احسب تركيز كل من أنيون الهيدروكسيد و كاتيون الهيدروجين و قيمة الأس الهيدروجيني pH عند درجة 25°C في محلول تركيزه (0.01M) من هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) .

درجة السؤال الرابع _____

12

صفوة معلمي الكويت

السؤال الخامس:

أ- قارن بين كل مما يلي : (4 × 2 = 8)

وجة المقارنة	قانون جاي- لوساك	القانون الموحد للغازات
المعادلة الرياضية		
وجة المقارنة	تفاعل طارد للحرارة	تفاعل ماص للحرارة
يزاح موضع الاتزان عند زيادة درجة الحرارة ناحية (المتفاعلات- النواتج)		
وجة المقارنة	$K_{eq}=2.1$	$K_{eq}=0.8$
موضع الاتزان في التفاعلات العكوسة يقع ناحية التفاعل (الطردي _ العكسي)		
وجة المقارنة	$K_a=2.1 \times 10^{-12}$	$K_a=1.1 \times 10^{-14}$
درجة تأين الحمض (أكبر – أقل)		

ب-أكمل الجدول التالي : (4 × 1 = 4)

صيغة المركب	اسم المركب
H_2SO_3	
	حمض النيتريك
$Fe(OH)_2$	
	هيدروكسيد الليثيوم

درجة السؤال الخامس _____ 12

انتهت الأسئلة

صفوة معلمي الكويت

دولة الكويت عدد الصفحات (7)

وزارة التربية

التوجيه الفني العام للعلوم

امتحان الفترة الدراسية الأولى -للعام الدراسي 2021 / 2022 م

المجال الدراسي: الكيمياء للصف الثاني عشر علمي - الزمن: ساعتان

أولاً: الأسئلة الموضوعية (إجبارية) (20درجات)

نموذج الإجابة

السؤال الأول:

أ - ضع علامة (✓) بين القوسين إمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من الجمل التالية: (5 × 1 =5)

1- كمية معينة من غاز حجمها يساوي V وضغطها يساوي P ، فإذا تمّ مضاعفة الضغط إلى أن أصبح 4P عند ثبوت درجة الحرارة ، فإن حجمها يصبح: ص25

( ) 4V ( ) ½V (√) ¼V ( ) 3V

2- إحدى التغيرات التالية لا تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي. ص67

( ) زيادة درجة الحرارة. ( ) زيادة تركيز المواد المتفاعلة.

(√) زيادة حجم الجسيمات المتفاعلة. ( ) إضافة المادة المحفزة .

3- في التفاعل المتزن التالي : $PCl_{5(g)} \rightleftharpoons PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)}$

فإن زيادة الضغط على النظام يؤدي إلى : ص79

( ) إزاحة الإتزان نحو تكوين النواتج. ( ) لا يتأثر النظام بزيادة الضغط.

(√) إزاحة الإتزان نحو تكوين المتفاعلات . ( ) تتغير قيمة ثابت الإتزان K_{eq}.

4- إحدى المركبات التالية يمكن إعتبارها حمضاً حسب نظرية أرهينيوس: ص98

( ) NH_3 ( ) CH_4 ( ) NaOH (√) HCl

5- تركيز كاتيون الهيدرونيوم [H_3O^+] في المحلول المائي لحمض الأسيتيك عند (25C°) : ص114

( ) يساوي تركيز انيون الهيدروكسيد (√) أكبر من $1X10^{-7}$

( ) أقل من $1X10^{-7}$ ( ) أقل من تركيز انيون الهيدروكسيد

وزارة التربية – قطاع الشؤون التعليمية والمناهج – الإدارة العامة لشؤون التعليم الثانوي – التوجيه الفني العام للمواد الدراسية
صفوة علمي الكويت

نموذج الإجابة

ب-اكتب كلمة (صحيحة) بين القوسين المقابلين للعبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) بين القوسين المقابلين للعبارة غير الصحيحة في كل مما يلي : (5 × 1 =5)

1 – يتناسب حجم كمية معينة من الغاز تناسباً طردياً مع الضغط الواقع عليها عند ثبوت درجة الحرارة.[خطأ] ص24

2– في النظام المتزن التالي:

$$FeCl_{3(aq)} + 3KCNS_{(aq)} \rightleftharpoons Fe(CNS)_{3(aq)} + 3KCl_{(aq)}$$

أحمر

تزداد شدة اللون الأحمر عند زيادة تركيز KCNS أو $FeCl_3$. ص78 [صحيحة]

3–عندما تصل التفاعلات العكوسة إلى حالة الاتزان الكيميائي الديناميكي ، فإنّ تركيزات المواد المتفاعلة و تركيزات المواد الناتجة تثبت . ص72 [صحيحة]

4– قاعدة أرهينيوس هي المادة التي لها القدرة على استقبال كاتيون الهيدروجين (H^+) ص98 [خطأ]

5– الحمض المرافق لأنيون الهيدروكسيد (OH^-) هو (H_2O) ص103 [صحيحة]

10

درجة السؤال الأول

السؤال الثاني:

أ – اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية : (5 =1 ×5)

1– عند ثبات الحجم، فإنّ ضغط كمية معينة من الغاز يتناسب طردياً مع درجة حرارتها المطلقة.
ص32 [قانون جاي-لوساك]

2– مادة تزيد من سرعة التفاعل من دون استهلاكها ، إذ يمكن بعد توقف التفاعل إستعادتها من المزيج المتفاعل من دون أن تتعرض لتغير كيميائي. ص67 [المادة المحفزة]

3– تفاعلات لا تستمر في إتجاه واحد حتى تكتمل ، بحيث لا تستهلك المواد المتفاعلة تماما لتكوين النواتج ، فالمواد الناتجة تتحد مع بعضها البعض لتعطي المواد المتفاعلة مرة أخرى تحت ظروف التجربة نفسها.
ص71 [التفاعلات العكوسة]

4–المادة (الجزئ أو أيون) التي تعطي كاتيون الهيدروجين H^+ (بروتون) في المحلول.
ص102 [حمض برونستد- لوري]

5– حاصل ضرب تركيزي كاتيون الهيدرونيوم و أنيون الهيدروكسيد في الماء .
ص114 [ثابت تأين الماء، Kw]

نموذج الإجـابة

ب - أملأ الفراغات في الجمل والمعادلات التالية بما يناسبها علميا : (5 =1 × 5)

1 – عينة من غاز موضوعة في إناء عند درجة (−50°C) فإنّ درجة حرارتها المطلقة تساوي 223 K ص29

2–عينة من غاز الهيدروجين حجمها (5L) وضغطها (101.3 kPa.) ودرجة حرارتها (300K) ، فإذا أصبح ضغطها (202.6 kPa) ، ودرجة حرارتها (327K) فإن حجمها سيكون مساوياً 2.725L ص 34

3- في النظام المتزن التالي: ص75

$$C_{(s)} + CO_{2\,(g)} \rightleftharpoons 2CO_{(g)}$$

يعبر عن ثابت الإتزان للتفاعل السابق بالعلاقة : $K_{eq} = [CO]^2 / [CO_2]$

4- حسب نظرية التصادم ، فإنّ الجسيمات التي تفتقر إلى طاقة حركية كافية والإندفاع بالإتجاه الصحيح فإنه لايحدث تفاعل بينها . ص 64

5- $HPO_4^{2-}{}_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + PO_4^{3-}{}_{(aq)}$ ص128

10 درجة السؤال الثاني

وزارة التربية
التوجيه الفني للعلوم العامة
التوجيه الفني للمواد الدراسية

صفوة معلمي الكويت

نموذج الإجابة

ثانياً: الأسئلة المقالية (إجبارية) (36 درجة)

أجب عن جميع الأسئلة التالية

السؤال الثالث:

أ- علل لما يلي تعليلاً علمياً سليماً: (3 × 2 = 6)

1- تستخدم الغازات في الوسائد الهوائية التي تعمل على حماية الركاب في السيارات؟ ص15

توجد بين جسيمات الغازات مسافات بينية أي متباعدة بعضها عن بعض بدرجة كبيرة ، وعند حدوث تصادم للسيارة تمتص الوسادة الهوائية الطاقة الناتجة عن التصادم وعندها تضطر جسيمات الغاز إلى الإقتراب بعضها من بعض.

2- سرعة تفاعل الكربون مع الأكسجين عند درجة حرارة الغرفة تساوي صفراً؟ ص65

لان هذا التفاعل يحتاج طاقة تنشيط كبيرة وعند درجة حرارة الغرفة لا تكون التصادمات بين جسيمات الأكسجين وذرات الكربون فعالة ومؤثرة بدرجة كافية لكسر الروابط بين ذرات الأوكسجين
(O=O) وبين ذرات الكربون (C–C) ولا يوجد جسيمات ذات طاقة حركية كافية لتخطي حاجز طاقة التنشيط عند إصطدامها.

3- التفاعل التالي: ص71

$$CH_3COOH_{(l)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

من التفاعلات العكوسة المتجانسة .

لأن المواد الناتجة من التفاعل تستطيع أن تتحد مع بعضها لتكوين المواد المتفاعلة مرة أخرى تحت نفس ظروف التجربة ولأن المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل في حالة واحدة من حالات المادة.

وزارة التربية قطاع التوجيه الفني
الموجه الفني العام للمواد الدراسية
وزارة التربية قطاع التوجيه الفني العام
الموجه الفني العام للمواد الدراسية
صفوة معلمي الكويت

نموذج الإجـابة

ب – أجب عن المسألة التالية : (3 = 3 × 1)

عينة من غاز الهيليوم تشغل حجماً قدره (410 L) عند درجة (27C°) و تحت ضغط (91kPa)

والمطلوب: ص37-40

أ – حساب عدد مولات الهيليوم في هذه العينة (R=8.31):

$P \times V = n \times R \times T$ 1درجة

$91 \times 410 = n \times 8.31 \times 300$

$n = 14.965\ mol$ ½درجة

ب – حساب حجم الهيليوم إذا أصبح الضغط (60.78 kPa) عند ثبوت درجة الحرارة:

$P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2$ 1درجة

$91 \times 410 = 60.78 \times V$

$V_2 = 613.85\ L$ ½درجة

ج – أجب عن المسألة التالية: ص75 (3 = 3 × 1)

أدخل مزيج من (H_2 , NO) في وعاء سعته (2L) وعند درجة حرارة معينة حدث الاتزان التالي:

$$2NO_{(g)} + 2H_{2(g)} \rightleftharpoons N_{2(g)} + 2H_2O_{(g)}$$

وعند الاتزان وجد أن المخلوط يحتوي على (0.02mol) من غاز (H_2) ، (0.02mol) من غاز (NO) ، (0.15 mol) من غاز (N_2) ، (0.3 mol) من بخار الماء .

احسب قيمة ثابت الأتزان K_{eq} ؟

$[NO] = [H_2] = n / VL = 0.02 / 2 = 0.01\ M$ ½درجة

$[N_2] = 0.15 / 2 = 0.075\ M$ ½درجة

$[H_2O] = 0.3 / 2 = 0.15\ M$ ½درجة

$K_{eq} = [N_2][H_2O]^2 / [NO]^2[H_2]^2$ 1درجة

$= (0.075)(0.15)^2 / (0.01)^2(0.01)^2 = 168.750$ ½درجة

درجة السؤال الثالث

12

الموجه الفني للمواد الدراسية

صفوة علمي الكويت

وزارة التربية
قطاع التعليم العام
الإدارة العامة لمنطقة الأحمدي التعليمية
الواجبة الفنية للمواد الدراسية

السؤال الرابع:

أ – ماذا يحدث في الحالات التالية ؟ (4 × 2 = 8)

1–لحجم عينة من غاز الأكسجين كان حجمها 10L عند درجة حرارة 300 K وذلك عند رفع درجة الحرارة إلى 600 K عندما يكون الضغط ثابتاً . ص 28

الحدث : يزداد الحجم – يتضاعف الحجم – يصبح الحجم 20L .

السبب : عند ثبوت الضغط يتناسب كمية معينة من الغاز تناسباً طردياً مع درجة حرارته المطلقة أو الصيغة الرياضية لقانون تشارلز .

2–لتوهج رقاقة خشبية عند وضعها في مخبار مملوء بغاز الأكسجين. ص66

الحدث : يزداد توهج الرقاقة الخشبية .

السبب : لزيادة تركيز غاز الأكسجين فتزداد عدد التصادمات فتزداد سرعة تفاعل الإحتراق.

3– لموضع الاتزان في النظام المتزن التالي عند زيادة تركيز $H_2CO_{3\,(aq)}$ ص78

$$H_2CO_{3\,(aq)} \rightleftharpoons CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$$

الحدث : يزاح موضع الاتزان في اتجاه تكوين المواد الناتجة أي في الا تجاه الطردي.

السبب : لأن زيادة تركيز أحد المتفاعلات تجعل موضع الاتزان يزاح ناحية تقليله طبقا لمبدأ لوشاتلييه أي ناحية المواد الناتجة – اتجاه طردي.

4–لقيمة تركيز كاتيون الهيدرونيوم عند إضافة حمض للماء المقطر. ص114

الحدث: يزداد تركيز كاتيون الهيدرونيوم

السبب: تأين الحمض في الماء وإضافة مزيد من كاتيونات الهيدروجين H^+ .

ب – أجب عن المسألة التالية: (1 ×4 = 4)

احسب تركيز كل من أنيون الهيدروكسيد و كاتيون الهيدروجين وقيمة الأس الهيدروجيني pH عند درجة 25°C في محلول تركيزه (0.01M) من هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) . ص116–120

هيدروكسيد الصوديوم قاعدة قوية أحادية الهيدروكسيد تامة التأين لذلك يكون تركيز أنيون الهيدروكسيد مساوياً لتركيز القاعدة :

$[OH^-] = 0.01\ M$ درجة

$0.01 \times [H^+] = 1 \times 10^{-14}$, $K_w = [OH^-][H^+] = 1 \times 10^{-14}$ 1½درجة

$\therefore [H^+] = 1 \times 10^{-12}\ M$ ½ درجة

$pH = -\log [H^+] = -\log 1 \times 10^{-12} = 12$ درجة

درجة السؤال الرابع 12

صفوة تعلمي الكويت

السؤال الخامس: **نموذج الإجـابة**

أ – قارن بين كل مما يلي : (4 × 2 = 8)

وجه المقارنة	قانون جاي- لوساك	القانون الموحد للغازات
المعادلة الرياضية	$P/T=k$ ص32 $P_1/T_1=P_2/T_2$	$PV/T=k$ ص34 $P_1V_1/T_1=P_2V_2/T_2$
وجه المقارنة	**تفاعل طارد للحرارة**	**تفاعل ماص للحرارة**
يزاح موضع الاتزان عند زيادة درجة الحرارة ناحية (المتفاعلات- النواتج)	المتفاعلات	النواتج ص78-79
وجه المقارنة	$K_{eq}=2.1$	$K_{eq}=0.8$
موضع الاتزان في التفاعلات العكوسة يقع ناحية التفاعل (الطردي ـ العكسي)	الطردي	العكسي ص74
وجه المقارنة	$K_a=2.1 \times 10^{-12}$	$K_a=1.1 \times 10^{-14}$
درجة تأين الحمض (أكبر – أقل)	أكبر	أقل ص127

ب–أكمل الجدول التالي : (4 × 1 = 4)

صيغة المركب	اسم المركب
H_2SO_3	حمض الكبريتوز ص110
HNO_3 ص110	حمض النيتريك
$Fe(OH)_2$	هيدروكسيد الحديدΠ ص110
LiOH ص110	هيدروكسيد الليثيوم

وزارة التربية
قطاع التعليم العام
التوجيه الفني للمواد الدراسية

درجة السؤال الخامس ____ 12

انتهت الأسئلة

وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم

صفوة معلمي الكويت

دولة الكويت (عدد الصفحات : 9)

وزارة التربية

التوجيه الفني العام للعلوم

امتحان الفترة الدراسية الأولى – العام الدراسي 2019-2020 م

المجال الدراسي: الكيمياء للصف الثاني عشر العلمي –الزمن: ساعتان

أولاً: الأسئلة الموضوعية

السؤال الأول:

(أ) اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية: (6 x½=3)

1. درجة الحرارة التي عندها يكون متوسط الطاقة الحركية لجسيمات الغاز يساوي صفراً نظرياً.
( )

2. الحجم الذي يشغله المول الواحد من الغاز عند الظروف القياسية من الضغط ودرجة الحرارة يساوي (22.4 L).
( )

3. مادة تزيد من سرعة التفاعل دون استهلاكها، إذ يمكن بعد توقف التفاعل استعادتها من المزيج المتفاعل من دون أن تتعرض لتغير كيميائي. ( )

4. النسبة بين حاصل ضرب تركيز المواد الناتجة من التفاعل إلى حاصل ضرب تركيز المواد المتفاعلة كل مرفوع إلى أس يساوي عدد المولات في المعادلة الكيميائية الموزونة. ( )

5. الجزء المتبقي من الحمض بعد فقد البروتون H^+ ( )

6. أحماض تحتوي على ثلاثة عناصر منها الأكسجين . ( )


صفوة معلمي الكويت

تابع / السؤال الأول :

(ب) املأ الفراغات في الجمل التالية بما يناسبها علمياً : **(7x1=7)**

1. عند ارتفاع درجة حرارة كمية من الغاز فإن التصادم المستمر بين الجسيمات وجدار الإناء .....

2. الشكل المقابل يمثل الرسم البياني لأحد قوانين الغازات هو .....



3. غبار الفحم ..... نشاطاً من كتل الفحم الكبيرة.

4. إذا كان التعبير عن ثابت الاتزان لأحد التفاعلات الغازية هو $K_{eq}=\frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]}$ فتكون معادلة التفاعل الكيميائي هي .....

5. في التفاعلات العكوسة الماصة للحرارة تقل قيمة ثابت الاتزان عند ..... درجة الحرارة.

مدى الدليل	8	9.6
لون الحالة	أصفر	أزرق

6. مدى دليل الثايمول الأزرق القاعدي موضح في الجدول فعند إضافة قطرات منه إلى (100 mL) من الماء المقطر فإن المحلول يتلون باللون .....

7. تزداد قوة الحمض كلما كانت قيمة pKa له .....

درجة السؤال الأول

10

صفوة معلمي الكويت

السؤال الثاني :

(أ) اكتب كلمة (صحيحة) بين القوسين المقابلين للعبارة الصحيحة و كلمة (خطأ) بين القوسين المقابلين للعبارة الخطأ في كل مما يلي: **(6 x½ =3)**

1. من فرضيات النظرية الحركية أن الغازات تتميز بقوى تجاذب عالية بين جسيماتها. ( )

2. عند رفع درجة الحرارة المطلقة لغاز مثالي إلى الضعف فإن حجمه يقل إلى النصف عند ثبوت الضغط. ( )

3. تقاس سرعة التفاعل الكيميائي بكمية المتفاعلات التي يحدث لها التغيير في خلال وحدة الزمن. ( )

4. التفاعل التالي: $N_{2(g)} + 3\ H_{2(g)} \rightleftharpoons 2\ NH_{3(g)}$ ( )
يعتبر من التفاعلات العكوسة المتجانسة.

5. أنيون الأسيتات CH_3COO^- يعتبر من قواعد برونستد – لوري. ( )

6. حاصل جمع (pOH , pH) يساوي (14) عند (25 °C) في المحاليل المتعادلة فقط. ( )

(ب) ضع علامة (√) بين القوسين أمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من العبارات التالية: **(7 x1=7)**

1. الجدول التالي يمثل تسجيل القراءات لإحدى التجارب العملية لكمية معينة من غاز ما،

الحجم (L)	0.9	1.8	2.1	3.1	3.2
درجة الحرارة (K)	137	257	320	473	488

و من خلاله يتضح أنه عند ثبوت الضغط فإن حجم كمية معينة من الغاز:

( ) يتناسب طردياً مع درجة حرارته المطلقة ( ) لا يتأثر بتغير درجة حرارته المطلقة

( ) يتناسب عكسياً مع درجة حرارته المطلقة ( ) يتغير عشوائياً بتغير درجة حرارته المطلقة

صفوة معلمي الكويت

تابع السؤال الثاني (أ):

2. يحتوي خليط غازي على أكسجين ونيتروجين وثاني أكسيد الكربون وضغطه الكلي P_T يساوي (32.9kPa)، إذا كان الضغط الجزئي للأكسجين P_{O_2} يساوي (6.6kPa) والضغط الجزئي للنيتروجين P_{N_2} يساوي (23kPa) فإن الضغط الجزئي لثاني أكسيد الكربون P_{CO_2} يساوي:

( ) 3.3 kPa ( ) 9.9 kPa

( ) 26.3 kPa ( ) 29.6 kPa

3. إحدى العبارات التالية لا تنطبق على التفاعلات العكوسة:

( ) تنقسم إلى تفاعلات متجانسة وغير متجانسة ( ) لا تستهلك المواد المتفاعلة تماماً

( ) المواد الناتجة لا تستطيع أن تتحد مع بعضها لتكون المواد المتفاعلة ( ) تصل لحالة الاتزان عندما يتساوى معدل سرعة التفاعل الطردي والعكسي

4. جميع العوامل تؤثر على موضع اتزان التفاعل الكيميائي عدا واحدة، هي:

( ) المادة المانعة ( ) التركيز

( ) درجة الحرارة ( ) الضغط

5. في النظام المتزن التالي: $PCl_{5(g)} + 120\,kJ \rightleftarrows PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)}$

يمكن زيادة كمية الكلور (Cl_2) في التفاعل:

( ) بإضافة الكلور إلى مزيج التفاعل ( ) بخفض درجة الحرارة

( ) بزيادة الضغط ( ) بزيادة درجة الحرارة

6. الحمض ثنائي البروتون من المركبات التالية هو:

( ) $HBrO_2$ ( ) $HCOOH$

( ) H_2SO_4 ( ) $Mg(OH)_2$

7. قيمة الأس الهيدروكسيدي pOH لمحلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH الذي تركيزه (0.0001) يساوي:

( ) 1 ( ) 4

( ) 3 ( ) 10

درجة السؤال الثاني

10

صفوة معلمي الكويت

ثانياً: الأسئلة المقالية

السؤال الثالث:

(أ) ما المقصود بكل من: (3×1=3)

1- فرضية أفوجادرو ؟ .....

.....

2- التفاعلات العكوسة غير المتجانسة ؟.....

.....

3-الأس الهيدروجيني ؟.....

.....

(ب) حل المسألة التالية: (3 =1x3)

يشغل غاز عند ضغط يساوي (155 kPa) ودرجة حرارة (25°C) حجماً (1 L) ، عند زيادة الضغط إلى (605 kPa) بفعل درجة الحرارة إلى (125°C) احسب الحجم النهائي.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(جـ) في الجدول التالي اختر من القائمة (ب) النوع المناسب للقائمة (أ): (4x½=2)

م	القائمة (أ)	الرقم	القائمة (ب)
1	من الأحماض القوية		H_3O^+
2	يتأين على ثلاث مراحل		H_3PO_4
3	قاعدة تتأين بشكل تام في الماء		OH^-
4	الحمض المرافق للماء		KOH
			HCl

درجة السؤال الثالث: 8

صفوة معلمي الكويت

السؤال الرابع : (أ) علل لما يلي تعليلا علميا صحيحا : (3X1=3)

1. تستخدم الغازات في عمل الوسائد الهوائية في السيارات وأجهزة الأمان الأخرى.

.....

.....

2. تثبت تركيزات المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل عند وصول النظام إلى حالة الاتزان الكيميائي الديناميكي.

.....

.....

3. في التفاعل التالي: $H_3N + BF_3 \rightarrow H_3N:BF_3$

يعتبر ثالث فلوريد البورون حمض لويس.

.....

.....

(ب) أكمل الجدول التالي بكتابة الاسم العلمي أو الصيغة الكيميائية لكل من: (4x½=2)

اسم المركب	صيغة المركب
حمض الهيدروفلوريك	
حمض البير كلوريك	
	LiOH
	H_2CO_3

(جـ) حل المسألة التالية : (1x3=3)

إذا علمت أن قيمة ثابت الاتزان K_{eq} للتفاعل التالي : $CaSO_{4(s)} \rightleftharpoons Ca^{2+}_{(aq)} + SO_4^{2-}_{(aq)}$

تساوي (2.4×10^{-5}) ، احسب تركيز كل أيون في المحلول عند الاتزان.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

درجة السؤال الرابع


8

صفوة معلمي الكويت

السؤال الخامس :

(أ) ادرس الشكل المقابل ثم حدد ما تمثله الأرقام في الرسم البياني مستعيناً بالمفاهيم التالية: (3=1x3)

(طاقة المتفاعلات ، طاقة التنشيط ، الطاقة الناتجة من التفاعل ، طاقة النواتج ، المركب المنشط)



الرقم 1 يمثل .....

الرقم 2 يمثل .....

الرقم 3 يمثل .....

(ب) اكمل جدول المقارنة التالية: (2=½X4)

وجه المقارنة	قانون الغاز المثالي	قانون جاي لوساك
العلاقة الرياضية		
وجه المقارنة	$1 < K_{eq}$	$1 > K_{eq}$
اتجاه موضع الاتزان في التفاعلات العكوسة (الطردي – العكسي)		

(جـ) حل المسألة التالية: (3=1x3)

احسب قيمة ثابت تأين Ka لحمض الميثانويك HCOOH تركيزه (0.1 M) ، إذا كان تركيز كاتيون الهيدرونيوم H_3O^+ في المحلول يساوي (4.2×10^{-3} M).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8 درجة السؤال الخامس

صفوة معلمي الكويت

السؤال السادس :

(أ) اقرأ العبارة التالية ثم أجب عما يلي : (درجتان)

"يعتبر الحليب هام جدا للأطفال والكبار حيث يحتوي على العناصر الهامة لبناء الجسم وقد وجد يوسف على زجاجة الحليب ان قيمة الأس الهيدروجيني (pH = 5.6)"

1. حدد نوع المحلول لعينة الحليب السابقة (متعادل – حمضي – قاعدي).

.....

2. احسب قيمة تركيز كاتيون الهيدروجين $[H^+]$.

.....

.....

3. احسب قيمة تركيز أنيون الهيدروكسيد $[OH^-]$.

.....

.....

(ب) ماذا تتوقع أن يحدث في الحالات التالية مع التفسير : (3 x 1 =3)

1. توصيل وعاء حجمه 3L به غاز الأكسجين بوعاء فارغ حجمه2L (عند نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة)؟

التوقع لحجم غاز الأكسجين: .....

التفسير :.....

.....

2. تسخين كمية معينة من الغاز في وعاء حجمه ثابت؟

التوقع لضغط الغاز: .....

التفسير :.....

.....

3. ادخال رقاقة خشب مشتعلة في زجاجة مملوءة بغاز الأكسجين؟

التوقع لرقاقة الخشب: .....

التفسير : .....


.....

صفوة معلمي الكويت

تابع / السؤال السادس:

(ج) أكمل خريطة المفاهيم مستعينا بالمصطلحات التالية: (6X½=3)

(متعادلة ، $pH < 7$ ، $[OH^-] = 2 \times 10^{-7}$ ، حمضية ، $[OH^-] = 2 \times 10^{-7}$ ، $pH > 7$)



8	درجة السؤال السادس

انتهت الأسئلة ،،،

صفوة معلمي الكويت

دولة الكويت (عدد الصفحات : 9)

وزارة التربية

نموذج الاجابة

التوجيه الفني العام للعلوم

امتحان الفترة الدراسية الأولى – العام الدراسي 2019-2020 م

المجال الدراسي : الكيمياء للصف الثاني عشر العلمي - الزمن : ساعتان

أولاً : الأسئلة الموضوعية

السؤال الأول :

(أ) اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية: (3=½x 6)

1. درجة الحرارة التي عندها يكون متوسط الطاقة الحركية لجسيمات الغاز يساوي صفراً نظرياً. أو 273° أو OK

(الصفر المطلق ص)29

2. الحجم الذي يشغله المول الواحد من الغاز عند الظروف القياسية من الضغط ودرجة الحرارة يساوي (22.4 L).

(الحجم المولي ص) 46

3. مادة تزيد من سرعة التفاعل دون استهلاكها، إذ يمكن بعد توقف التفاعل استعادتها من المزيج المتفاعل من دون أن تتعرض لتغير كيميائي.

(المادة المحفزة ص)67

أو العامل المحفز أو العامل المساعد

4. النسبة بين حاصل ضرب تركيز المواد الناتجة من التفاعل إلى حاصل ضرب تركيز المواد المتفاعلة كل مرفوع إلى أس يساوي عدد المولات في المعادلة الكيميائية الموزونة.

(ثابت الاتزان K_{eq} ص) 74

أو

(القاعدة المرافقة ص) 103

أو القاعدة المرافقة للحمض

5. الجزء المتبقي من الحمض بعد فقد البروتون H^+.

(الأحماض الأكسجينية ص)107

أو الأحماض ثلاثية العنصر

6. أحماض تحتوي على ثلاثة عناصر منها الاكسجين.





معلمي الكويت


نموذج الاجابة

تابع / السؤال الأول :

(ب) املأ الفراغات في الجمل التالية بما يناسبها علمياً : (7x1=7)

1. عند ارتفاع درجة حرارة كمية من الغاز فإن التصادم المستمر بين الجسيمات وجدار الاناء ... يزداد ..ص 15

2. الشكل المقابل يمثل الرسم البياني لأحد قوانين الغازات هو ... قانون بويل ... ص 24



3. غبار الفحم ... أكثر ... نشاطاً من كتل الفحم الكبيرة. ص 67

4. إذا كان التعبير عن ثابت الاتزان لأحد التفاعلات الغازية هو $K_{eq}=\frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]}$ فتكون معادلة التفاعل الكيميائي هي ... $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ ... ص 75


لم يجب سب على الحالة المتزنة

5. في التفاعلات العكوسة الماصة للحرارة تقل قيمة ثابت الاتزان عند ... انخفاض ... درجة الحرارة. ص 78

6. مدى دليل الثايمول الأزرق القاعدي موضح في الجدول فعند إضافة قطرات منه إلى (100 mL) من الماء المقطر فإن المحلول يتلون باللون ... الأصفر ... ص 123

مدى الدليل	8	9.6
لون الحالة	أصفر	أزرق

7. تزداد قوة الحمض كلما كانت قيمة pKa له ... قليلة / منخفضة / أقل ... ص 128



درجة السؤال الأول





قوة معلمي الكويت

نموذج الاجابة

السؤال الثاني :

(أ) اكتب كلمة (صحيحة) بين القوسين المقابلين للعبارة الصحيحة و كلمة (خطأ) بين القوسين المقابلين للعبارة الخطأ في كل مما يلي: (3= ½x 6)

1. من فرضيات النظرية الحركية أن الغازات تتميز بقوى تجاذب عالية بين جسيماتها. (خطأ) ص 15

2. عند رفع درجة الحرارة المطلقة لغاز مثالي إلى الضعف فإن حجمه يقل إلى النصف عند ثبوت الضغط. (خطأ) ص 29

3. تقاس سرعة التفاعل الكيميائي بكمية المتفاعلات التي يحدث لها التغيير في خلال وحدة الزمن. (صحيحة) ص 54

4. التفاعل التالي: $N_{2\,(g)} + 3\,H_{2\,(g)} \rightleftharpoons 2\,NH_{3\,(g)}$ يعتبر من التفاعلات العكوسة المتجانسة. (صحيحة) ص 71

5. أنيون الأسيتات CH_3COO^- يعتبر من قواعد برونستد – لوري. (صحيحة) ص 92

6. حاصل جمع (pOH , pH) يساوي (14) عند (25 °C) في المحاليل المتعادلة فقط. (خطأ) ص 17

(ب) ضع علامة (√) بين القوسين أمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من العبارات التالية: (7=1x 7)

1. الجدول التالي يمثل تسجيل القراءات لإحدى التجارب العملية لكمية معينة من غاز ما،

الحجم (L)	0.9	1.8	2.1	3.1	3.2
درجة الحرارة (K)	137	257	320	473	488

و من خلاله يتضح أنه عند ثبوت الضغط فإن حجم كمية معينة من الغاز: ص 29

(√) يتناسب طردياً مع درجة حرارته المطلقة ( ) لا يتأثر بتغير درجة حرارته المطلقة

( ) يتناسب عكسياً مع درجة حرارته المطلقة ( ) لا يتغير عشوائياً بتغير درجة حرارته المطلقة

صفوة تعلمي الكويت

تابع السؤال الثاني (ب)

نموذج الاجابة

2. يحتوي خليط غازي على أكسجين ونيتروجين وثاني أكسيد الكربون وضغطه الكلي P_T يساوي (32.9kPa)، إذا كان الضغط الجزئي للأكسجين P_{O_2} يساوي (6.6 kPa) والضغط الجزئي للنيتروجين P_{N_2} يساوي (23kPa) فإن الضغط الجزئي لثاني أكسيد الكربون P_{CO_2} يساوي: ص 51

(√) 3.3 kPa ( ) 9.9 kPa

( ) 26.3 kPa ( ) 29.6 kPa

3. إحدى العبارات التالية لا تنطبق على التفاعلات العكوسة: ص 4

( ) تنقسم إلى تفاعلات متجانسة وغير متجانسة ( ) لا تستهلك المواد المتفاعلة تماماً

(√) المواد الناتجة لا تستطيع أن تتحد مع بعضها لتكون المواد المتفاعلة ( ) تصل لحالة الاتزان عندما يتساوى معدل سرعة التفاعل الطردي والعكسي

4. جميع العوامل تؤثر على موضع اتزان التفاعل الكيميائي عدا واحدة، هي: ص 8

(√) المادة المانعة ( ) التركيز

( ) درجة الحرارة ( ) الضغط

5. في النظام المتزن التالي: $PCl_{5(g)} + 120\,kJ \leftrightarrows PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)}$ ص 9

يمكن زيادة كمية الكلور (Cl_2) في التفاعل:

( ) بإضافة الكلور إلى مزيج التفاعل ( ) بخفض درجة الحرارة

( ) بزيادة الضغط (√) بزيادة درجة الحرارة

6. الحمض ثنائي البروتون من المركبات التالية هو: ص 106

( ) $HBrO_2$ ( ) $HCOOH$

(√) H_2SO_4 ( ) $Mg(OH)_2$

7. قيمة الأس الهيدروكسيدي pOH لمحلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH الذي تركيزه (0.0001) يساوي: ص 117

( ) 1 (√) 4

( ) 3 ( ) 10

وزارة التربية

التوجيه الفني العام للعلوم

درجة السؤال الثاني

10

صفوة معلمي الكويت

ثانياً : الأسئلة المقالية

نموذج الاجابة

السؤال الثالث:

(أ) ما المقصود بكل من : (3x1=3)

1- فرضية أفوجادرو ؟ **الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة عند درجة الحرارة والضغط نفسيهما تحتوي على أعداد متساوية من الجسيمات.** ص 46

2- التفاعلات العكوسة غير المتجانسة ؟ **تفاعلات عكوسة توجد فيها جميع المواد الداخلة والناتجة من التفاعل في أكثر من حالة واحدة من حالات المادة.** ص 72

3- الأس الهيدروجيني ؟ **القيمة السالبة للوغاريتم العشري لتركيز كاتيون الهيدروجين H^+.** ص 116

(ب) حل المسألة التالية : (1x3= 3)

يشغل غاز عند ضغط يساوي (155 kPa) ودرجة حرارة (25°C) حجماً (1 L) ، عند زيادة الضغط إلى (605 kPa) بفعل درجة الحرارة إلى (125°C) احسب الحجم النهائي. ص 34

$P_1 V_1 / T_1 = P_2 V_2 / T_2$	درجة
$155 / 298 = 605 \times V_2 / 398$	½ درجة
$V_2 = 0.342$ kPa	½ درجة
$T_1 = 25 + 273 = 298$ K	½ درجة
$T_2 = 125 + 273 = 398$ K	½ درجة

(جـ) في الجدول التالي اختر من القائمة (ب) النوع المناسب للقائمة (أ) : (4x½=2)

#	القائمة (أ)		القائمة (ب)	
1	من الأحماض القوية	4	H_3O^+	ص 126
2	يتأين على ثلاث مراحل	2	H_3PO_4	ص 128
3	قاعدة تتأين بشكل تام في الماء	–	OH^-	
4	الحمض المرافق للماء	3	KOH	ص 126
		1	HCl	ص 103

درجة السؤال الثالث: 8

نموذج الاجابة

السؤال الرابع : (أ) علل لما يلي تعليلا علميا صحيحا : (3X1=3)

1. تستخدم الغازات في عمل الوسائد الهوائية في السيارات وأجهزة الأمان الأخرى.

لأنها تمتص الطاقة الناتجة عن التصادم عندما تضطر جسيمات الغاز إلى الاقتراب من بعضها البعض وذلك بسبب تباعد جسيمات الغاز بدرجة كبيرة مما يجعلها قابلة للانضغاط. ص 15

2. تثبت تركيزات المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل عند وصول النظام إلى حالة الاتزان الكيميائي الديناميكي.

لأن عند الاتزان الكيميائي الديناميكي تصبح سرعة التفاعل الطردي مساوية لسرعة التفاعل العكسي. ص 72

3. في التفاعل التالي: $H_3N + BF_3 \rightarrow H_3N{:}BF_3$

يعتبر ثالث فلوريد البورون حمض لويس.

لأن ثالث فلوريد البورون يستقبل زوج إلكترونات من الامونيا. ص 105

(ب) أكمل الجدول التالي بكتابة الاسم العلمي أو الصيغة الكيميائية لكل من: (4x½=2)

اسم المركب	صيغة المركب	
حمض الهيدروفلوريك	**HF**	ص 108
حمض البير كلوريك	**$HClO_4$**	ص 110
هيدروكسيد الليثيوم	LiOH	ص 110
حمض الكربونيك	H_2CO_3	ص 110

(جـ) حل المسألة التالية : (1x3=3)

إذا علمت أن قيمة ثابت الاتزان K_{eq} للتفاعل التالي : $CaSO_{4(s)} \rightleftharpoons Ca^{2+}{}_{(aq)} + SO_4^{2-}{}_{(aq)}$

تساوي 2.4×10^{-5} ، احسب تركيز كل أيون في المحلول عند الاتزان. ص 76

$K_{eq} = [Ca^{2+}][SO_4^{2-}]$ درجة

$2.4 \times 10^{-5} = X^2$ درجة

$X = \sqrt{2.4 \times 10^{-5}}$

$[Ca^{2+}] = [SO_4^{2-}] = X = 4.898 \times 10^{-3}$ M درجة

أو أي حل آخر صحيح

درجة السؤال الرابع 8


الكنترول العلمي وزارة التربية CONTROL
صفوة تعليمي الكويت
وزارة التربية التوجيه الفني العام للشؤون

السؤال الخامس :

نموذج الاجابة

(أ) ادرس الشكل المقابل ثم حدد ما تمثله الأرقام في الرسم البياني مستعينا بالمفاهيم التالية: (3-1x3)

(طاقة المتفاعلات ، طاقة التنشيط ، الطاقة الناتجة من التفاعل ، طاقة النواتج ، المركب المنشط)



الرقم1 يمثل ... المركب المنشط ...

الرقم 2 يمثل ... طاقة التنشيط ...

الرقم 3 يمثل ... الطاقة الناتجة من التفاعل ...

ص 65

(ب) أكمل جدول المقارنة التالية: (2-4X½)

وجه المقارنة	قانون الغاز المثالي	قانون جاي لوساك
العلاقة الرياضية	$PV = nRT$	$P_1 / T_1 = P_2 / T_2$ ص38 32
وجه المقارنة	$1 < K_{eq}$	$1 > K_{eq}$
اتجاه موضع الاتزان في التفاعلات العكوسة (الطردي – العكسي)	الطردي	العكسي ص 74

(جـ) حل المسألة التالية: (3=1x3)

احسب قيمة ثابت تأين Ka لحمض الميثانويك HCOOH تركيزه (0.1 M) ، إذا كان تركيز كاتيون الهيدرونيوم H_3O^+ في المحلول يساوي (4.2×10^{-3} M)

تركيز الحمض عند الاتزان = $0.1 - 4.2 \times 10^{-3} = 0.0958$ M

ص 131

$Ka = [H_3O^+][HCOO^-]/HCOOH]$ درجة

$[4.2 \times 10^{-3} M][4.2 \times 10^{-3} M] / [0.0958]$ درجة

$Ka = 1.84 \times 10^{-4}$ درجة



أو أي حل آخر صحيح

درجة السؤال الخامس 8



صفوة معلمي الكويت

السؤال السادس : **نموذج الاجابة**

(أ) اقرأ العبارة التالية ثم أجب عما يلي : (درجتان)

"يعتبر الحليب هام جدا للأطفال والكبار حيث يحتوي على العناصر الهامة لبناء الجسم وقد وجد يوسف على زجاجة الحليب ان قيمة الأس الهيدروجيني (pH = 5.6)"

1. حدد نوع المحلول لعينة الحليب السابقة (متعادل – حمضي – قاعدي). ص 116

حمضي ½ درجة

2. احسب قيمة تركيز كاتيون الهيدروجين $[H^+]$. ¼ درجة ص 118

$$[H^+] = 10^{-pH} = 2.5 \times 10^{-6}$$

3. احسب قيمة تركيز أنيون الهيدروكسيد $[OH^-]$. ¼ درجة ص 117

$$[H^+][OH^-] = 1 \times 10^{-14}$$

$$[OH^-] = 4 \times 10^{-9}$$

أراك على الطريق الصحيح

(ب) ماذا تتوقع أن يحدث في الحالات التالية مع التفسير : (3 x 1 =3)

1. توصيل وعاء حجمه 3L به غاز الأكسجين بوعاء فارغ حجمه 2L (عند نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة) ص 15

التوقع لحجم غاز الأكسجين: يزداد / يصبح 5L

التفسير: ينتشر الغاز حتى يأخذ حجم الوعاء الذي يحويه.

2. تسخين كمية معينة من الغاز في وعاء حجمه ثابت.

التوقع لضغط الغاز: ارتفاع / زيادة ص 32

التفسير: بسبب زيادة متوسط طاقة حركة جسيمات الغاز بالتالي تزداد تصادمات جسيمات الغاز بجدران الوعاء. أو عند ثبوت الحجم يتناسب ضغط كمية معينة من الغاز تناسباً طردياً مع درجة حرارتها المطلقة.

3. ادخال رقاقة خشب مشتعلة في زجاجة مملوءة بغاز الأكسجين.

التوقع لرقاقة الخشب: يزداد اشتعالها / تتوهج ص 66

التفسير: زيادة تركيز الأكسجين يزيد تفاعل الاحتراق

الكنترول العلمي وزارة التربية CONTROL


صفوة تعليمي الكويت

تابع / السؤال السادس:

(ج) أكمل خريطة المفاهيم مستعينا بالمصطلحات التالية: (6X½=3)

(متعادلة ، $pH < 7$ ، $[OH^-] = 2 \times 10^{-7}$ ، حمضية ، $pH > 7$ ، $[OH^-] = 2 \times 10^{-7}$)

ص 116



يأخذ نصف درجة

8 درجة السؤال السادس

انتهت الأسئلة ،،،

وزارة التربية
الموجه الفني العام لـ...

الكنترول العشوائي
وزارة التربية
CONTROL
صفوة معلمي الكويت

دولة الكويت (عدد الصفحات : 12)

وزارة التربية

التوجيه الفني العام للعلوم

امتحان نهاية الفترة الدراسية الأولى – العام الدراسي 2018-2019 م

المجال الدراسي: الكيمياء للصف الثاني عشر العلمي - الزمن: ساعتان

أولاً: الأسئلة الموضوعية (اجبارية)

السؤال الأول:

(أ) اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية: (6x¾=4½)

1- عند ثبات الحجم يتناسب ضغط كمية معينة من الغاز تناسباً طردياً مع درجة حرارتها المطلقة. ( )

2- الضغط الناتج عن أحد مكونات خليط غازي إذا شغل حجماً مساوياً لحجم الخليط عند درجة الحرارة نفسها. ( )

3- عند ثبات درجة الحرارة، تتناسب سرعة التفاعل الكيميائي طردياً مع تركيزات المواد المتفاعلة كل مرفوع إلى أس يساوي عدد المولات أمام كل مادة في المعادلة الكيميائية الموزونة. ( )

4- إذا حدث تغير في أحد العوامل التي تؤثر في نظام متزن ديناميكياً، يعدّل النظام نفسه الى حالة اتزان جديدة بحيث يبطل أو يقلل من تأثير هذا التغير. ( )


5- مركبات تحتوي على هيدروجين وتتأين لتعطي كاتيونات الهيدروجين في المحلول المائي. ( )

6- أحماض أو قواعد عضوية ضعيفة يتغير لونها تبعاً لقيمة الأس الهيدروجيني pH للوسط الذي توضع فيه. ( )

صفوة معلمي الكويت

تابع / السؤال الأول:

(ب) املأ الفراغات في الجمل والمعادلات التالية بما يناسبها: (6x1=6)



1- عند تسخين الأنبوبة الموضحة في الشكل المقابل، فإن حجم الغاز المحصور .....

2- عدد جزيئات غاز النيتروجين الموجودة في (1 L) منه ..... عدد الجزيئات الموجودة في (1L) من غاز الأكسجين عند نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة.

3- في النظام المتزن التالي: $C_{(s)} + CO_{2\,(g)} \rightleftharpoons 2\,CO_{(g)}$

يزداد تركيز غاز (CO) عند ..... الضغط المؤثر.

4- عندما تكون قيمة ثابت الاتزان (K_{eq}) أكبر من (1) فإن ذلك يعني أن التفاعل يسير باتجاه تكوين المواد ..... .

5- في التفاعل التالي: $HCl_{(aq)} + H_2O_{(l)} \longrightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$

يعتبر ..... حمضاً مرافقاً للماء.

6- يظهر اللون الوسطي للدليل عندما يكون تركيز الحالة الحمضية [Hin] ..... تركيز الحالة القاعدية [in^-] .

درجة السؤال الأول 10½

صفوة معلمي الكويت

السؤال الثاني:

(أ) اكتب كلمة (صحيحة) بين القوسين المقابلين للعبارة الصحيحة و كلمة (خطأ) بين القوسين المقابلين للعبارة الخطأ في كل مما يلي: (6x¾=4½)

1- عينة من غاز الأكسجين تشغل حجما قدره (2 L) عند درجة حرارة (0°C) فإذا كان الضغط ثابتاً وارتفعت درجة الحرارة إلى (273°C) فإن الحجم يصبح (4L). ( )

2- يتضاعف متوسط الطاقة الحركية لجزيئات غاز محبوس في وعاء محكم الإغلاق عند مضاعفة درجة حرارته المطلقة. ( )

3- نقص مساحة السطح للمادة المتفاعلة تعمل على زيادة سرعة التفاعل الكيميائي. ( )

4- المواد المحفزة للتفاعل تعمل على زيادة حاجز طاقة التنشيط للتفاعل الكيميائي. ( )

5- الزوج التالي (H_2SO_4, HSO_4^-) يسميان زوج الحمض/ القاعدة المرافقة حسب مفهوم برونستد – لوري للأحماض والقواعد. ( )

6- المحلول الحمضي هو المحلول الذي يكون تركيز كاتيون الهيدرونيوم فيه أقل من تركيز أنيون الهيدروكسيد. ( )

(ب) ضع علامة (✓) بين القوسين أمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من العبارات التالية: (5x1=5)

1- درجة الحرارة التي يكون عندها متوسط الطاقة الحركية لغاز تساوي الصفر نظرياً:

( ) −273 °C ( ) −20 °C

( ) 273 °C ( ) 273 K

2- ترتبط قيمة ثابت الاتزان K_{eq} للتفاعل المتزن بتغير:

( ) مساحة السطح للمواد المتفاعلة ( ) درجة الحرارة

( ) الضغط المؤثر على النظام ( ) تركيز المواد المتفاعلة

صفوة معلمي الكويت

تابع / السؤال الثاني (ب):

3– في النظام المتزن التالي: $PCl_{5(g)} \rightleftharpoons PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)}$

يعبر عن ثابت الاتزان بالعلاقة K_{eq} :

$\frac{[PCl]^5}{[PCl]^3 \times [Cl]^2}$ ( ) $\frac{[PCl]^3 \times [Cl]^2}{[PCl]^5}$ ( )

$\frac{[PCl_5]^2}{[PCl_3] \times [Cl_2]}$ ( ) $\frac{[PCl_3] \times [Cl_2]}{[PCl_5]}$ ( )

4– الحمض ثلاثي البروتون من بين المركبات التالية هو :

H_2CO_3 ( ) NH_3 ( )

H_3PO_4 ( ) $Al(OH)_3$ ( )

5– حاصل جمع (pH, pOH) يساوي (14) عند (25 °C):

( ) للمحاليل الحمضية فقط ( ) للمحاليل المتعادلة فقط

( ) للمحاليل القاعدية فقط ( ) لجميع المحاليل المائية

درجة السؤال الثاني 9½

صفوة معلمي الكويت

ثانياً : الأسئلة المقالية (إجبارية)

السؤال الثالث:

(أ) ما المقصود بكل من: (3x1=3)

1- قانون تشارلز؟

.....

.....

2 – فرضية أفوجادرو؟

.....

.....

3 – الاتزان الكيميائي الديناميكي؟

.....

.....

(ب) أجب عما يلي: (1x3=3)

تحتوي أسطوانة حجمها (8.58L) على كمية من غاز الأكسجين (O_2) قدرها (89.6 g) فما قيمة الضغط داخل الاسطوانة عند درجة حرارة (21 °C)؟

علما بأن: (M.wt. (O_2) = 32 g/mol, R = 8.31 kPa.L/mol.K)

الحل:

صفوة معلمي الكويت

تابع / السؤال الثالث:

(جـ) في الجدول التالي اختر من القائمة (ب) النوع المناسب للقائمة (أ): (4x½=2)

م	القائمة (أ)		القائمة (ب)
1	القاعدة المرافقة للماء		CH_3COOH
2	من الأحماض الضعيفة		H_2O
3	قاعدة تتأين بشكل تام في الماء		OH^-
4	يسلك سلوكا متردداً		HCl
			$NaOH$

درجة السؤال الثالث

8

صفوة معلمي الكويت

السؤال الرابع:

(أ) علل لما يلي تعليلا علميا صحيحا: (3X1=3)

1- يأخذ الغاز شكل وحجم الإناء الحاوي له.

.....

.....

2- التفاعل التالي: $Fe_{(s)} + S_{(s)} \rightleftharpoons FeS_{(s)}$

يعتبر من التفاعلات العكوسة المتجانسة.

.....

.....

3- في التفاعل التالي: $AlCl_3 + Cl^- \longrightarrow AlCl_4^-$

يعتبر أنيون الكلوريد Cl^- قاعدة لويس، بينما يعتبر كلوريد الألمنيوم $AlCl_3$ حمض لويس.

.....

.....

(ب) أكمل الجدول التالي بكتابة الاسم العلمي أو الصيغة الكيميائية لكل من: (4x½=2)

صيغة المركب	اسم المركّب
HF	
	حمض الهيبوكلوروز
NH_3	
	هيدروكسيد الليثيوم

صفوة معلمي الكويت

تابع / السؤال الرابع:

(جـ) أجب عما يلي: (1x3=3)

تُرك محلول حمض الفورميك في الماء حتى حدث الاتزان التالي:

$$HCOOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons HCOO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

فإذا وُجِد أن تركيز كاتيون الهيدرونيوم في المحلول عند الاتزان يساوي (4.2×10^{-3} M) ، فاحسب تركيز الحمض عند الاتزان. علما بأن قيمة ثابت الاتزان K_{eq} تساوي (1.764×10^{-4})


الحل:

درجة السؤال الرابع 8

صفوة معلمي الكويت

السؤال الخامس:

(أ) ادرس الشكل التالي ثم أجب عما يلي: (2X1=2)



توضح الأعمدة البيانية وجود ثلاث أنواع من المحاليل المائية: (أ)، (ب)، (ج) تبعاً لتركيز $[H_3O^+]$ $[OH^-]$ عند 25^oC:

1- المحلول الحمضي يمثله الحرف (.....)

2- المحلول المتعادل يمثله الحرف (.....)

(ب) قارن بين كل اثنين مما يلي حسب وجه المقارنة المرفق في الجداول التالية: (8 X ½ = 4)

1-قارن أثر تغيّر العوامل التالية على موضع الاتزان في التفاعلات العكوسة:

وجه المقارنة	حرارة + $CO_{(g)} + 2H_{2(g)} \rightleftharpoons CH_3OH_{(g)}$	حرارة + $CO_{2(g)} + C_{(s)} \rightleftharpoons 2CO_{(g)}$
تسخين النظام		
زيادة الضغط		

صفوة معلمي الكويت


تابع / السؤال الخامس:

2- أكمل الجدول التالي:

وجه المقارنة	الغاز المثالي	الغاز الحقيقي
قوى التجاذب بين جسيمات الغاز (يوجد – لا يوجد)		
إمكانية إسالته بالضغط والتبريد (يمكن – لا يمكن)		

(جـ) استخدم المفاهيم التالية لإكمال خريطة المفاهيم : (4x½=2)

(الحجم ، الضغط ، $P_1 V_1 = P_2 V_2$ ، $V_1 / T_1 = V_2 / T_2$)



درجة السؤال الخامس 8

صفوة معلمي الكويت

السؤال السادس:

(أ) أجب عما يلي: (2x1=2)

الجدول التالي يوضح قيمة ثابت التأين K_a لمحاليل متساوية التركيز وعند درجة حرارة (25 °C):

اسم الحمض	حمض الهيدروسيانيك	حمض النيتروز	حمض البروبانويك
ثابت التأين K_a	4.9×10^{-10}	4.5×10^{-4}	1.3×10^{-5}

1- الحمض الأكثر قوة هو .....

2- الحمض الأضعف هو .....

(ب) ماذا تتوقع أن يحدث في الحالات التالية مع التفسير: (3 x 1 =3)

1 – اصطدام السائق بالوسادة الهوائية في حادث مروري للسيارة التي يقوم بقيادتها؟

التوقع بالنسبة للغاز في الوسادة:.....

التفسير:.....

.....

2- مضاعفة قيمة الضغط المؤثر على كمية محصورة من غاز (عند ثبات درجة الحرارة) ؟

التوقع لحجم الغاز : .....

التفسير:.....

.....

3- أضيف غاز أول أكسيد الكربون (CO) إلى النظام المتزن التالي:

$$Ni_{(s)} + 4CO_{(g)} \rightleftharpoons Ni(CO)_{4(g)} \quad ?$$

التوقع لموضع الاتزان : .....

التفسير:.....

.....

صفوة معلمي الكويت

تابع / السؤال السادس:

(جـ) أجب عما يلي: (6 x ½ =3)

أكمل الجدول التالي للمحاليل المختلفة:

المحلول	A	B	C	D
$[H_3O^+]$	1×10^{-10}	.....	1×10^{-9}	1×10^{-7}
$[OH^-]$	1×10^{-4}	1×10^{-12}	.....	1×10^{-7}
pH	10	.....	9	7
pOH	.....	12	5	7
نوع المحلول	قاعدي	حمضي	.....	.....

8	درجة السؤال السادس

انتهت الأسئلة ونرجو لكم التوفيق

صفوة معلمي الكويت

دولة الكويت (عدد الصفحات : 12)

وزارة التربية **نموذج الاجابة**

التوجيه الفني العام للعلوم

امتحان نهاية الفترة الدراسية الأولى العام الدراسي 2018-2019 م

المجال الدراسي: الكيمياء للصف الثاني عشر العلمي - الزمن : ساعتان

أولاً : الأسئلة الموضوعية (اجبارية)

السؤال الأول :

(أ) اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية: (6x¾=4½)

1- عند ثبات الحجم يتناسب ضغط كمية معينة من الغاز تناسباً طردياً مع درجة حرارتها المطلقة. (قانون جاي – لوساك) ص 32

2- الضغط الناتج عن أحد مكونات خليط غازي إذا شغل حجماً مساوياً لحجم الخليط عند درجة الحرارة نفسها. (الضغط الجزئي) ص 50

3- عند ثبات درجة الحرارة، تتناسب سرعة التفاعل الكيميائي طردياً مع تركيزات المواد المتفاعلة كل مرفوع إلى أس يساوي عدد المولات أمام كل مادة في المعادلة الكيميائية الموزونة. (قانون فعل الكتلة)ص 72

4- إذا حدث تغير في أحد العوامل التي تؤثر في نظام متزن ديناميكيا، يعدّل النظام نفسه الى حالة اتزان جديدة بحيث يبطل أو يقلل من تأثير هذا التغير. (مبدأ لوشاتليه) ص 77

5- مركبات تحتوي على هيدروجين وتتأين لتعطي كاتيونات الهيدروجين في المحلول المائي. (حمض أرهينيوس) ص 98


6- أحماض أو قواعد عضوية ضعيفة يتغير لونها تبعاً لقيمة الأس الهيدروجيني pH للوسط الذي توضع فيه. (أدلة التعادل) أو الأدلة ص 121

وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم
صفوة معلمي الكويت

تابع / السؤال الأول:

نموذج الاجابة

(ب) املأ الفراغات في الجمل والمعادلات التالية بما يناسبها: (6x1=6) ص 28



1- عند تسخين الأنبوبة الموضحة في الشكل المقابل، فإن حجم الغاز المحصور ... **يزداد** ... أكبر

أو =

2- عدد جزيئات غاز النيتروجين الموجودة في (1 L) منه ... **تساوي** ... عدد الجزيئات الموجودة في (1L) من غاز الأكسجين عند نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة. ص 46

3- في النظام المتزن التالي: $C_{(s)} + CO_{2(g)} \rightleftharpoons 2\,CO_{(g)}$ ص 79

يزداد تركيز غاز (CO) عند ... **خفض** ... الضغط المؤثر . يقل


ص 74

4- عندما تكون قيمة ثابت الاتزان (K_{eq}) أكبر من (1) فإن ذلك يعني أن التفاعل يسير باتجاه تكوين المواد ... **الناتجة** ... .

5- في التفاعل التالي: $HCl_{(aq)} + H_2O_{(l)} \longrightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$ ص 103

يعتبر ... **كاتيون الهيدرونيوم / H_3O^+** ... حمضا مرافقا للماء.

6- يظهر اللون الوسطي للدليل عندما يكون تركيز الحالة الحمضية [Hin] ...يساوي ... تركيز الحالة القاعدية [in^-] ص 122



درجة السؤال الأول

وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم



قهوة معلمي الكويت

السؤال الثاني: **نموذج الاجابة**

(أ) اكتب كلمة (صحيحة) بين القوسين المقابلين للعبارة الصحيحة و كلمة (خطأ) بين القوسين المقابلين للعبارة الخطأ في كل مما يلي: (6x¾=4½)

1- عينة من غاز الأكسجين تشغل حجما قدره (2 L) عند درجة حرارة (0 °C) فإذا كان الضغط ثابتاً وارتفعت درجة الحرارة إلى (273 °C) فإن الحجم يصبح (4L). (صحيحة) ص 30

2- يتضاعف متوسط الطاقة الحركية لجزيئات غاز محبوس في وعاء محكم الإغلاق عند مضاعفة درجة حرارته المطلقة. (صحيحة) ص 20

3- نقص مساحة السطح للمادة المتفاعلة تعمل على زيادة سرعة التفاعل الكيميائي. (خطأ) ص 67

4- المواد المحفزة للتفاعل تعمل على زيادة حاجز طاقة التنشيط للتفاعل الكيميائي. (خطأ) ص 67

5- الزوج التالي (HSO_4^- , H_2SO_4) يسميان زوج الحمض/ القاعدة المرافقة حسب مفهوم برونستد – لوري للأحماض والقواعد. (صحيحة / أو خطأ) ص 103

6- المحلول الحمضي هو المحلول الذي يكون تركيز كاتيون الهيدروجين فيه أقل من تركيز أنيون الهيدروكسيد. (خطأ) ص 114

(ب) ضع علامة (✓) بين القوسين أمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلا من العبارات التالية: (5x1=5)

1- درجة الحرارة التي يكون عندها متوسط الطاقة الحركية لغاز تساوي الصفر نظريا: ص 29

(✓) -273 °C ( ) -20 °C

( ) 273 °C ( ) 273 K

2- ترتبط قيمة ثابت الاتزان K_{eq} للتفاعل المتزن بتغير: ص 80

( ) مساحة السطح للمواد المتفاعلة (✓) درجة الحرارة

( ) الضغط المؤثر على النظام ( ) تركيز المواد المتفاعلة

وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم
تم التحميل من: شبكة ياكويت
لجنة تقدير الدرجات
http://www.ykuwait.net
TELEGRAM: @kuwait_net_bot

تابع / السؤال الثاني (ب) :

نموذج الاجابة

3- في النظام المتزن التالي: $PCl_{5(g)} \rightleftharpoons PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)}$ ص 74

يعبر عن ثابت الاتزان بالعلاقة K_{eq} :

( ) $\frac{[PCl]^5}{[PCl]^3 \times [Cl]^2}$ ( ) $\frac{[PCl]^3 \times [Cl]^2}{[PCl]^5}$

( ) $\frac{[PCl_5]^2}{[PCl_3] \times [Cl_2]}$ (✓) $\frac{[PCl_3] \times [Cl_2]}{[PCl_5]}$

4- الحمض ثلاثي البروتون من بين المركبات التالية هو : ص 128


( ) H_2CO_3 ( ) NH_3

(✓) H_3PO_4 ( ) $Al(OH)_3$

5- حاصل جمع (pH, pOH) يساوي (14) عند (25 °C): ص 118

( ) للمحاليل الحمضية فقط ( ) للمحاليل المتعادلة فقط

( ) للمحاليل القاعدية فقط (✓) لجميع المحاليل المائية



درجة السؤال الثاني



وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم
معلمي الكويت

ثانيا : الأسئلة المقالية (إجبارية) نموذج الاجابة

السؤال الثالث :

(أ) ما المقصود بكل من : (3x1=3)

1– قانون تشارلز ؟ ص 29

يتناسب حجم كمية معينة من الغاز تناسباً طردياً مع درجة حرارته المطلقة عند ثبات الضغط وكمية الغاز.

2 – فرضية أفوجادرو؟ ص 46

الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة [عند درجة الحرارة والضغط نفسيهما] تحتوي على أعداد متساوية من الجسيمات.

3 – الاتزان الكيميائي الديناميكي؟ ص 72

حالة النظام التي فيها تثبت تركيزات المواد المتفاعلة والمواد الناتجة وبالتالي سرعة التفاعل الطردي مساوية لسرعة التفاعل العكسي طالما بقي النظام بعيدا عن أي مؤثر خارجي.

(ب) أجب عما يلي: (1x3=3)

تحتوي أسطوانة حجمها (8.58L) على كمية من غاز الأكسجين (O_2) قدرها (89.6 g) فما قيمة الضغط داخل الاسطوانة عند درجة حرارة (21 °C)؟ علما بأن:

(M.wt. (O_2) = 32 g/mol, R = 8.31 kPa.L/mol.K)

الحل: ص 40

$T = 21 + 273 = 294K$ ½

$n(O_2) = m/Mwt = 89.6/32 = 2.8$ mol ½

$P = nRT/V$ (1) } ← 1 ½

$P = (2.8 \times 8.31 \times 294)/ 8.58$ (½)

$P = 797.3$ kPa ½

إذا تم دمج الخطوات وكانت الاجابة صحيحة يعطى الدرجة كاملة

وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم

صفوة معلمي الكويت

تابع / السؤال الثالث :

نموذج الاجابة

(جـ) في الجدول التالي اختر من القائمة (ب) النوع المناسب للقائمة (أ) : (4x½=2)

م	القائمة (أ)		القائمة (ب)	
1	القاعدة المرافقة للماء	2	CH_3COOH	ص 126
2	من الأحماض الضعيفة	4	H_2O	ص 103
3	قاعدة تتأين بشكل تام في الماء	1	OH^- أو 4	ص 103
4	يسلك سلوكا مترددا		HCl	
		3	NaOH	ص 125

وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم

لجنة تقدير الدرجات

درجة السؤال الثالث 8

صفوة معلمي الكويت

نموذج الاجابة

السؤال الرابع: (أ) علل لما يلي تعليلا علميا صحيحا (3X1=3)

1- يأخذ الغاز شكل وحجم الإناء الحاوي له.

لأنه لا توجد قوى تجاذب أو تنافر بين جسيمات الغاز وبالتالي تتحرك الغازات بحرية داخل الأوعية التي تشغلها. ص 15

أو قوى التجاذب ضعيفة أو وسط لطاقة الحركية للغاز كبيرة أو المسافات البينية بين جسيمات الغاز كبيرة

2- التفاعل التالي: $Fe_{(s)} + S_{(s)} \longrightarrow FeS_{(s)}$

يعتبر من التفاعلات العكوسة العتجانسة. ص 70

لأنها تفاعلات لا تستمر في اتجاه واحد وجميع المواد المتفاعلة والناتجة من التفاعل في حالة واحدة من حالات المادة.

د رجة ڤا ملة

3- في التفاعل التالي: $AlCl_3 + Cl^- \longrightarrow AlCl_4^-$

يعتبر أنيون الكلوريد Cl^- قاعدة لويس. بينما يعتبر كلوريد الألمنيوم $AlCl_3$ حمض لويس. ص 104

أنيون الكلوريد يمنح زوج من الإلكترونات لذلك يعمل كقاعدة لويس . بينما كلوريد الألمنيوم يستقبل زوج الإلكترونات لذلك يعمل كحمض لويس.

(ب) أكمل الجدول التالي بكتابة الاسم العلمي أو الصيغة الكيميائية لكل من : (4x½=2)

صيغة المركب	اسم المركّب	
HF	حمض الهيدروفلوريك	ص 108
HClO	حمض الهيبوكلوروز	ص 110
NH_3	الأمونيا	ص 126
LiOH	هيدروكسيد الليثيوم	ص 110

وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم
صفوة علمي الكويت

نموذج الاجابة

تابع / السؤال الرابع: (1x3=3)

(جـ) أجب عما يلي:

تُرك محلول حمض الفورميك في الماء حتى حدث الاتزان التالي :

$$HCOOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons HCOO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

فإذا وُجد أن تركيز كاتيون الهيدرونيوم في المحلول عند الاتزان يساوي (4.2×10^{-3} M) ، فاحسب تركيز الحمض عند الاتزان. علما بأن قيمة ثابت الاتزان K_{eq} تساوي (1.764×10^{-4})

ص 76

الحل:

[HCOOH]	$[H_2O]$	$[HCOO^-]$	$[H_3O^+]$
x	1	4.2×10^{-3}	4.2×10^{-3}
		½	½

في حال كتب الطالب الاجابات بالتعويض في القانون يأخذ الدرجة كاملة

$K_{eq} = [HCOO^-][H_3O^+] / [HCOOH]$ 1½

$1.764 \times 10^{-4} = 4.2 \times 10^{-3} \times 4.2 \times 10^{-3} / [HCOOH]$

$[HCOOH] = 4.2 \times 10^{-3} \times 4.2 \times 10^{-3} / 1.764 \times 10^{-4}$

$[HCOOH] = 0.1$ M ½

درجة السؤال الرابع 8


وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم

صفوة معلمي الكويت

نموذج الاجابة

السؤال الخامس:

(أ) أدرس الشكل التالي ثم أجب عما يلي: (1X2=2) ص114



توضح الأعمدة البيانية وجود ثلاث أنواع من المحاليل المائية: (أ) ، (ب) ، (ج) تبعاً لتركيز $[H_3O^+]$ $[OH^-]$ عند 25^oC:

1- المحلول الحمضي يمثله الحرف (ب)

2- المحلول المتعادل يمثله الحرف (ج)

(ب) قارن بين كل اثنين مما يلي حسب وجه المقارنة المرفق في الجداول التالية: (8 X ½ = 4)

1-قارن أثر تغيّر العوامل التالية على موضع الاتزان في التفاعلات العكوسة: ص 77

وجه المقارنة	حرارة + $CH_3OH_{(g)}$ ⟵ $CO_{(g)} + 2H_{2(g)}$	$CO_{2(g)} + C_{(s)}$ + حرارة ⟵ $2CO_{2(g)}$
تسخين النظام	يزاح موضع الاتزان في اتجاه تكوين المواد المتفاعلة أو(الاتجاه العكسي)	يزاح موضع الاتزان في اتجاه تكوين المواد الناتجة أو(الاتجاه الطردي)
زيادة الضغط	يزاح موضع الاتزان في اتجاه تكوين المواد الناتجة أو(الاتجاه الطردي)	يزاح موضع الاتزان في اتجاه تكوين المواد المتفاعلة أو(الاتجاه العكسي)

وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم
نجيبة مقدير القرجساني
معلمي الكويت

تابع السؤال الخامس:

نموذج الاجابة


2- أكمل الجدول التالي: ص 34 ، 38 ، 41

وجه المقارنة	الغاز المثالي	الغاز الحقيقي
قوى التجاذب بين جسيمات الغاز (يوجد – لا يوجد)	لا يوجد	يوجد
إمكانية إسالته بالضغط والتبريد (يمكن – لا يمكن)	لا يمكن	يمكن

(جـ) استخدم المفاهيم التالية لإكمال خريطة المفاهيم : (4x½=2)

(الحجم ، الضغط ، $P_1 V_1 = P_2 V_2$ ، $V_1 / T_1 = V_2 / T_2$)

ص 24 ، 30 ، 32



معلمي الكويت

وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم

درجة السؤال الخامس: 8



نموذج الاجابة

السؤال السادس:

(أ) أجب عما يلي: (2x1=2)

الجدول التالي يوضح قيمة ثابت التأين K_a لمحاليل متساوية التركيز وعند درجة حرارة (25 °C):

اسم الحمض	حمض الهيدروسيانيك	حمض النيتروز	حمض البروبانويك
ثابت التأين K_a	4.9×10^{-10}	4.5×10^{-4}	1.3×10^{-5}

1- الحمض الأكثر قوة هو ... حمض النيتروز ... أو عكس الاجابة بصحيح

2- الحمض الأضعف هو ... حمض الهيدروسيانيك... ص 128 ثابت التأين أو الصيغ الكيميائية

(ب) ماذا تتوقع أن يحدث في الحالات التالية مع التفسير: (3 x 1 =3) أو أي إجابة صحيحة أخرى

1 – اصطدام السائق بالوسادة الهوائية في حادث مروري للسيارة التي يقوم بقيادتها؟

التوقع بالنسبة للغاز في الوسادة: ينضغط الغاز / يمتص الطاقة الناتجة عن التصادم ص 15

التفسير : جسيمات الغاز صغيرة للغاية بالنسبة للمسافات بينها / يسهل ضغط الغاز بسبب وجود الفراغ بين جزيئاته / للغاز قابلية للانضغاط فتقترب الجسيمات إلى بعضها البعض.

2- مضاعفة قيمة الضغط المؤثر على كمية محصورة من غاز (عند ثبات درجة الحرارة)؟ ص 23

التوقع لحجم الغاز: يقل للنصف. أو يقل

التفسير : يتناسب الحجم الذي تشغله كمية معينة من الغاز تناسباً عكسياً مع ضغط الغاز عند ثبوت درجة الحرارة. أو عند زيادة الضغط المؤثر تقل المسافات بين الجسيمات فيقل الحجم. أو أي تغير منطقي أو كتب العناوين

3- أضيف غاز أول أكسيد الكربون (CO) إلى النظام المتزن التالي: ص 79

$$Ni_{(s)} + 4CO_{(g)} \rightleftharpoons Ni(CO)_{4(g)}$$

التوقع لموضع الاتزان : يزاح موضع الاتزان باتجاه تكوين المواد الناتجة أو (الاتجاه الطردي). أو يحقق المتزامن

التفسير : تبعاً لمبدأ لوشاتيليه يزاح موضع الاتزان تعويضاً عن الاختلال في التركيز / إضافة مادة متفاعلة إلى تفاعل ما في حالة اتزان سوف تدفع التفاعل في اتجاه التفاعل الطردي ، أي في اتجاه تكوين المواد الناتجة.

معلمي الكويت

تابع / السؤال السادس :

نموذج الاجابة

(جـ) أجب عما يلي : (6 x½ =3)

أكمل الجدول التالي للمحاليل المختلفة : ص 115 ، 116 ، 117

المحلول	A	B	C	D
$[H_3O^+]$	1×10^{-10}	$\mathbf{1 \times 10^{-2}}$	1×10^{-9}	1×10^{-7}
$[OH^-]$	1×10^{-4}	1×10^{-12}	$\mathbf{1 \times 10^{-5}}$	1×10^{-7}
pH	10	**2**	9	7
pOH	**4**	12	5	7
نوع المحلول	قاعدي	حمضي	**قاعدي**	**متعادل**

درجة السؤال السادس 8

انتهت الأسئلة ونرجو لكم التوفيق

وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم
لجنة تقدير الدرجات

دولة الكويت (عدد الصفحات : 11)

وزارة التربية

التوجيه الفني العام للعلوم

امتحان نهاية الفترة الدراسية الأولى– العام الدراسي 2017-2018 م

المجال الدراسي : الكيمياء للصف الثاني عشر العلمي - الزمن : ساعتان

أولاً : الأسئلة الموضوعية (اجبارية)

السؤال الأول :

(أ) اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية: (6x¾=4½)

1- أقل درجة حرارة ممكنة والتي يساوي عندها متوسط الطاقة الحركية لجسيمات الغاز صفراً نظريا.

( )

2- عند ثبات الحجم فإن ضغط كمية معينة من الغاز يتناسب طردياً مع درجة حرارتها المطلقة .

( )

3- الذرات والأيونات والجزيئات يمكن أن تتفاعل وتكون نواتج عندما يصطدم بعضها مع بعض ، بطاقة حركية كافية في الإتجاه الصحيح . ( )

4- مادة تعارض تأثير المادة المحفزة مضعفة تأثيرها ما يؤدي إلى بطء التفاعلات أو انعدامها .

( )

5- محلول مائي يتساوى فيه تركيز H_3O^+ و OH^- . ( )

6- أحماض أو قواعد عضوية ضعيفة يتغير لونها تبعاً لقيمة الأس الهيدروجيني pH للوسط الذي يوضع فيه . ( )

صفوة معلمي الكويت


تابع / السؤال الأول :

(ب) أملأ الفراغات في الجمل و المعادلات التالية بما يناسبها : (6x1=6)

1- حجم 2 mol من غاز ثاني أكسيد الكربون ($CO_2 = 44$) ..... حجم 2 mol من غاز الاكسجين (O=16) عند نفس الظروف من الضغط و درجة الحرارة .

2- عند مزج الغاز A (ضغطه الجزئي يساوي 100 kPa) مع الغاز B (ضغطه الجزئي يساوي 70 kPa) في وعاء– ويفرض عدم تفاعل الغازين– فإن الضغط الكلي في الوعاء يساوي kPa .....

3- من خلال دراسة الشكل المقابل والذي يوضح تأثير المادة المحفزة على حاجز التنشيط ، فإن المنحنى المعبّر عن التفاعل في وجود المادة المحفزة هو .....




4- في التفاعل التالي :

$$2NaHCO_{3(s)} \rightleftharpoons Na_2CO_{3(s)} + H_2O_{(g)} + CO_{2(g)}$$

فإنه يمكن التعبير عن ثابت الاتزان بالمعادلة الرياضية التالية : .....

5- بناء على نظرية برونستد– لوري ، فإن كل حمض يرافق بقاعدة ، والقاعدة المرافقة لـ HSO_4^- هي ..... .

6- تركيز كاتيون الهيدرونيوم في محلول أسه الهيدروجيني pH يساوي 3.7 هو ..... .



صفوة معلمي الكويت

السؤال الثاني :

(أ) اكتب كلمة (صحيحة) بين القوسين المقابلين للعبارة الصحيحة و كلمة (خطأ) بين القوسين المقابلين للعبارة الخطأ في كل مما يلي : (6x¾=4½)

1- تستند آلية عمل الوسائد الهوائية إلى قابلية الغاز للانضغاط بسبب وجود فراغ بين جزيئاته .
( )

2- عدد الجزيئات التي توجد في نصف مول من غاز الكلور عند STP يساوي $3X10^{23}$ جزيء .
( )

3- يعتبر التفاعل التالي : $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$ كتفاعل عكوس غير متجانس.
( )

4- في التفاعلات الطاردة للحرارة فإن قيمة K_{eq} لا تتغيّر بتغيّر درجة الحرارة . ( )

5- محلولان A و B ، إذا كانت قيمة $[OH^-]$ في المحلول A تساوي 3×10^{-2} ، وقيمة $[OH^-]$ في المحلول B تساوي 1×10^{-7} ، فإنّ المحلول B هو الأكثر حمضية من المحلول A . ( )

6- إذا كان تركيز $[H_3O^+]$ في محلول مائي يساوي التركيز الابتدائي لحمض HA ، فإنّ الحمض يعتبر ضعيفاً . ( )

(ب) ضع علامة (✓) بين القوسين أمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من العبارات التالية :

(5x1=5)

1- عند ثبات درجة حرارة الغاز و حجمه فإن مضاعفة عدد جسيمات الغاز تؤدي إلى :

( ) مضاعفة الضغط ( ) زيادة الضغط أربعة أضعاف

( ) نقصان الضغط ( ) لا يتأثر الضغط

2- عدد اللترات التي يشغلها 1.5L من غاز الهيدروجين H_2 يساوي :

( ) 11.2L ( ) 22.4L

( ) 33.6L ( ) 44.8L

صفوة معلمي الكويت

تابع / السؤال الثاني (ب) :

3- في التفاعل التالي : $PCl_{5(g)} + heat \rightleftharpoons PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)}$

يمكن زيادة انتاج غاز الكلور (Cl_2) بـ :

( ) خفض درجة حرارة النظام ( ) زيادة تركيز PCl_3

( ) زيادة الضغط على النظام ( ) سحب غاز Cl_2 المتكون من التفاعل

4- صيغة حمض الهيبوبروموز هو :

$HBrO$ ( ) HBr ( )

$HBrO_2$ ( ) $HBrO_3$ ( )

5- حمضية المحاليل المائية التالية متساوية **ماعدا** :

$[H_3O^+]=1\times10^{-9}$ ( ) $pH=9$ ( )

$[OH^-]=1\times10^{-5}$ ( ) $pOH=9$ ( )

درجة السؤال الثاني

9½

صفوة معلمي الكويت

ثانياً : الأسئلة المقالية (اجبارية)

السؤال الثالث :

(أ) ما المقصود بكل من : (3x1=3)

1- قانون بويل :

.....

.....

2 – فرضية أفوجادرو:

.....

.....

3 – سرعة التفاعل الكيميائي:

.....

.....

(ب) أجب عما يلي : (1x3=3)

إذا كان حجم بالون مملوء بالغاز يساوي 15L عند درجة حرارة 40°C وضغط 130 kPa ، احسب حجم البالون عند الضغط ودرجة الحرارة القياسيين (STP) .

القانون :

التعويض :

صفوة معلمي الكويت

تابع / السؤال الثالث :

(جـ) في الجدول التالي اختر من القائمة (أ) النوع المناسب للقائمة (ب) : (4x½=2)

م	القائمة (أ)		القائمة (ب)
1	محلول متعادل		pH=5.6
2	محلول حمضي		$[H_3O^+] = [OH^-]$
3	محلول قاعدي		$-\log[H_3O^+]$
4	الأس الهيدروجيني		$[OH^-] = 3\times10^{-4}$
5	الأس الهيدروكسيدي		

درجة السؤال الثالث

8

صفوة معلمي الكويت

السؤال الرابع : (أ) علل لما يلي تعليلا علميا صحيحا : (3X1=3)

1- ينصح بعدم ملء إطارات السيارات بكمية زائدة من الهواء وخاصة في فصل الصيف.

.....

.....

2- سرعة تفاعل الكربون مع الاكسجين عند درجة حرارة الغرفة تساوي صفرا .

.....

.....

3-في تفاعل ثنائي إيثيل إيثر (C_2H_5-O-C_2H_5) مع ثلاثي فلوريد البورون (BF_3) ، يكون المركّب الأوّل قاعدة لويس والمركّب الثانّي حمضاً للويس .

.....

.....

(ب) أكمل الجدول التالي بكتابة الاسم العلمي أو الصيغة الكيميائية لكل من : (4x½=2)

صيغة المركب	اسم المركّب
	حمض الهيدرويوديك
$Fe(OH)_3$	
	حمض البيركلوريك
H_2CO_3	

(جـ) أجب عما يلي : (1x3=3)

إذا علمت أن قيمة ثابت الاتزان K_{eq} للتفاعل التالي :

$$H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$


تساوي 5.76×10^{-14} عند درجة حرارة 50°C . احسب تركيز كل من $[H_3O^+]$, $[OH^-]$ عند الاتزان.

8	درجة السؤال الرابع

صفوة معلمي الكويت

السؤال الخامس :

(أ) ادرس الشكل التالي ثم أجب عما يلي : (4x½=2)



توضح المنحنيات في الشكل السابق تغيّر تركيز كل من O_2 , SO_2 , SO_3 مع مرور الوقت،

في الشكل (أ) :

عند الاتزان يتساوى معدل سرعة كل من التفاعل الطردي والعكسي ، و يكون :

تركيز المتفاعلات ..... من تركيز النواتج ، وقيمة K_{eq} ..... من 1 .

بينما في الشكل (ب) :

عند الاتزان وبعد تساوي معدل سرعة كل من التفاعل الطردي والعكسي ، يكون :

تركيز المتفاعلات ..... من تركيز النواتج ، وقيمة K_{eq} ..... من 1 .

(ب) قارن بين كل من (8 X ½ = 4)

1- باستخدام قوانين الغازات قارن بين حجم كمية محددة من غاز عند تغيّر إحدى المتغيرات كما هو موضح في الجدول التالي :

وجه المقارنة	$P_2 = 2P_1$	$P_2 = 4P_1$
V_2 عند ثبوت درجة الحرارة	V_2 = ... V_1	V_2 = ... V_1
	$T_2 = 2T_1$	$T_2 = 4T_1$
V_2 عند ثبوت الضغط	V_2 = ... V_1	V_2 = ... V_1

صفوة معلمي الكويت


تابع / السؤال الخامس (ب) :

2-قارن أثر تغيّر العوامل التالية على موضع الاتزان في التفاعلات العكوسة التالية :-

وجه المقارنة	$N_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2NO_{(g)}$	$N_2O_{4(g)} \rightleftharpoons 2NO_{2(g)}$
زيادة الضغط		
زيادة تركيز المتفاعلات		

(جـ) استخدم المفاهيم التالية لإكمال خريطة المفاهيم : (4x½=2)

درجة الحرارة ثابتة ، الضغط ثابت ، $P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2$ ، $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$



صفوة معلمي الكويت

درجة السؤال الخامس

8 | 9

السؤال السادس :

(أ) ادرس الجدول التالي ثم اجب عما يلي : (4x½=2)

الحمض	معادلة التأين	ثابت تأين الحمض عند 25°C
حمض الأوكساليك	$HOOCCOOH_{(aq)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + HOOCCOO^-_{(aq)}$ $HOOCCOO^-_{(aq)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + OOCCOO^{2-}_{(aq)}$	$K_{a1}=5.6\times10^{-2}$ $K_{a2}=5.1\times10^{-5}$
حمض الفوسفوريك	$H_3PO_{4(aq)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + H_2PO_4^-{}_{(aq)}$ $H_2PO_4^-{}_{(aq)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + HPO_4^{2-}{}_{(aq)}$ $HPO_4^{2-}{}_{(aq)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + PO_4^{3-}{}_{(aq)}$	$K_{a1}=7.5\times10^{-3}$ $K_{a2}=6.2\times10^{-8}$ $K_{a3}=4.8\times10^{-13}$
حمض الكربونيك	$H_2CO_{3(aq)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + HCO_3^-{}_{(aq)}$ $HCO_3^-{}_{(aq)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + CO_3^{2-}{}_{(aq)}$	$K_{a1}=4.3\times10^{-7}$ $K_{a2}=4.8\times10^{-11}$

1-الحمض الاكثر تأيناً في الجدول هو .....

2- بمقارنة الحمضين H_2CO_3 و HCO_3^- فإن الحمض الأضعف هو .....

3-لحمض الفوسفوريك ثلاثة مراحل تأين ، و المرحلة الأكبر تأينا للحمض هي المرحلة .....

4- أي الحمضين أسهل في فقد البروتون $H_2PO_4^-$ أو HPO_4^{2-} ؟ .....

(ب) ماذا تتوقع أن يحدث في الحالات التالية مع التفسير : (6 x ½ =3)

1- عند صعود متسلق إلى أعلى قمة جبل إيفرست حيث أن الضغط الكلي للهواء الجوي = 33.72KPa علماً بأن الضغط للهواء الجوي عند سطح البحر =101.3KPa .

الحدث : .....

التفسير: .....

2- عند إلقاء عبوة رذاذ في النار عند درجة حرارة عالية .

الحدث : .....

التفسير : .....

3-سحب غاز الأمونيا (NH_3) الناتج من التفاعل المتزن التالي :

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$$

الحدث : .....

التفسير : .....

صفوة معلمي الكويت

تابع / السؤال السادس :

(جـ) أجب عما يلي :


يتأين حمض الأسيتيك CH_3COOH وحمض الميثانويك $HCOOH$ جزئياً في محلول مائي للحمض كلّ على حدة بتركيز (0.1M) لكل منهما ، عند قياس تركيز المواد الموجودة عند الاتزان تبيّن ما يلي :

$$[H_3O^+] = [CH_3COO^-] = 1.34\times10^{-3}M$$

$$[H_3O^+] = [HCOO^-] = 4.2\times10^{-3}M$$

أكمل الجدول التالي : (6 X ½ = 3)

المحلول	قيمة الأس الهيدروجيني للمحلول pH	قيمة ثابت التأين K_a	قوة الحمض
محلول حمض الأسيتيك			
محلول حمض الميثانويك			



درجة السؤال السادس 8



انتهت الأسئلة مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح

صفوة معلمي الكويت

دولة الكويت (عدد الصفحات : 11)

وزارة التربية **نموذج الاجابة**

التوجيه الفني العام للعلوم

امتحان نهاية الفترة الدراسية الأولى- العام الدراسي 2017-2018 م

المجال الدراسي : الكيمياء للصف الثاني عشر العلمي - الزمن : ساعتان

أولاً : الأسئلة الموضوعية (اجبارية)

السؤال الأول :

أ) اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية:

(6x3=18)

1- أقل درجة حرارة ممكنة والتي يساوي عندها متوسط الطاقة الحركية لجسيمات الغاز صفراً نظرياً ص29

(درجة الصفر المطلق)

2- عند ثبات الحجم فإن ضغط كمية معينة من الغاز يتناسب طردياً مع درجة حرارتها المطلقة . ص 32

(قانون جاي – لوساك)

3- الذرات والأيونات والجزيئات يمكن أن تتفاعل وتكون نواتج عندما يصطدم بعضها مع بعض ، بطاقة حركية كافية في الاتجاه الصحيح . ص 64

(نظرية التصادم)

4- مادة تعارض تأثير المادة المحفزة مضعفة تأثيرها ما يؤدي إلى بطء التفاعلات أو انعدامها . ص68

(مادة مانعة للتفاعل)

5- محلول مائي يتساوى فيه تركيز H_3O^+ و OH^- . ص113

(محلول متعادل)

6- أحماض أو قواعد عضوية ضعيفة يتغير لونها تبعاً لقيمة الأس الهيدروجيني pH للوسط الذي يوضع فيه . ص 121

(أدلة التعادل)

صفوة معلمي الكويت

Scanned by CamScanner

تابع / السؤال الأول :

نموذج الاجابة


(ب) املأ الفراغات في الجمل و المعادلات التالية بما يناسبها : (6x1=6)

1- حجم 2 mol من غاز ثاني أكسيد الكربون ($CO_2 = 44$) يساوي حجم 2 mol من غاز الأكسجين (O=16) عند نفس الظروف من الضغط و درجة الحرارة . ص 46

2- عند مزج الغاز A (ضغطه الجزئي يساوي 100 kPa) مع الغاز B (ضغطه الجزئي يساوي 70 kPa) في وعاء– ويفرض عدم تفاعل الغازين– فإن الضغط الكلي داخل الوعاء يساوي 170 kPa ص50

الطبعة المعتمدة بداية من العام الدراسي 2017-2018 وزارة التربية

3- من خلال دراسة الشكل المقابل والذي يوضح تأثير المادة المحفزة على حاجز التنشيط ، فإن المنحنى المعبّر عن التفاعل في وجود المادة المحفزة هو B



ص67

4- في التفاعل التالي : $2NaHCO_{3(s)} \rightleftharpoons Na_2CO_{3(s)} + H_2O_{(g)} + CO_{2(g)}$ ص75

فإنه يمكن التعبير عن ثابت الاتزان بالمعادلة الرياضية التالية : $K_{eq} = [H_2O] \times [CO_2]$

5- بناء على نظرية برونستد– لوري ، فإن كل حمض يرافق بقاعدة ، والقاعدة المرافقة لـ HSO_4^- هي SO_4^{2-} . ص 103

6- تركيز كاتيون الهيدروجينيوم في محلول أسه الهيدروجيني pH يساوي 3.7 هو $10^{-3.7}$ أو 2×10^{-4} أو 1.995×10^{-4} . ص120

درجة السؤال الأول 10%

صفوة معلمي الكويت

Scanned by CamScanner

نموذج الإجابة

السؤال الثاني :

(أ) اكتب كلمة (صحيحة) بين القوسين المقابلين للعبارة الصحيحة و كلمة (خطأ) بين القوسين المقابلين للعبارة الخطأ في كل مما يلي : (6×¾=4½)

1- تستند آلية عمل الوسائد الهوائية إلى قابلية الغاز للانضغاط بسبب وجود فراغ بين جزيئاته ص15

(صحيحة)

2- عدد الجزيئات التي توجد في نصف مول من غاز الكلور عند STP يساوي $3X10^{23}$ جزيء . ص24

(صحيحة)

3- يعتبر التفاعل التالي : $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$ كتفاعل عكوس غير متجانس. ص71

(خطأ)

4- في التفاعلات الطاردة للحرارة فإن قيمة K_{eq} لا تتغير بتغير درجة الحرارة ص80 (خطأ)

5- محلولان A و B ، إذا كانت قيمة $[OH^-]$ في المحلول A تساوي 3×10^{-2} ، وقيمة $[OH^-]$ في المحلول B تساوي 1×10^{-7} ، فإن المحلول B هو الأكثر حمضية من المحلول A ص115 (صحيحة)

6- إذا كان تركيز $[H_3O^+]$ في التركيز الابتدائي لحمض HA ، فإن الحمض يعتبر ضعيفاً . ص127

(خطأ)

(ب) ضع علامة (✓) بين القوسين أمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من العبارات التالية : (5×1=5)

1- عند ثبات درجة حرارة الغاز و حجمه فإن مضاعفة عدد جسيمات الغاز تؤدي إلى : ص38

(✓) مضاعفة الضغط

( ) زيادة الضغط أربعة أضعاف

( ) نقصان الضغط

( ) لا يتأثر الضغط

2- عدد اللترات التي يشغلها 1.5L من غاز الهيدروجين H_2 يساوي : ص52

( ) 11.2L

( ) 22.4L

(✓) 33.6L

( ) 44.8L

صفوة معلمي الكويت

Scanned by CamScanner

نموذج الاجابة

تابع / السؤال الثاني (ب) :

3- في التفاعل التالي : $PCl_{5(g)} + heat \rightleftharpoons PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)}$

يمكن زيادة انتاج غاز الكلور (Cl_2) بـ : ص80

( ) خفض درجة حرارة النظام ( ) زيادة تركيز PCl_3

( ) زيادة الضغط على النظام (✓) سحب غاز Cl_2 المتكون من التفاعل

4- صيغة حمض الهيبوبروموز ص109


HBrO (✓) HBr ( )

$HBrO_2$ ( ) $HBrO_3$ ( )

5- حمضية المحاليل المائية التالية متساوية ماعدا : ص119

$[H_3O^+]=1\times10^{-9}$ ( ) pH= 9 ( )

$[OH^-] = 1\times10^{-5}$ ( ) pOH = 9 (✓)



درجة السؤال الثاني

صفوة معلمي الكويت

Scanned by CamScanner

ثانيا . الأسئلة المقالية (اجبارية) **نموذج الاجابة**

السؤال الثالث :

(أ) ما المقصود بكل من : (3×1=3)

1- قانون بويل : ص24

يتناسب الحجم الذي تشغله كمية معينة من الغاز تناسبا عكسيا مع ضغط الغازعند درجة حرارة ثابتة .

2-فرضية أفوجادرو :

الحجـوم المتساوية من الغازات المختلفة عند درجة الحرارة والضغط نفسيهما تحتوي على أعداد متساوية من الجسيمات

3 – سرعة التفاعل الكيميائي : كمية المتفاعلات التي يحدث لها تغير في خلال وحدة الزمن . ص 64

(ب) أجب عما يلي : (1×3=3)

إذا كان حجم بالون مملوء بالغاز يساوي 15L عند درجة حرارة 40°C وضغط 130 kPa ، احسب حجم البالون عند الضغط ودرجة الحرارة القياسيين (STP) . ص34

½ $T_1 = 30 + 273 = 303° K$

$P_1 = 130\ kPa$

$V_1 = 15L$

$T_2 = 273\ K$

$P_2 = 101.3\ kPa$

$V_2 = ?$

القانون : 1 $P_1.V_1/T_1 = P_2.V_2/T_2$

التعويض : 1 $130\times15/303 = 101.3\times V_2/273$

½ $V_2 = 17.34\ L$

صفوة معلمي الكويت

Scanned by CamScanner

تابع / السؤال الثالث :

(جـ) في الجدول التالي اختر من القائمة (أ) النوع المناسب للقائمة (ب) : (4x½=2)

ص112

م	القائمة (أ)		القائمة (ب)
1	محلول متعادل	2	pH=5.6
2	محلول حمضي	1	$[H_3O^+] = [OH^-]$
3	محلول قاعدي	4	$-\log[H_3O^+]$
4	الأس الهيدروجيني	3	$[OH^-] = 3\times10^{-4}$
5	الأس الهيدروكسيدي		



درجة السؤال الثالث 8

صفوة معلمي الكويت
Scanned by CamScanner

السؤال الرابع :

نموذج الاجابة

(3X1=3)

(أ) علل لما يلي تعليلا علميا صحيحا :

1- ينصح بعدم ملء إطارات السيارات بكمية زائدة من الهواء وخاصة في فصل الصيف. ص32

لأنه عند ثبات الحجم فإن ضغط كمية من الغاز يتناسب طردياً مع درجة حرارته المطلقة وبالتالي يكون في أيام الصيف قابلاً للانفجار .

2- سرعة تفاعل الكربون مع الاكسجين عند درجة حرارة الغرفة تساوي صفرا . ص65

لأن تصادمات جزيئات المواد المتفاعلة غير فعالة و غير نشطة بدرجة كافية لكسر روابط O-O و C-C .

3-في تفاعل ثنائي إيثيل إيثر (C_2H_5-O-C_2H_5) مع ثلاثي فلوريد البورون (BF_3) ، يكون المركب الأول قاعدة لويس والمركب الثاني حمضاً للويس . ص104

لأن ذرة الأكسجين في مركب ثنائي إيثيل إيثر لديها زوج حر من الالكترونات (غير مرتبط) يستطيع منحه لذرة البورون التي لم يكتمل مستواه الأخير بـ 8 الكترونات وبالتالي يستطيع استقبال زوج الالكترونات .

(ب) أكمل الجدول التالي بكتابة الاسم العلمي أو الصيغة الكيميائية لكل من: (4x½=2) ص110

المركب	اسم المركب
HI	حمض الهيدرويوديك
$Fe(OH)_3$	هيدروكسيد الحديد الثلاثي
$HClO_4$	حمض البيركلوريك
H_2CO_3	حمض الكربونيك

(جـ) أجب عما يلي : ص75 (1x3=3)

إذا علمت أن قيمة ثابت الاتزان K_{eq} للتفاعل التالي :

$$H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

تساوي 5.76×10^{-14} عند درجة حرارة 50°C . احسب تركيز كل من $[H_3O^+]$, $[OH^-]$ عند الاتزان.

$K_{eq} = [OH^-] \times [H_3O^+]$ (1)

وفي المحاليل المتعادلة $[H_3O^+] = [OH^-] = X$ (1)

$X = (5.76\times10^{-14})^{½}$ (½)

$= 2.4\times10^{-7}$ (½)

درجة السؤال الرابع 8


صفوة معلمي الكويت

Scanned by CamScanner

نموذج الإجابة

السؤال الخامس :

(أ) ادرس الشكل التالي ثم أجب عما يلي : ص72 (4x½=2)



توضح المنحنيات في الشكل السابق تغير تركيز كل من O_2 , SO_2 , SO_3 مع مرور الوقت،

في الشكل (أ) :

عند الاتزان يتساوى معدل سرعة كل من التفاعل الطردي والعكسي ، و يكون :

تركيز المتفاعلات **أقل** من تركيز النواتج ، وقيمة K_{eq} **أكبر** من 1 .

بينما في الشكل (ب) :

عند الاتزان وبعد تساوي معدل سرعة كل من التفاعل الطردي والعكسي ، يكون :

تركيز المتفاعلات **أكبر** من تركيز النواتج ، وقيمة K_{eq} **أقل** من 1 .

(ب) قارن بين كل من (8 X ½ = 4)

1- باستخدام قوانين الغازات قارن بين حجم كمية محددة من غاز عند تغير إحدى المتغيرات كما هو موضح في الجدول التالي : ص23,28

وجه المقارنة	$P_2 = 2P_1$	$P_2 = 4P_1$
V_2 عند ثبوت درجة الحرارة	$V_2 =$ **½** V_1	$V_2 =$ **¼** V_1
	$T_2 = 2T_1$	$T_2 = 4T_1$
V_2 عند ثبوت الضغط	$V_2 =$ **2** V_1	$V_2 =$ **4** V_1

صفوة معلمي الكويت
Scanned by CamScanner

تابع / السؤال الخامس (ب) :

نموذج الاجابة


2-قارن أثر تغيّر العوامل التالية على موضع الاتزان في التفاعلات العكوسة التالية: ص77

وجه المقارنة	$N_{2(g)} + O_{2(g)} \leftrightarrows 2NO_{(g)}$	$N_2O_{4(g)} \leftrightarrows 2NO_{2(g)}$
زيادة الضغط	لا يتأثر موضع الاتزان	يتجه بالاتجاه العكسي (أو تكوين المواد المتفاعلة)
زيادة تركيز المتفاعلات	يتجه بالاتجاه الطردي (أو باتجاه تكوين المواد الناتجة)	يتجه بالاتجاه الطردي (أو باتجاه تكوين المواد الناتجة)

(جـ) استخدم المفاهيم التالية لاكمال خريطة مفاهيم : ص28 ، 24 (4x½=2)

درجة الحرارة ثابتة ، الضغط ثابت ، $P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2$ ، $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$





درجة السؤال الخامس 8

صفوة معلمي الكويت
Scanned by CamScanner

نموذج الاجابة

السؤال السادس :

(أ) ادرس الجدول التالي ثم اجب عما يلي ص 128 (4x½=2)

الحمض	معادلة التأين	ثابت تأين الحمض عند 25°C
حمض الأوكساليك	$HOOCCOOH_{(aq)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + HOOCCOO^-_{(aq)}$ $HOOCCOO^-_{(aq)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + OOCCOO^{2-}_{(aq)}$	$K_{a1}=5.6\times10^{-2}$ $K_{a2}=5.1\times10^{-5}$
حمض الفوسفوريك	$H_3PO_{4(aq)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + H_2PO_4^-{}_{(aq)}$ $H_2PO_4^-{}_{(aq)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + HPO_4^{2-}{}_{(aq)}$ $HPO_4^{2-}{}_{(aq)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + PO_4^{3-}{}_{(aq)}$	$K_{a1}=7.5\times10^{-3}$ $K_{a2}=6.2\times10^{-8}$ $K_{a3}=4.8\times10^{-13}$
حمض الكربونيك	$H_2CO_{3(aq)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + HCO_3^-{}_{(aq)}$ $HCO_3^-{}_{(aq)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + CO_3^{2-}{}_{(aq)}$	$K_{a1}=4.3\times10^{-7}$ $K_{a2}=4.8\times10^{-11}$

1-الحمض الاكثر تأيناً في الجدول هو ..... حمض الاوكساليك .....

2- بمقارنة الحمضين H_2CO_3 و HCO_3^- فإن الحمض الأضعف هو..... HCO_3^- .....

3-الحمض الفوسفوريك يتأين على ثلاث مراحل تأين ، و المرحلة الأكبر تأيدا للحمض هي المرحلة ..... الأولى ..... .

4- أي الأيونين $H_2PO_4^-$ أو HPO_4^{2-} يكون أكثر ثباتا ؟ ..... $H_2PO_4^-$ .....

(ب) ماذا تتوقع أن يحدث في الحالات التالية مع التفسير : (3 x ½ =2)

1- عند صعود متسلق إلى أعلى قمة جبل إيفرست حيث أنّ الضغط الكليّ للهواء الجوي = 33.72KPa

علماً بأن الضغط الهواء الجوي عند سطح البحر =101.3KPa . ص50

الحدث : يحدث اختناق أو صعوبة في التنفس .

التفسير : بسبب تناقص الضغط الجزئي للأكسجين و يصبح غير كاف للتنفس .

2- عند إلقاء عبوة رذاذ في النار عند درجة حرارة عالية .

الحدث : ينفجر الوعاء أو يرتفع الضغط كثيراً .

التفسير : التناسب طردي بين درجة الحرارة وضغط الغاز عند ثبوت الحجم . ص33

3-سحب غاز الأمونيا (NH_3) الناتج من التفاعل المتزن التالي :

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$$

الحدث : يختل الاتزان ويتجه بالاتجاه الطردي في اتجاه تكوين الأمونيا أو النواتج .

التفسير : حسب مبدأ لوشاتليه ، إذا حدث تغيّر العوامل التي تؤثر في نظام متزن يعدّل النظام نفسه إلى حالة اتزان جديدة بحيث يبطل أو يقلّ من تأثير هذا التغيير . ص78

صفوة معلمي الكويت

Scanned by CamScanner

السؤال السادس :

ب) أجب عما يلي : ص131

بيّن حمض الأسيتيك CH_3COOH وحمض الميثانويك $HCOOH$ جزئياً في محلول مائي للحمض كلّ على حدة بتركيز (0.1M) لكل منهما ، عند قياس تركيز المواد الموجودة عند الاتزان تبيّن ما يلي :

$$[H_3O^+] = [CH_3COO^-] = 1.34\times10^{-3}\,M$$

$$[H_3O^+] = [HCOO^-] = 4.2\times10^{-3}\,M$$

أكمل الجدول التالي : (6 X ½ = 3)

المحلول	قيمة الأس الهيدروجيني للمحلول pH	قيمة ثابت التأين K_a	قوة الحمض
محلول حمض الأسيتيك	$-\log 1.34\times10^{-3}$ $=2.87$	$K_a = [H_3O^+]\times[CH_3COO^-]/C_a$ $= 1.79\times10^{-5}$	اضعف
محلول حمض الميثانويك	$-\log 4.2\times10^{-3}$ $=2.38$	$K_a = [H_3O^+]\times[HCOO^-]/C_a$ $= 1.76\times10^{-4}$	اقوى

وزارة التربية ديوان عام الوزارة المديرية التعليمية الأولى لمنطقة الجهراء 2017-2018

درجة السؤال السادس

8

انتهت الأسئلة مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح

صفوة تعليمي الكويت

Scanned by CamScanner

دولة الكويت (الأسئلة في (11) صفحة)

وزارة التربيـــــــــــة

التوجيه الفني العـــام للعلـــــوم

امتحان نـهاية الفترة الدراسية الأولى – العام الدراسي 2016 / 2017 م

المجال الدراسي : الكيمياء للصف الثاني عشر – العلمي الزمن : ساعتان وربع

==========

أولاً : الأسئلة الموضوعية (20 درجة)

السؤال الأول :

(أ) **اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي يدل عليه كل من العبارات التالية** :(6 x ¾ = 4½)

1- العامل الذي ينتج عن تصادم جسيمات الغاز بجدران الوعاء الذي يحتوي عليه . (----------)

2- يتناسب حجم كمية معينة من الغاز تناسبا طرديا مع درجة حرارته المطلقة بالكلفن عند ثبات الضغط وكمية الغاز. (----------)

3- الغاز الذي يختلف في سلوكه عن سلوك الغاز المثالي والذي يمكن إسالته وتحويله إلى صلب بالتبريد وتحت تأثير الضغط في بعض الأحيان . (----------)

4- عند ثبات درجة الحرارة ، تتناسب سرعة التفاعل الكيميائى طردياً مع تركيزات المواد المتفاعلة كل مرفوع إلى أس يساوى عدد المولات أمام كل مادة فى المعادلة الكيميائية الموزونة .

(----------)

5- الجزيئات أو الأيونات التي لها قدرة على إعطاء زوج من الإلكترونات الحرة .

(----------)

6-التفاعل الذي يحدث بين جزيئي ماء لإنتاج أنيون هيدروكسيد وكاتيون هيدرونيوم . (----------)

صفوة معلمي الكويت

تابع السؤال الأول::

ضع علامة (√) في القوس المقابل للإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من الجمل التالية:(5×1=5)

1- درجة الحرارة التي يكون عندها متوسط الطاقة الحركية لغاز تساوي الصفر نظريا:

( ) 273 °C ( ) 273 K

( ) – 273 °C ( ) −20 °C

2- عدد المولات التي تحتويها كرة مجوّفة حجمها 685L من غاز الهيليوم عند درجة حرارة 621 K

وضغط غاز 1.89×10^3 kPa يساوي : (علما بأن R= 8.31 kPa.L/mol.K)

( ) 155.7mol ( ) 250.8mol

( ) 432.3mol ( ) 621mol

3- إذا كانت قيمة ثابت الإتزان للتفاعل المتزن التالي: $CaCO_{3(s)} \rightleftharpoons CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$ يساوي 0.2 فإن :

( ) سرعة التفاعل الطردي أكبر من العكسي ( ) سرعة التفاعل العكسي أكبر من الطردي

( ) تركيز $[CO_2]$ عند الإتزان يساوي 0.2 ( ) تركيز $[CO_2]$ عند الاتزان يساوي 5

4- – في التفاعل التالي : $NH_{3(g)} + H_3O^+_{(aq)} \rightleftharpoons NH_4^+{}_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}$

( ) الأمونيا حمض مرافق لكاتيون الأمونيوم ( ) الماء يسلك حمض برونستد – لوري

( ) كاتيون الهيدرونيوم قاعدة مرافقة للماء ( ) يسلك الماء قاعدة لويس .

5- محلول لحمض ضعيف احادي البروتون تركيزه (0.2 M) وتركيز كاتيون الهيدرونيوم فيه يساوي

(9.86×10^{-4} M) فإن الأس الهيدروجيني (pH) للمحلول يساوي :

( ) 3 ( ) 10

( ) 9.86 ( ) 5×10^{-6}

9½

السؤال الثاني :

(أ) املأ الفراغات في الجمل و العبارت التالية بما يناسبها علمياً : (6 x 1 = 6)

1- متوسط الطاقة الحركية لجسيمات الغاز تتناسب --------- مع درجة الحرارة المطلقة بالكلفن .

2- عدد الجزيئات الموجودة في (2 لتر) من غاز الهيدروجين --------- عدد الجزيئات الموجودة في (2) لتر من غاز الأكسجين عند نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة .

3- إذا كان التعبير عن ثابت الاتزان لأحد التفاعلات الغازية هو $K_{eq}=\frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}$ فتكون معادلة التفاعل الكيميائي هي ---------- .

4- الصيغة الكيميائية لحمض الكلوريك هي الصيغة --------- .

5- محلول مائي له قيمة أس هيدروجيني (pH) تساوي (3.7)يكون تركيز كاتيون الهيدرونيوم $[H_3O^+]$ في هذا المحلول يساوي ---------- .

6- تزداد قوة الحمض الضعيف كلما تكون قيمة pK_a له ----------

(ب) اكتب كلمة (صحيحة) بين القوسين المقابلين للعبارة الصحيحة ، وكلمة (خطأ) بين القوسين المقابلين للعبارة غير الصحيحة في كل مما يلي : (6 x ¾ = 4½)

1- الكمية الكلية للطاقة الحركية تظل ثابتة أثناء الاصطدام . ( )

2- إذا تضاعفت درجة الحرارة المطلقة عند ثبات حجم الوعاء يتضاعف متوسط الطاقة الحركية لجسيمات الغاز . ( )

3- حجم المول الواحد من الغاز المثالي عند الظروف القياسية يساوى (1 L). ( )

4- تتغير قيمة ثابت الاتزان عند تغيير درجة حرارة النظام المتزن . ( )

5- الزوج التالي (NO_3^- , NO_2^-) يكونان زوجاً مترافقاً حسب مفهوم برونستد– لوري للأحماض والقواعد . ( )

6- يمثل الصفر على مقياس pH حمضاً قوياً جداً . ( )

10½

صفوة معلمي الكويت

ثانيا : الأسئلة المقاليـــــــة (32 درجة)

أجب عن جميع الأسئلة التالية

السؤال الثالث :

(أ) ما المقصود بكل مما يلي :(2 x 1½ = 3)

1- نظرية التصادم :

2- حمض أرهينيوس :

(ب) علل لما يلي تعليلاً علمياً سليماً موضحاً إجابتك بالمعادلات الكيميائية الرمزية : (درجتان)

- يسلك الماء سلوكا مترددا حسب نظرية برونشتد- لوري .

صفوة معلمي الكويت

تابع السؤال الثالث:

(جـ) حل المسألة التالية :- (3 درجات)

إناء حجمه (1.5 L) به غاز هيليوم تحت ضغط (81 kPa) ، وآخر حجمه (1.2 L) به غاز أكسجين تحت ضغط (162 kPa) ، فإذا تم نقل الغازين إلى إناء جديد حجمه (3 L) ،

فاحسب الضغط داخل هذا الإناء عند ثبوت درجة الحرارة .

الحل _____ :

العلاقة الرياضية :

التعويض :

8

صفوة معلمي الكويت

السؤال الرابع :

(أ) **علل لما يلي تعليلاً علمياً سليماً:** (2 x 1½ = 3)

1-عند الضغط على صمام عبوة الرذاذ تندفع المادة المستخدمة للخارج .

2- تفاعل كاتيون الهيدروجين H^+ مع جزئ الماء H_2O كحمض وقاعدة لويس .

(ب) **أكمل خريطة المفاهيم التالية موضحاً سلوك الجسيمات أثناء التفاعل :**(درجتان)

تتصادم ولا يحدث تفاعل / تصادم مؤثر / الجسيمات تمتلك طاقة تنشيط أكبر من طاقة التفاعل / نظرية التصادم / تتصادم ويحدث تفاعل / الجسيمات تمتلك طاقة تنشيط أقل من طاقة التفاعل / تصادم غير مؤثر



صفوة معلمي الكويت

تابع السؤال الرابع

(جـ) حل المسألة التالية :- (3 درجات)

تفاعل ثاني أكسيد الكبريت مع الأكسجين في وعاء حجمه (5L) لتكوين ثالث أكسيد الكبريت وعند درجة حرارة معينة حدث الإتزان التالي : $2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2SO_{3(g)}$

وعند الإتزان كان عدد مولات كل من SO_3 ،O_2، SO_2هو(0.3، 0.2, 0.4) على الترتيب

احسب قيمة ثابت الاتزان (K_{eq}) في هذه الظروف .

الحـــــــــــل:

العلاقة الرياضية:

التعويض:

8

السؤال الخامس :

(أ) ما المقصود بكل مما يلي : (2 x 1½ = 3)

1- فرضية أفوجادرو :

2- التفاعلات غير العكسية :

(ب) اكتب الاسم أو الصيغة الكيميائية لكل من المركبات التالية: (4 x ½ = 2)

اسم المركب	الصيغة الكيميائية للمركب
حمض الهيدروفلوريك	----------
----------	H_3PO_4
حمض الكبريتوز	----------
----------	HBr

صفوة معلمي الكويت

تابع السؤال الخامس:

(ج) حل المسألة التالية : (3 درجات)

محلول مائي من حمض الأسيتيك أحادي الكلور M (0.18) وتركيز كاتيون الهيدرونيوم فيه يساوي $1.58X10^{-2}$ ، *احسب قيمة ثابت التأين Ka لهذا الحمض .*

الحـــــــــــــــل:

العلاقة الرياضية :

التعويض :

8

السؤال السادس :

(أ) ماذا تتوقع أن يحدث في كل من الحالات التالية ، مع التفسير ؟ : (2 x 1½ = 3)

1- لبالون مملوء بغاز النيتروجين عند وضعه في وعاء به ثلج .

التوقع : ----------

التفسير: ----------

2- لعمال المناجم عند تعرضهم لغبار الفحم المعلق والمتناثر في الهواء .

التوقع : ----------

التفسير: ----------

(ب) أكمل الجدول التالي : (6 x ½ = 3)

المحلول المائي	$[H_3O^+]$	$[OH^-]$	pH	طبيعة المحلول (حمضي – قلوي – متعادل)
A	$2.4x10^{-6}$ M	----------	----	----------
B	----------	----------	8.037	----------

صفوة معلمي الكويت

تابع السؤال السادس:

(جـ) اختر من العمود (ب) ما يناسب العمود (أ) بوضع رقمه في المربع المقابل : (4 x ½ = 2)

الرقم	العمود (أ)	الرقم	العمود (ب)
	العلاقة الرياضية للقانون الموحد للغازات	1	انخفاض درجة حرارة الغاز المحبوس
	من العوامل التي تؤثر في ضغط الغاز	2	$PV = K$
	تعرف المجموعة القياسية STP للغازات بأنها	3	$P_1V_1/T_1=P_2V_2/T_2$
	العلاقة الرياضية لقانون بويل	4	273 K و 101.3 KPa
		5	حركة جسيمات الغاز بسرعة في حركة عشوائية ثابتة في مسارات مستقيمة

8

انتهت الأسئلة مع أطيب تمنياتنا بالنجاح والتوفيق ،،،

صفوة معلمي الكويت

دولة الكويت (الأسئلة في (11) صفحة)

وزارة التربيـــــــــة

نموذج الإجابة

التوجيه الفني العـــام للعلـــــوم

امتحان نـهاية الفترة الدراسية الأولى – العام الدراسي 2016 / 2017 م

المجال الدراسي : الكيمياء للصف الثاني عشر – العلمي الزمن : ساعتان وربع

أولاً : الأسئلة الموضوعية (20 درجة)

السؤال الأول :

(أ) اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي يدل عليه كل من العبارات التالية : (6 x ¾ = 4½)

1- العامل الذي ينتج عن تصادم جسيمات الغاز بجدران الوعاء الذي يحتوي عليه. (ضغط الغاز) ص17

2- يتناسب حجم كمية معينة من الغاز تناسبا طرديا مع درجة حرارته المطلقة بالكلفن عند ثبات الضغط وكمية الغاز. (قانون تشارلز) ص29

3- الغاز الذي يختلف في سلوكه عن سلوك الغاز المثالي والذي يمكن إسالته وتحويله إلى صلب بالتبريد وتحت تأثير الضغط في بعض الأحيان . (الغاز الحقيقي) ص 41

4- عند ثبات درجة الحرارة ، تتناسب سرعة التفاعل الكيميائي طردياً مع تركيزات المواد المتفاعلة كل مرفوع إلى أس يساوى عدد المولات أمام كل مادة في المعادلة الكيميائية الموزونة. (قانون فعل الكتلة) ص72

5- الجزيئات أو الأيونات التي لها قدرة على إعطاء زوج من الإلكترونات الحرة .(قاعدة لويس) ص104

6-التفاعل الذي يحدث بين جزيئي ماء لإنتاج أنيون هيدروكسيد وكاتيون هيدرونيوم.

(التأين الذاتي للماء) ص113

Scanned by CamScanner

نموذج الإجابة

تابع السؤال الأول::

ضع علامة (√) في القوس المقابل للإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من الجمل التالية:(5×1=5)

1- درجة الحرارة التي يكون عندها متوسط الطاقة الحركية لغاز تساوي الصفر نظريا: ص 29

( ) 273 °C ( ) 273 K

(√) - 273 °C ( ) -20 °C

2- عدد المولات التي تحتويها كرة مجوّفة حجمها 685L من غاز الهيليوم عند درجة حرارة 621 K

وضغط غاز 1.89×10^3 kPa يساوي : (علما بأن R= 8.31 kPa.L/mol.K) ص39

( ) 155.7mol (√) 250.8mol

( ) 432.3mol ( ) 621mol

3- إذا كانت قيمة ثابت الإتزان للتفاعل المتزن التالي: $CaCO_{3(s)} \rightleftharpoons CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$ يساوي 0.2 فإن : ص75

( ) سرعة التفاعل الطردي أكبر من العكسي ( ) سرعة التفاعل العكسي أكبر من الطردي

(√) تركيز $[CO_2]$ عند الإتزان يساوي 0.2 ( ) تركيز $[CO_2]$ عند الاتزان يساوي 5

4- في التفاعل التالي : $NH_{3(g)} + H_3O^+_{(aq)} \rightleftharpoons NH_4^+{}_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}$ ص106

( ) الأمونيا حمض مرافق لكاتيون الأمونيوم ( ) الماء يسلك حمض برونستد – لوري

( ) كاتيون الهيدرونيوم قاعدة مرافقة للماء (√) يسلك الماء قاعدة لويس .

5- محلول لحمض ضعيف احادي البروتون تركيزه (0.2 M) وتركيز كاتيون الهيدرونيوم فيه يساوي (9.86×10^{-4} M) فإن الأس الهيدروجيني (pH) للمحلول يساوي : ص132

(√) 3 ( ) 10

( ) 9.86 ( ) 5×10^{-6}

9½

الطبعة السرية ديوان عام الوزارة
وزارة التربية
2016-2017
الفترة الدراسية الأولى نسخة الاختبار

صفوة علمي الكويت
Scanned by CamScanner

السؤال الثاني : نموذج الإجابة

(أ) املأ الفراغات في الجمل و العبارات التالية بما يناسبها علميا : (6 x 1 = 6)

1- متوسط الطاقة الحركية لجسيمات الغاز تتناسب طرديا مع درجة الحرارة المطلقة بالكلفن . ص 15

2- عدد الجزيئات الموجودة في (2 لتر) من غاز الهيدروجين يساوي عدد الجزيئات الموجودة في (2) لتر من غاز الأكسجين عند نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة . ص 46

3- إذا كان التعبير عن ثابت الاتزان لأحد التفاعلات الغازية هو $K_{eq}=\frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}$ فتكون معادلة التفاعل الكيميائي هي $N_{2(g)} + 3\ H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$. ص74

4- الصيغة الكيميائية لحمض الكلوريك هي الصيغة $HClO_3$. ص110

5- محلول مائي له قيمة أس هيدروجيني (pH) تساوي (3.7)يكون تركيز كاتيون الهيدرونيوم $[H_3O^+]$ في هذا المحلول يساوي $1.99 \times 10^{-4}\ M$. ص120

6- تزداد قوة الحمض الضعيف كلما تكون قيمة pK_a له قليلة . او أقل ص 128

(ب) اكتب كلمة (صحيحة) بين القوسين المقابلين للعبارة الصحيحة ، وكلمة (خطأ) بين القوسين المقابلين للعبارة غير الصحيحة في كل مما يلي : (6 x ¾ = 4½)

1- الكمية الكلية للطاقة الحركية تظل ثابتة أثناء الاصطدام . (صحيحة) ص 15

2- إذا تضاعفت درجة الحرارة المطلقة عند ثبات حجم الوعاء يتضاعف متوسط الطاقة الحركية لجسيمات الغاز . (صحيحة) ص 20

3- حجم المول الواحد من الغاز المثالي عند الظروف القياسية يساوى (1 L). (خطأ) ص 38

4- تتغير قيمة ثابت الاتزان عند تغيير درجة حرارة النظام المتزن . (صحيحة) ص 80

5- الزوج التالي (NO_3^- , NO_2^-) يكونان زوجاً مترافقاً حسب مفهوم برونستد– لوري للأحماض والقواعد . (خطأ) ص103

6- يمثل الصفر على مقياس pH حمضاً قوياً جداً . (صحيحة) ص 134

10½

صفوة معلمي الكويت

Scanned by CamScanner

ثانياً : الأسئلة المقاليـــــــة (32 درجة) | **نموذج الإجابة**

أجب عن جميع الأسئلة التالية

السؤال الثالث :

(أ) ما المقصود بكل مما يلي :(2 x 1½ = 3)

1- نظرية التصادم :

الذرات والأيونات والجزيئات يمكن أن تتفاعل وتكون نواتج عندما يصطدم بعضها ببعض ، بطاقة حركية كافية في الاتجاه الصحيح . ص 64

2- حمض أرهينيوس :

مركبات تحتوي على هيدروجين وتتأين لتعطي كاتيون الهيدروجين H^+ في المحلول المائي. ص 98

(ب) علل لما يلي تعليلاً علمياً سليماً موضحاً إجابتك بالمعادلات الكيميائية الرمزية : (درجتان)

- يسلك الماء سلوكاً متردداً حسب نظرية برونشتد– لوري .

لأنه في بعض التفاعلات يسلك سلوك الحمض و يمنح البروتون ، وفي بعض التفاعلات يسلك سلوك القاعدة و يستقبل البروتون. ص 103

$H_2O_{(l)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$

أو أي إجابة أخرى صحيحة موزونة بالمعادلة

في حال كتب المعادلة فقط يأخذ درجة كاملة .



صفوة معلمي الكويت

Scanned by CamScanner

تابع السؤال الثالث :

نموذج الإجابة

(جـ) حل المسألة التالية :- (3 درجات)

إناء حجمه (1.5 L) به غاز هيليوم تحت ضغط (81 kPa) ، وآخر حجمه (1.2 L) به غاز أكسجين تحت ضغط (162 kPa) ، فإذا تم نقل الغازين إلى إناء جديد حجمه (3 L) ،

فاحسب الضغط داخل هذا الإناء عند ثبوت درجة الحرارة . ص50

الحل :

العلاقة الرياضية :

$P_2 = P_1 \times V_1 / V_2$ ①

التعويض :

الضغط الجزئي للهيليوم (P_{He}) = 81x1.5/3 = 40.5 kPa (½)

الضغط الجزئي للأكسجين (P_{O2}) = 162x1.2/3 =64.8 kPa (½)

الضغط الكلي في الإناء الجديد (P_T)= P_{He} + P_{O2} (½)

= 40.5 + 64.8= 105.3 kPa (½)

8

صفوة معلمي الكويت

Scanned by CamScanner

نموذج الإجابة

السؤال الرابع :

(أ) علل لما يلي تعليلاً علمياً سليماً: (2 x 1½ = 3)

1-عند الضغط على صمام عبوة الرذاذ تندفع المادة المستخدمة للخارج . ص19

وذلك لان العبوات تحتوي على ضغط عالي وعند الضغط على الصمام نحدث فتحة تعمل على نقل الغاز الدفعي ذو الضغط العالي داخل العبوة الى المنطقة الخارجية ذات الضغط المنخفض .


2- تفاعل كاتيون الهيدروجين H^+ مع جزيء الماء H_2O كحمض وقاعدة لويس . ص 106

جزيء الماء يعطي زوج من الالكترونات الحرة لكاتيون الهيدروجين ليكونا معاً كاتيون هيدرونيوم .

$$H^+ + H_2O \longrightarrow H_3O^+$$

(ب) أكمل خريطة المفاهيم التالية موضحاً سلوك الجسيمات أثناء التفاعل :(درجتان) ص 64

تتصادم ولا يحدث تفاعل / تصادم مؤثر / الجسيمات تمتلك طاقة تنشيط أكبر من طاقة التفاعل / نظرية التصادم / تتصادم ويحدث تفاعل / الجسيمات تمتلك طاقة تنشيط أقل من طاقة التفاعل / تصادم غير مؤثر



Scanned by CamScanner

تابع السؤال الرابع :

نموذج الإجابة

(جـ) حل المسألة التالية :- (3 درجات)

تفاعل ثاني أكسيد الكبريت مع الأكسجين في وعاء حجمه (5L) لتكوين ثالث أكسيد الكبريت وعند درجة حرارة معينة حدث الإتزان التالي : $2\,SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2SO_{3(g)}$

وعند الاتزان كان عدد مولات كل من SO_3 ،O_2، SO_2هو(0.3 ،0.2، 0.4) على الترتيب

احسب قيمة ثابت الاتزان (K_{eq}) في هذه الظروف . ص 75

الحل :

من حال عكس الترتيب للأرقام بالحساب الصحيح

العلاقة الرياضية:

تركيز SO_3 عند الاتزان	تركيز O_2 عند الاتزان	تركيز SO_2 عند الاتزان
$[SO_3] = 0.3 / 5 = 0.06$ M (½)	$[O_2] = 0.2 / 5 = 0.04$ M (½)	$[SO_2] = 0.4 / 5 = 0.08$ M (½)

تحسب درجة كاملة

تطبيق قانون فعل الكتلة على التفاعل المتزن $K_{eq} = [SO_3]^2 / [SO_2]^2\,[O_2]$ (½)

التعويض:

التعويض عن تركيزات المتفاعلات والنواتج عند الاتزان في العلاقة السابقة :

$K_{eq} = (0.06)^2 / (0.08)^2 \times (0.04) = 14.06$ (1)

8

صفوة معلمي الكويت
Scanned by CamScanner

نموذج الإجابة

السؤال الخامس :

(أ) ما المقصود بكل مما يلي : (2 x 1½ = 3)

1- فرضية أفوجادرو :

الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة عند درجة الحرارة والضغط نفسيهما تحتوي على أعداد متساوية من الجسيمات .

ص 46

2- التفاعلات غير العكسية :

تفاعلات تحدث في اتجاه واحد حتى تكتمل بحيث لا تستطيع المواد الناتجة منالتفاعل أن تتحد بعضها مع بعض لتكوين المواد المتفاعلة مرة أخرى .

ص70

(ب) اكتب الاسم أو الصيغة الكيميائية لكل من المركبات التالية: (4 x ½ = 2) ص 108

اسم المركب	الصيغة الكيميائية للمركب
حمض الهيدروفلوريك	HF
حمض الفوسفوريك الأورثوفوسفوريك	H_3PO_4
حمض الكبريتوز	H_2SO_3
حمض الهيدروبروميك	HBr

المطبعة السرية ديوان عام الوزارة 2016-2017 الفترة الدراسية الأولى نسخة

صفوة معلمي الكويت

Scanned by CamScanner

تابع / السؤال الخامس

نموذج الإجابة

(ج) حل المسألة التالية : (3 درجات)

محلول مائي من حمض الأسيتيك أحادي الكلور تركيزه M (0.18) وتركيز كاتيون الهيدرونيوم فيه يساوي $1.58X10^{-2}$ ، احسب قيمة ثابت التأين Ka لهذا الحمض . ص132

الحل :

العلاقة الرياضية:

معادلة تأين حمض الأسيتيك :

$$CH_2Cl\,COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons CH_2Cl\,COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

لثابت تأين الحمض Ka لهذا التفاعل هي $Ka = \frac{[H3O][CH2Cl\,COO]}{[CH2ClCOOH]}$

تراكيز الحمض المتبقي $= 0.18 - 1.58 \times 10^{-2} = 0.164\ M$

$[H_3O^+] = [HCH_2Cl\,COO^-] = 1.58 \times 10^{-2}\ M$

التعويض:

ثابت التأين Ka للحمض $= \frac{(1.58 \times 10-2)X(1.58 \times 10-2)}{0.164} = 1.52 \times 10^{-3}$

أو أي حل آخر صحيح

8

الطبعة السرية ديوان عام الوزارة 2016-2017 الفترة الدراسية الأولى نسخة الإجابة (9)

معلمي الكويت صفوة

Scanned by CamScanner

نموذج الإجابة

السؤال السادس :

(أ) ماذا تتوقع أن يحدث في كل من الحالات التالية ، مع التفسير ؟ : (2 x 1½ = 3)

1- لبالون مملوء بغاز النيتروجين عند وضعه في وعاء به ثلج . ص29

التوقع : ينكمش/ويقل حجم البالون (½)

التفسير : أو أي تفسير سليم صحيح

وذلك حسب قانون تشالز كلما قلت درجة الحرارة كلما قل الحجم (علاقة طردية بين الحجم ودرجة الحرارة). (١)

2- لعمال المناجم عند تعرضهم لغبار الفحم المطق والمتناثر في الهواء . ص67

التوقع : انفجار المنجم (½) أو اصابة العمال بأمراض تنفسية

التفسير : الحجم الصغير لحبيبات الفحم تعمل على زيادة مساحة السطح المعرض للتفاعل (١)

التفسير صحيح الاجابة غير

وبالتالي يزداد معدل التصادمات وتزداد سرعة التفاعل .

(ب) أكمل الجدول التالي : (6 x ½ = 3) ص115

المحلول المائي	$[H_3O^+]$	$[OH^-]$	pH	طبيعة المحلول (حمضي – قلوي – متعادل)
A	2.4×10^{-6} M	4.16×10^{-9} M	5.619	حمضي
B	9.17×10^{-9}M	1.09×10^{-6} M	8.037	قلوي

الطبعة المصرية ديوان عام الوزارة وزارة التربية 2016-2017 الفترة الدراسية الأولى نسخة التجريبية

صفوة معلمي الكويت

Scanned by CamScanner

نموذج الإجابة

تابع / السؤال السادس

(جـ) اختر من العمود (ب) ما يناسب العمود (أ) بوضع رقمه في المربع المقابل : (4 x ½ = 2)

الرقم	العمود (أ)	الرقم	العمود (ب)
3	العلاقة الرياضية للقانون الموحد للغازات ص34	1	انخفاض درجة حرارة الغاز المحبوس
1	من العوامل التي تؤثر في ضغط الغاز ص17	2	$PV = K$
4	تعرف المجموعة القياسية STP للغازات بأنها ص46	3	$P_1V_1/T_1=P_2V_2/T_2$
2	العلاقة الرياضية لقانون بويل . ص 23	4	101.3 KPa و 273 K
		5	حركة جسيمات الغاز بسرعة في حركة عشوائية ثابتة في مسارات مستقيمة

8

انتهت الأسئلة مع أطيب تمنياتنا بالنجاح والتوفيق ،،،

صفوة تعليمي الكويت

Scanned by CamScanner

دولة الكويت (الأسئلة في (8) صفحات)

وزارة التربية

التوجيه الفني العام للعلوم

امتحان الفترة الدراسية الثانية – نهاية الفصل الدراسي الأول – العام الدراسي 2015 / 2016 م

المجال الدراسي : الكيميـاء للصف الثاني عشر العلمي الزمن : ساعتان وربع

==========

أولاً : الأسئلة الموضوعية (28) درجة

أجب عن السؤالين الموضوعيين التاليين الأول والثاني

السؤال الأول :

(أ) **إملأ الفراغات في الجمل التالية بما يناسبها علميا :** (5 × 1 = 1)

1- عند ثبات درجة الحرارة المطلقة فإن مضاعفة الضغط على (4 L) من غاز يجعل حجمه مساويا.....لتر .

2- كميه من الهواء في إناء فولاذ محكم تحت ضغط (100 KPa) ودرجة حرارة (300 °K) فإذا سخنت إلى (600 °K) فان ضغطها يصبح .....KPa .

3- اذا كان التعبير عن ثابت الاتزان لأحد التفاعلات الغازية هو $K_{eq} = \frac{[NH_3]^2}{[N_2]\,[H_2]^3}$ فتكون معادلة التفاعل الكيميائي هي ..... .

4- طبقا لتعريف برونشتد– لوري فإن الحمض المرافق للماء هو .....

5- تزداد قوة الحمض الضعيف كلما تكون قيمة pK_a له .....

صفوة معلمي الكويت

نموذج الإجابة

السؤال الثاني :

(أ) اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية : (7 × 1 = 7)

1- يتناسب حجم كمية معينة من الغاز تناسباً طردياً مع درجة حرارته المطلقة بالكلفن عند ثبات الضغط وكمية الغاز (قانون تشارلز) ص29

2- عند ثبات الحجم ودرجة الحرارة ، يكون الضغط الكلي لخليط من عدة غازات لا تتفاعل مع بعضها البعض يساوى مجموع الضغوط الجزئية للغازات المكونة للخليط . (قانون دالتون للضغوط الجزئية) ص 50

3- الذرات والأيونات والجزيئات يمكن أن تتفاعل وتكون نواتج عندما يصطدم بعضها ببعض ، بطاقة حركية كافية فى الاتجاه الصحيح. (نظرية التصادم) ص 64

4- تفاعلات كيميائية تحدث فى اتجاه واحد حتى تستطيع المواد الناتجة من التفاعل أن تتحد بعضها مع بعض لتكوين المواد المتفاعلة مرة أخرى (تفاعلات غير عكسية) ص70

5- عند ثبات درجة الحرارة ، تتناسب سرعة التفاعل الكيميائى طردياً مع تركيزات المواد المتفاعلة كل مرفوع إلى أس يساوى عدد المولات أمام كل مادة فى المعادلة الكيميائية الموزونة . (قانون فعل الكتلة) ص72

6- حاصل ضرب تركيزي كاتيونات الهيدرونيوم وأنيونات الهيدروكسيد فى الماء . (ثابت تأين الماء K_w) ص114

7- أحماض أو قواعد عضوية ضعيفة تتأين فى مدى pH معلوم ويتغير لونها تبعاً لقيمة الأس الهيدروجيني pH للوسط الذى توضع فيه . (أدلة التعادل) ص121

صفوة معلمي الكويت

(ب) ضع علامة (√) بين القوسين المقابلين للإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من الجمل التالية : (6 × 1½ = 9)

1- درجة الحرارة التي يكون عندها متوسط الطاقة الحركية لغاز تساوي الصفر نظريا :

( ) 273 °C ( ) 273 °K

( ) – 273 °C ( ) 0 °C

2- اناء يحتوي على غاز N_2 حجمه (1L) عند ضغط (101.3 KPa) ، وإناء آخر يحتوي على غاز O_2 حجمه (1L) عند ضغط (101.3 KPa)، تم خلطهما معا في إناء حجمه (1L) فيكون:

( ) الحجم الكلي(1L) والضغط الكلي(101.3 KPa) ( ) الحجم الكلي(1L) والضغط الكلي(202.6 KPa)

( ) الحجم الكلي(2L) والضغط الكلي(101.3 KPa) ( ) الحجم الكلي(2L) والضغط الكلي(202.6 KPa)

3- أحد ما يلي لا يزيد من سرعة التفاعل الكيميائي :

( ) زيادة درجة الحرارة ( ) إضافة مادة محفزة للتفاعل

( ) زيادة تراكيز المتفاعلات ( ) إضافة مادة تزيد طاقة التنشيط

4- إذا كانت قيمة ثابت الإتزان للتفاعل المتزن التالي: $CaCO_{3(s)} \rightleftharpoons CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$ يساوي 0.2 فإن :

( ) سرعة التفاعل الطردي أكبر من العكسي ( ) سرعة التفاعل العكسي أكبر من الطردي

( ) تركيز $[CO_2]$ عند الإتزان يساوي 0.2 ( ) تركيز $[CO_2]$ عند الإتزان يساوي 5

5 – حسب مفهوم برونشتد – لوري للتفاعل التالي $HCl + H_2O \rightleftharpoons Cl^- + H_3O^+$ فإن القاعدة المرافقة هي:

( ) H_3O^+ ( ) Cl^-

( ) H_2O ( ) HCl

6- أكثر المحاليل التالية قلوية عند 25 °C هو الذي يكون فيه :

( ) $[H_3O^+] = 1 \times 10^{-5}$ ( ) pH = 9

( ) $[OH^-] = 1 \times 10^{-3}$ ( ) pOH = 10

السؤال الثاني :

(أ) اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية : (7 × 1 = 7)

1- يتناسب حجم كمية معينة من الغاز تناسباً طردياً مع درجة حرارته المطلقة بالكلفن عند ثبات الضغط وكمية الغاز .
( )

2- عند ثبات الحجم ودرجة الحرارة ، يكون الضغط الكلى لخليط من عدة غازات لا تتفاعل مع بعضها البعض يساوى مجموع الضغوط الجزئية للغازات المكونة للخليط . ( )

3- الذرات والأيونات والجزيئات يمكن أن تتفاعل وتكون نواتج عندما يصطدم بعضها ببعض ، بطاقة حركية كافية فى الاتجاه الصحيح. ( )

4- تفاعلات كيميائية تحدث فى اتجاه واحد حتى تكتمل بحيث لا تستطيع المواد الناتجة من التفاعل أن تتحد بعضها مع بعض لتكوين المواد المتفاعلة مرة أخرى . ( )

5- عند ثبات درجة الحرارة ، تتناسب سرعة التفاعل الكيميائى طردياً مع تركيزات المواد المتفاعلة كل مرفوع إلى أس يساوى عدد المولات أمام كل مادة فى المعادلة الكيميائية الموزونة . ( )

6- حاصل ضرب تركيزي كاتيونات الهيدرونيوم وأنيونات الهيدروكسيد فى الماء .
( )

7- أحماض أو قواعد عضوية ضعيفة تتأين فى مدى pH معلوم ويتغير لونها تبعاً لقيمة الأس الهيدروجيني pH للوسط الذى توضع فيه . ( )

صفوة معلمي الكويت

(ب) اكتب كلمة (صحيحة) بين القوسين المقابلين للعبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) بين القوسين المقابلين للعبارة الخطأ في كل مما يلي : (7 × 1= 7)

1- الغاز الحقيقي هو الغاز الذى يتبع قوانين الغازات عند جميع ظروف الضغط ودرجة الحرارة . ( )

2- حجم نصف مول من الغاز المثالي عند الظروف القياسية يساوى (11.2 L). ( )

3-عدد الجزيئات الموجودة في 1 مول من غاز الأكسجين في الظروف القياسية يساوي 6×10^{23} جزئ. ( )

4- عند حدوث حالة الاتزان الكيميائي الديناميكي لتفاعل عكسي يجب أن تتساوى تراكيز المواد المتفاعلة والناتجة . ( )

5- إذا كانت قيمة ثابت الاتزان K_{eq} للتفاعل الطردي لأحد التفاعلات المتزنة يساوي (2) فإن قيمة ثابت الاتزان للتفاعل العكسي تساوي (0.5) . ( )

6- الحمض حسب مفهوم لويس هو المادة التى لها قدرة على إعطاء زوج من الإلكترونات الحرة لتكون رابطة تساهمية مع جزيئات أخرى . ( )

7- الجزء المذاب من القواعد القوية شحيحة الذوبان في الماء يكون تأينه ضعيفا . ( )

صفوة معلمي الكويت

ثانيا : الأسئلة المقالية (44) درجة

أجب عن جميع الأسئلة المقالية الأربعة التالية

السؤال الثالث :

(أ) علل لكل مما يلي : (2 × 2 = 4)

1- يحمل متسلقو الجبال والطيارون الذين يبلغون ارتفاعات عالية امدادات اكسجين إضافية.

2- طبقا للتفاعل المتزن التالي $N_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2\ NO_{(g)}$ لا يتغير موضع الاتزان بزيادة الضغط .

(ب) ماذا تتوقع أن يحدث في الحالات التالية ؟ مع التفسير : (2 × 1½ = 3)

1- لضغط غاز محبوس عند زيادة عدد الجسيمات وثبوت حجم الإناء ودرجة الحرارة المطلقة.

التوقع: ----------

السبب: ----------

2- لتركيز كاتيون الهيدرونيوم $[H_3O^+]$ عند إضافة محلول قلوي إلى الماء النقي عند 25 °C .

التوقع: ----------

السبب: ----------

(ج) حل المسألة التالية : (1 × 4 = 4)

أدخل (2 g) من غاز الميثان CH_4 في وعاء حجمه (3 L) عند درجة حرارة 37 °C . احسب قيمة الضغط في الوعاء بافتراض أن الميثان غاز مثالي . (علما بأن $M.wt\ (CH_4) = 16\ g/mol$, $R = 8.31\ L\ KPa / mol.^oK$)

صفوة معلمي الكويت

السؤال الرابع :

(أ) مالمقصود بكل مما يلي : (2 × 1½ = 3)

1- قانون بويل : ----------

2- فرضية أفوجادرو : ----------

(ب) قارن بين كل اثنين مما يلي حسب وجه المقارنة المرفق في الجدول التالي : (4 × 1 = 4)

وجه المقارنة	Keq أكبر من 1	Keq أقل من 1
إتجاه موضع الإتزان في التفاعلات العكسية (طردي – عكسي)		
وجه المقارنة	قيمة pH للمحلول الذي يظهر الحالة الحمضية للدليل	قيمة pH للمحلول الذي يظهر الحالة القاعدية للدليل
دليل حمضي قيمة ثابت تأينه $K_{Hln} = 1 \times 10^{-5}$		

(ج) حل المسألة التالية : (1 × 4 = 4)

تفاعل ثاني أكسيد الكبريت مع الأكسجين في وعاء حجمه (5 L) لتكوين ثالث أكسيد الكبريت وعند درجة حرارة معينة حدث الإتزان التالي : $2\,SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftarrows 2\,SO_{3(g)}$

وعند الإتزان كان عدد مولات كل من SO_3 ، O_2 ، SO_2 هو (0.3 ، 0.2 ، 0.4) مول على الترتيب

احسب قيمة ثابت الاتزان (K_{eq}) في هذه الظروف .

السؤال الخامس :

(أ) علل لكل مما يلي : (2 × 2 = 4)

1- يزداد ضغط غاز محبوس على جدران إناء فولاذ محكم عند زيادة درجة الحرارة المطلقة .

2- يعتبر حمض الأسيتيك CH_3COOH حمضاً أحادى البروتون رغم وجود أربع ذرات هيدروجين في صيغته.


(ب) ادرس التفاعل المتزن التالي ثم أجب عن المطلوب : (5 درجات)

$$C_{(s)} + H_2O_{(g)} + \text{حرارة} \rightleftharpoons CO_{(g)} + H_{2(g)}$$

التغير	النتائج المحتملة	الاجابة الصحيحة
أثر زيادة الضغط على انتاج أول أكسيد الكربون	(يزداد – يقل – لا يؤثر)	----------
أثر زيادة درجة الحرارة على انتاج أول أكسيد الكربون	(يزداد – يقل – لا يؤثر)	----------
أثر إضافة بخار الماء على قيمة ثابت الاتزان K_{eq}	(تزداد – تقل – لا تتأثر)	----------
أثر طحن وتفتيت الكربون على سرعة التفاعل	(تزداد – تقل – لا تتأثر)	----------
أثر إضافة مادة محفزة على طاقة تنشيط التفاعل	(تزداد – تقل – لا تتأثر)	----------

(ج) أكمل المخطط التالي مستعينا بالمصطلحات والعلاقات الرياضية التالية لتحقق خريطة المفاهيم الموجودة: (4 × ½ = 2)

قانون جاي لوساك ، قانون تشارلز ، $\frac{P1 \times V1}{T1} = \frac{P2 \times V2}{T2}$ ، $P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2$



السؤال السادس :

(أ) ماالمقصود بكل مما يلي : (2 × 1½ = 3)

1- الضغط الجزئي للغاز : ----------

2- حمض أرهينيوس : ----------

(ب) أكمل الفراغات في الجدول التالي بما يناسبها : (4 × 1 = 4)

اسم المركب	الصيغة الكيميائية للمركب
حمض الهيدروكبريتيك	----------
----------	H_3PO_3
حمض الكلوريك	----------
----------	$Al(OH)_3$

(ج) حل المسألة التالية : (1 × 4 = 4)

محلول مائي قيمة الأس الهيدروكسيدي pOH له تساوي 9 عند درجة حرارة 25 °C . المطلوب إحسب كل من تركيز كاتيون الهيدرونيوم $[H_3O^+]$ ، تركيز أنيون الهيدروكسيد $[OH^-]$ ، والأس الهيدروجيني pH .

هل المحلول حمضي أم قلوي أم متعادل ؟ مع ذكر السبب .

11

انتهت الأسئلة

صفوة معلمي الكويت

دولة الكويت (الأسئلة في (4) صفحات)

وزارة التربية

التوجيه الفني العام للعلوم

امتحان الفترة الدراسية الثانية - نهاية الفصل الدراسي الأول - العام الدراسي 2015 / 2016 م

المجال الدراسي : الكيمياء للصف الثاني عشر العلمي الزمن : ساعتان وربع

أولاً الأسئلة الموضوعية (25) درجة

أجب من السؤالين الموضوعيين التاليين الأول والثاني

السؤال الأول :

(أ) إملأ الفراغات في الجمل التالية بما يناسبها علميا : (1 × 1 = 1)

1- عند ثبات درجة الحرارة العطلقة فإن مضاعفة الضغط على (4 L) من غاز يجعل حجمه مساويا 2 لتر . ص

2- كميه من الهواء في إناء فولاذ محكم تحت ضغط (100 KPa) ودرجة حرارة (300 °K) فإذا سخنت إلى (600 °K) فان ضغطها يصبح 200 KPa . ص 34

3- اذا كان التعبير عن ثابت الاتزان لأحد التفاعلات الغازية هو $K_{eq} = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}$ فتكون معادلة التفاعل الكيميائي هي $N_{2(g)} + 3\,H_{2(g)} \rightleftharpoons 2\,NH_{3(g)}$. ص74

4- طبقا لتعريف برونشتد- لوري فإن الحمض المرافق للماء هو H_3O^+ . ص103

~~5- درجة تأين الحمض الضعيف كلما تكون قيمة pK_a له قليلة ص 128~~

صفوة علمي الكويت

(ب) اكتب كلمة صحيحة بين القوسين المقابلين للعبارة الصحيحة وكلمة خطأ بين القوسين المقابلين للعبارة الخطأ في كل مما يلي : (6 × 1 = 6)

نموذج الإجابة

1- الغاز الحقيقي هو الغاز الذي يتبع قوانين الغازات عند جميع ظروف الضغط ودرجة الحرارة . ص 41 (خطأ)

2- حجم نصف مول من الغاز المثالي عند الظروف القياسية يساوي (11.2 L). ص 38 (صحيحة)

3- عدد الجزيئات الموجودة في 1 مول من غاز الأكسجين في الظروف القياسية يساوي 6×10^{23} جزيء. (صحيحة)
ص 48

4- عند حدوث حالة الاتزان الكيميائي للتفاعل العكسي يجب أن تتساوى تركيز المواد المتفاعلة والناتجة .
ص 72 (خطأ)

5- إذا كانت قيمة ثابت الاتزان K_c لتفاعل نظري ما لتفاعلات المتزنة يساوي (2) فإن قيمة ثابت الاتزان للتفاعل العكسي تساوي (0.5) . ص 76 (صحيحة)

6- الحمض حسب مفهوم لويس هو المادة التي لها قدرة على إعطاء زوج من الإلكترونات الحرة تكون رابطة تساهمية مع جزيئات أخرى . ص 104 (خطأ)

6

14 13

صفوة معلمي الكويت

[illegible]

أجب عن جميع الأسئلة الثلاثة الآتية

السؤال الثالث **مجموع الإجابة**

حل لكل مما يلي (2 + 2 + 4)

1- [illegible]

2- [illegible]

ب) **علما بأنه يوجد في المملكة المتحدة** [illegible] (2 + 1½ + 3)

1- [illegible]

2- [illegible]

ج) **حل المسألة التالية** (1 + 4 + 4)

[illegible] (g 2) من غاز الميثان CH_4 في وعاء حجمه (3 L) عند درجة حرارة 37 °C احسب قيمة الضغط في الوعاء

(R = 8.31 L. KPa / mol.°K ، M.wt(CH_4) = 16 g/mol) علما بأن

n = m / M.wt	n = 2 / 16 = 0.125 mol
P V = n R T	T = 37 + 273 = 310 °K
P = 0.125 X 8.31 X 310 / 3 = 107.34 Kpa	

[illegible]

11

صفوة معلمي الكويت

السؤال الرابع

نموذج الإجابة

(أ) ما المقصود بكل مما يلي : (1 × 4 = 4)

1 قانون نيوتن : ينص القانون الثاني على أن القوة المحصلة المؤثرة على جسم تساوي حاصل ضرب كتلة الجسم في عجلة حركته

2 فرضية أفوجادرو : تنص على أن الغازات المختلفة عند درجة الحرارة والضغط نفسهما تحتوي على أعداد متساوية من الجزيئات

(ب) قارن بين كل اثنين مما يلي حسب وجه المقارنة المذكور في الجدول التالي (4 × 1 = 4)

وجه المقارنة اتجاه موضع الاتزان في المفاعلات العكسية (طردي - عكسي)	K_{eq} أكبر من 1 طردي	K_{eq} أقل من 1 عكسي
وجه المقارنة دليل حمضي قيمة ثابت تأينه $K_{ain} = 1 \times 10^{-5}$	قيمة pH للمحلول الذي يظهر الحالة الحمضية للدليل pH < 4	قيمة pH للمحلول الذي يظهر الحالة القاعدية للدليل pH > 6

(ج) حل المسألة التالية : (1 × 4 = 4)

تفاعل ثاني أكسيد الكبريت مع الأكسجين في وعاء حجمه (5 L) لتكوين ثالث أكسيد الكبريت وعند درجة حرارة معينة حدث الإتزان التالي : $2\,SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2\,SO_{3(g)}$

وعند الإتزان كان عدد مولات كل من SO_3 ، O_2 ، SO_2 هو (0.3 ، 0.2 ، 0.4) مول على الترتيب احسب قيمة ثابت الاتزان (K_{eq}) في هذه الظروف .

تركيز SO_3 عند الاتزان	تركيز O_2 عند الاتزان	تركيز SO_2 عند الاتزان
$[SO_3] = 0.3 / 5 = 0.06\ M$	$[O_2] = 0.2 / 5 = 0.04\ M$	$[SO_2] = 0.4 / 5 = 0.08\ M$
$K_{eq} = [SO_3]^2 / [SO_2]^2 [O_2] = (0.06)^2 / (0.08)^2 \times (0.04) = 14.06\ M^{-1}$		

11

(تابع)

تابع / نموذج الإجابة في الكيمياء – الصف الثاني عشر العام الدراسي ٢٠١٥ / ٢٠١٦ م

نموذج الإجابة

السؤال الثاني

أ) علل لكل مما يلي (٢ × ٢ = ٤)

١- يزداد ضغط غاز محصور عند زيادة درجة الحرارة المطلقة عند ثبوت

لأن زيادة متوسط سرعة حركة جسيمات الغاز وطاقتها وزيادة اصطدام جسيماته بالجدار الداخلي للإناء

تسبب بتضاعف ضغط الغاز

٢- يعتبر عنصر الأكسجين $_{8}O$ مشابهاً لعنصر الكبريت $_{16}S$ رغم وجود أربع ذرات هيدروجين في جزيء

لأن ذرات الهيدروجين الثلاث المتصلة بذرة الكبريت برابط تساهمي مصدره غير قادرة للتأثير

متصلة بذرة الأكسجين ذات السالبية الكهربائية العالية وهي القابلة للتأثير


ب) اقترن التفاعل المتزن التالي ثم أجب عن المطلوب (٩ درجات)

$$2NO_{(g)} + Br_{2(g)} \rightleftharpoons 2NOBr_{(g)} \quad \Delta H = -16.4\ kJ$$

التغير	النتائج المتصلة	الإجابة الصحيحة
أثر زيادة تضغط على إنتاج أو استهلاك الكبريت	(يزداد – يقل – لا يتأثر)	يقل ١
أثر زيادة درجة الحرارة على إنتاج أو استهلاك الكبريت	(يزداد – يقل – لا يتأثر)	يزداد ١
أثر إضافة بخار الماء على قيمة ثابت الاتزان K_{eq}	(تزداد – تقل – لا تتأثر)	لا تتأثر ١
أثر خفض وتكثيف الكبريت على سرعة التفاعل	(تزداد – تقل – لا تتأثر)	تزداد ١
أثر إضافة مادة محفزة على طاقة تنشيط التفاعل	(تزداد – تقل – لا تتأثر)	تقل ١

ج) أكمل المخطط التالي مستعيناً بالمصطلحات والعلاقات الرياضية التالية لتحقق خريطة المفاهيم الموجودة (٤ × ١ = ٤)

قانون جاي لوساك . قانون تشارلز . $\frac{P_1 \times V_1}{T_1} = \frac{P_2 \times V_2}{T_2}$. $P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2$



صفوة تعلمي الكويت

نموذج الإجابة

السؤال السادس

(أ) ماالمقصود بكل مما يلي (2 × 1¼ = 3)

1- **الضغط الجزئي لغاز** : الضغط الناتج عن أحد مكونات خليط غازي إذا شغل حجماً مساوياً لحجم الخليط عند درجة الحرارة نفسها. ص 50

2- **حمض أرهينيوس** : مركبات تحتوي على هيدروجين وتتأين لتعطي كاتيون الهيدروجين H^+ في المحلول المائي. ص 104

(ب) أكمل الفراغات في الجدول التالي بما يناسبها : (4 × 1 = 4)

اسم المركب	الصيغة الكيميائية للمركب
حمض الهيدروكبريتيك	H_2S (1) ص 108
حمض الفوسفوروز (1) ص 110	H_3PO_3
حمض الكلوريك	$HClO_3$ (1) ص 110
هيدروكسيد الألومنيوم (1) ص 111	$Al(OH)_3$

(ج) حل المسألة التالية : (1 × 4 = 4)

محلول مائي قيمة الأس الهيدروكسيدي pOH له تساوي 9 عند درجة حرارة 25 °C . المطلوب إحسب كل من تركيز كاتيون الهيدرونيوم $[H_3O^+]$ ، تركيز أنيون الهيدروكسيد $[OH^-]$ ، والأس الهيدروجيني pH .

هل المحلول حمضي أم قلوي أم متعادل ؟ مع ذكر السبب .

∴ $[OH^-] = 1 \times 10^{-9}$ M ½	∵ $[OH^-] = 10^{-pOH}$ ½	∵ pOH = 9 ½
	∴ pH = 14 - 9 = 5 ½	∵ pH = pkw - pOH ½
	∴ $[H_3O^+] = 1 \times 10^{-5}$ M ½	∵ $[H_3O^+] = 10^{-pH}$ ½
المحلول حمضي لأن قيمة pH أقل من 7 ½		

صفوة معلمي الكويت