



الرياضيات

الקורס الثاني

12

2021 - 2020


UULA.COM



الرياضيات

الקורס الثاني

12



2021 - 2020
Kuwaitteacher.Com
UULA.COM

الرياضيات قائمة المحتوى

01

التكامل غير المحدد	3
التكامل بالتعويض	9
تكامل الدوال المثلثية	15
الدوال الأسية واللوغاريتمية	22
التكامل بالتجزيء	31
التكامل بالكسور الجزئية	39
التكامل المحدد	45

02

المسحات في المستوى	60
دجوم الأجسام الدورانية	70
طول القوس ومعادلة منحنى دالة	74
المعادلات التفاضلية	80

03

القطع المخروطية - القطع المكافئ	87
القطع الناقص	98
القطع الزائد	109
الاختلاف المركزي	117

04

المتغيرات العشوائية المتقطعة	123
المتغيرات العشوائية المتصلة	142

التكامل غير المحدد

المشتقة العكسية

تسمى الدالة F مشتقه عكسيه للدالة f المعرفة على مجالها I .

$$\text{إذا كان } I \quad F'(x) = f(x) \quad \forall x \in I$$

س أثبت أن: $f(x) = -x^2$ هي مشتقه عكسيه للدالة $F(x) = 5 - \frac{1}{3}x^3$ ثم اكتب مشتقه عكسيه أخرى لها.



س أثبت أن: $f(x) = 1 - \frac{2}{x^3}$ هي مشتقه عكسيه للدالة $F(x) = \frac{x^3+1}{x^2}$

U U L A

ملاحظات هامة

التكامل غير المحدد للدالة f بالنسبة إلى x هو مجموعه كل المشتقفات العكسيه

ويكتب على الصورة:

$$\int f(x) dx$$

قواعد التكامل غير المحدد Rules of Indefinite Integral

$$\int k \, dx = kx + C \quad \text{عدد ثابت } k$$

قاعدة القوى

$$\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \in Q - \{-1\}$$

خواص التكامل غير المحدد Properties of Indefinite Integral

خاصية الضرب بعده ثابت

$$\int kf(x) \, dx = k \int f(x) \, dx, k \neq 0$$

خاصية الجمع و الطرح

$$\int [f(x) \pm g(x)] \, dx = \int f(x) \, dx \pm \int g(x) \, dx$$

Q $\int 5 \, dx$

Q $\int 15 \, dx$

Q $\int 5x^4 \, dx$

Q $\int 4x^3 \, dx$

Q $\int (3x^2 - 4x - 1) dx$

Q $\int (x^2 - 2x + 5) dx$

Q $\int \frac{1}{x^2} dx$

Q $\int \frac{x^2 - 4x + 3}{x-1} dx$



U U L A

Q $\int \left(\frac{x^2 - 2}{x^2} \right)^2 dx$



Q $\int (2x - 3)(x + 4) dx$

Q $\int \frac{x^2 + 5x + 4}{x+1} dx$



Q $\int \left(\frac{3x^2 - x}{x}\right)^2 dx$



Q $\int \sqrt{x} dx$

Q $\int \sqrt[5]{x^2} dx$



Q $\int x\sqrt{x} dx$

Q $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx$



Q $\int \frac{x^2 - 3x}{\sqrt[3]{x}} dx$

Q $\int \frac{x+1}{\sqrt[3]{x+1}} dx$


س إذا كان: $F(x)$ مُوجب $F(-1) = 0$ ، $F(x) = \int (2x + 5) dx$

U U L A

س إذا كان: $F(x)$ مُوجب $F(3) = 2$ ، $F(x) = \int (2x - 3) dx$

التكامل
التكامل بالتعويض

Q $\int (x^2 + 2x + 5)^3 (2x + 2) dx$



Q $\int (x^3 + 4x^2 + x)^7 (3x^2 + 8x + 1) dx$

U U L A



Q $\int \frac{\left(\frac{1}{x}+4\right)^5}{x^2} dx$



Q $\int \sqrt[3]{x^2 - 5x + 2}(2x - 5) dx$

U U L A



Q $\int \sqrt{4x - 5} dx$

Q $\int \sqrt[5]{3x + 7} dx$



U U L A

معلموت
معلموت
KuwaitTeacher.Com

Q $\int \frac{5}{\sqrt{x} (\sqrt{x}+2)^3} dx$

Q $\int \frac{3(\sqrt[3]{x-5})}{\sqrt[3]{x^2}} dx$



U U L A



Q $\int x(x+1)^5 dx$

ك

Q $\int x(2x-1)^3 dx$

ك

U U L A

معلمو

Q $\int x^5 \sqrt{4 - x^2} dx$



Q $\int x^5 \sqrt{3 + x^2} dx$

U U L A

معلموت
معلموت
KuwaitTeacher.Com

تكامل الدوال المثلثية

تذكرة : اشتقاق الدوال المثلثية :

$$\int \sin x \, dx = -\cos x + C$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$\int \sin kx \, dx = -\frac{\cos kx}{k} + C$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x$$

$$\int \cos x \, dx = \sin x + C$$

$$(\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$\int \cos kx \, dx = \frac{\sin kx}{k} + C$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x$$

$$\int \sec^2 x \, dx = \tan x + C$$


$$(\csc x)' = -\csc x \cot x$$

$$\int \csc^2 x \, dx = -\cot x + C$$

$$\int \sec x \tan x \, dx = \sec x + C$$

$$\int \csc x \cot x \, dx = -\csc x + C$$

Q $\int (\sin x + \sec^2 x) \, dx$



Q $\int (\cos x + \csc^2 x) \, dx$

Q $\int \csc x (\cot x + \csc x) dx$

Q $\int \sec x (\tan x + \sec x) dx$

Q $\int \frac{dx}{\cos^2 x}$



Q $\int \frac{dx}{\sin^2 x}$ **U U L A**



Q $\int \cos 4x \, dx$

Q $\int \sin 5x \, dx$

Q $\int (2x - \sin 3x) \, dx$



Q $\int (x^2 + \cos 2x) \, dx$

U U L A



Q $\int x \csc^2(x^2 - 1) dx$

Q $\int x \sec^2(x^2 + 2) dx$



Q $\int \cos^4 t \cdot \sin t dt$

U U L A

Q $\int \sin^3 x \cdot \cos x dx$




Q $\int \sec^2 x \cdot \tan x \, dx$

Q $\int \csc^2 x \cdot \cot x \, dx$



U U L A

Q $\int \cos^3(2x - 3) \cdot \sin(2x - 3) \, dx$



Q $\int x^3 \cos(x^4 + 5) dx$

Q $\int x^2 \cdot \sin(x^3 - 1) dx$



Q $\int (1 + \cos x)^6 \sin x dx$

U U L A

Q $\int (3 + \sin 2x)^5 \cos 2x dx$



Q $\int \sec^4 x \tan x dx$



Q $\int \csc^5 x \cot x dx$

U U L A

معلموت
معلموت
KuwaitTeacher.Com

الدوال الأسية و اللوغاريتمية

اشتقاق الدوال الأسية

أوجد مشتقة كل من الدوال التالية:

Q $f(x) = 3^x$



Q $f(x) = 10^{\sin x}$

Q $f(x) = 10^x$



Q $f(x) = 5^{\cos x}$



أوجد مشتقة كل من الدوال التالية:

Q $h(x) = e^{\frac{2x}{3}}$

Q $h(x) = e^{x^2+3x-1}$

Q $h(x) = e^{\sec x}$

Q $f(x) = e^{\sqrt{x}}$

Q $g(x) = e^{x^2-4}$

Q $h(x) = e^{\tan x}$

اشتقاق دوال اللوغاريتمات الطبيعية

أوجد مشتقة كل من الدوال التالية:

Q $f(x) = \ln x^2$

Q $g(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$

Q $h(x) = \ln \sqrt{x}$

Q $k(x) = \ln(\cos x)$



U U L A



اشتقاق دوال اللوغاريتمات الطبيعية

أوجد مشتقة كل من الدوال التالية:

Q $f(x) = \ln(2x + x^3)$

Q $g(x) = \ln \frac{1}{2x+1}$

Q $h(x) = \ln(1 + \sqrt{3}x)$



U U L A

Q $h(x) = \ln(\sin x)$



تكامل بعض الدوال الأسيّة واللوجاريتميّة

التكامل غير المحدّد	قاعدة المشتقّة
$\int e^x dx = e^x + C$	$\frac{d}{dx} e^x = e^x$
$\int u' e^u dx = e^u + C$	$\frac{d}{dx} e^u = e^u \frac{du}{dx} = u' e^u$
$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$	$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$
$\int \frac{u'}{u} dx = \ln u + C$	$\frac{d}{dx} \ln u = \frac{1}{u} \frac{du}{dx} = \frac{u'}{u}$

ملاحظة

$$\int \frac{g'(x) dx}{g(x)} = \ln|g(x)| + C$$

Q $\int 2e^x dx$



Q $\int e^{3x} dx$



Q $\int 2x \cdot e^{x^2+3} dx$



Q $\int \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$

U U L A

Q $\int (x^2 - 2)e^{x^3-6x} dx$




Q $\int \frac{-5}{3x-2} dx$

Q $\int \frac{3}{2x+5} dx$

A large, stylized logo consisting of four thick, light-gray horizontal bars of varying lengths. The top two bars are slanted upwards from left to right, while the bottom two are slanted downwards. They overlap each other to form a shape that suggests the letters 'K', 'U', 'W', and 'A'.

Q $\int \frac{2x+3}{x^2+3x+7} dx$

A large, stylized logo consisting of four thick, light-gray horizontal bars of varying lengths. The top two bars are slanted upwards from left to right, while the bottom two are slanted downwards. They overlap each other to form a shape that suggests the letters 'K', 'U', 'W', and 'A'.

Q $\int \frac{3t^2 - 6t}{t^3 - 3t^2 + 8} dt$

Q $\int \frac{x^2 - 5x + 6}{x} dx$



Q $\int \frac{x^3 + 4}{x} dx$

U U L A



$\int \tan x \, dx$ أوجب



$\int \cot x \, dx$ أوجب

U U L A

معلمو
معلمو
KuwaitTeacher.Com

التكامل
التكامل بالتجزيء

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

أوجد:

Q $\int x \sin x \, dx$



Q $\int x \cos x \, dx$

U U L A



Q $\int xe^x dx$



Q $\int 4xe^{-5x} dx$

U U L A

معلموت
معلموت
KuwaitTeacher.Com

Q $\int (x - 3)e^{x-3} dx$



Q $\int xe^{x-3} dx$

U U L A



Q $\int \ln x \, dx$


Q $\int x \ln x \, dx$



Q $\int \ln(x + 1) \, dx$



Q $\int (x + 1)\ln(x + 1) dx$



Q $\int (2x + 1)\ln(x + 1) dx$

U U L A



Q $\int x^2 \cos x dx$



Q $\int x^2 \sin x dx$

U U L A

معلموت
معلموت
KuwaitTeacher.Com

Q $\int x^2 e^x dx$



Q $\int x^2 e^{x+2} dx$

U U L A

معلّمات
Kuwaitteacher.Com

Q $\int e^x \sin x \, dx$



Q $\int e^x \cos x \, dx$

U U L A

معلموت
معلموت
KuwaitTeacher.Com

التكامل باستخدام الكسور الجزئية

لتكن الدالة $f(x) = \frac{5x-1}{x^2-2x-15}$: الكسور الجزئية ، فأوجد:



لتكن الدالة $f(x) = \frac{2x-1}{x^2-4x+3}$: الكسور الجزئية ، فأوجد:



Q $\int \frac{x^2+2x-1}{2x^3+3x^2-2x} dx$



Q $\int \frac{x^2-2}{2x^3-5x^2-3x} dx$

U U L A

معلموت
معلموت
KuwaitTeacher.Com

Q $\int \frac{-x^2+2x+4}{x^3-4x^2+4x} dx$



Q $\int \frac{4x^2-4x+1}{x^3-2x^2+x} dx$

U U L A



Q $\int \frac{3+x+x^2}{x^3+2x^2} dx$



Q $\int \frac{x^2+1}{x^3+4x^2} dx$

U U L A

معلموت
معلموت
KuwaitTeacher.Com

Q $\int \frac{x^2-3x+7}{x^2-4x+4} dx$



Q $\int \frac{x^3-2x^2-4}{x^3-2x^2} dx$

U U L A



Q $\int \frac{2x^3 - 9x^2 + 25}{x^2 - 6x + 8} dx$



Q $\int \frac{x^3 - 7x + 9}{x^2 - 3x + 2} dx$

U U L A

معلموت
معلموت
KuwaitTeacher.Com

التكامل
التكامل المربد

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Q $\int_{-2}^3 (3x^2 - x + 4) dx$



Q $\int_2^7 (x^3 - 2x^2 + 2) dx$

U U L A



خواص التكامل المحدد Properties of Definite Integral

إذا كانت f دالة متصلة على الفترة I فإن :

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$$

$$\int_a^b k dx = k(b - a)$$

$$\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$


ملاحظة :

لاحظ في خاصية $\int_a^b k dx = k(b - a)$ **أنه :** إذا كان $k = 1$ فإن :

Q $\int_{-8}^{-4} dx$




Q $\int_2^{-1} (\sqrt{x+1} - 3) dx$



Q $\int_1^2 \left(3e^x + \frac{e}{x}\right) dx$

Q $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{2} \sin 2x - \csc^2 x\right) dx$



U U L A

Q $\int_2^{-3} 5 dx$



Q $\int_2^4 \frac{dx}{x-1}$

Q $\int_{-2}^3 |x| dx$



Q $\int_0^5 |x - 3| dx$

U U L A



$$\mathbf{Q} \quad \int_{-3}^4 |2x - 4| dx$$



$$\mathbf{Q} \quad \int_1^3 |x + 2| dx$$

U U L A

معلّمات
Kuwaitteacher.Com

لتكن f دالة متصلة على $[a,b]$

إذا كانت : $\int_a^b f(x) dx \geq 0 \forall x \in [a,b]$ فإن : $f(x) \geq 0 \forall x \in [a,b]$

إذا كانت : $\int_a^b f(x) dx \leq 0 \forall x \in [a,b]$ فإن : $f(x) \leq 0 \forall x \in [a,b]$

س دون حساب قيمة التكامل أثبت أن: $0 \geq \int_3^5 (x^2 + x) dx$



س دون حساب قيمة التكامل أثبت أن: $0 \leq \int_{-1}^0 (x^2 + x) dx$

U U L A



لتكن الدالتيين f, g متصلتين على $[a, b]$
و كانت: $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$: فـإن $f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in [a, b]$

س دون حساب قيمة التكامل أثبت أن: $\int_1^3 (2x - 3) dx \leq \int_1^3 (x^2 + 2) dx$




س دون حساب قيمة التكامل أثبت أن: $\int_{-1}^2 (x^2 + 1) dx \geq \int_{-1}^2 (x - 1) dx$

U U L A




التفسير البياني للتكامل المحدود

في المستوى الإحداثي لتكن f دالة متصلة على $[a, b]$ ، تمثل مساحة المجموعة المحددة بمنحنى الدالة f ومحور السينات و المستقيمين $x = a, x = b$




إذا كانت: $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in [a, b]$
فإن: $\int_a^b f(x) dx = A$





إذا كانت: $f(x) \leq 0 \quad \forall x \in [a, b]$
فإن: $\int_a^b f(x) dx = -A$

س أوجد مساحة المجموعة المحددة بين منحنى الدالة $f(x) = -3x$ ومحور السينات والمستقيمين $x = 4, x = -2$.



س أوجد بيانياً قيمة التكامل: $\int_1^5 (2 - 2x) dx$



Q $\int_{-2}^2 \sqrt{4 - x^2} dx$



Q $\int_0^3 -\sqrt{9 - x^2} dx$

U U L A



Q $\int_{-5}^5 \sqrt{25 - x^2} dx$



Q $\int_0^4 -\sqrt{16 - x^2} dx$

U U L A



Q $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x \sec^2 x \, dx$



Q $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sin 2x \cos 2x \, dx$

U U L A



Q $\int_{-1}^1 (x^2 + 2x - 3)^2(x + 1)dx$



Q $\int_0^3 x \sqrt{x+1} dx$

U U L A

معلموت
معلموت
KuwaitTeacher.Com

Q $\int_{-1}^1 ((x+1)\sqrt{x^2 + 2x + 5}) dx$



Q $\int_2^5 x\sqrt{x-1} dx$

U U L A



Q $\int_{-2}^0 \frac{x}{e^x} dx$



Q $\int_0^{\frac{\pi}{4}} x \sec^2 x dx$

U U L A

معلموت
معلموت
KuwaitTeacher.Com

Q $\int_1^5 \frac{2x+8}{x^2+4x+3} dx$



Q $\int_4^7 \frac{3x^2-17}{x^2-x-6} dx$


U U L A

معلموت
معلموت
KuwaitTeacher.Com


المساحات في المستوى

أولاً: مساحة منطقة محددة بمنحنى الدالة f ومحور السينات في الفترة $[a, b]$

س أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة f ومحور السينات والمستقيمين $x = 2, x = 5$



س أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة f ومحور السينات والمستقيمين $x = -1, x = 4$



س أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة $f : f(x) = x^2 - 3x$ و مدور
السينات




س أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة $f : f(x) = x^2 + 5x + 4$ و مدور
السينات.

U U L A

معلمو الكويت
Kuwaitteacher.Com

س أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة f ومحور السينات في الفترة
 $f(x) = x^3 - 4x$, $\left[-1, \frac{3}{2}\right]$ المبينة.




س أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة f ومحور السينات في الفترة
 $f(x) = x^3 - 9x$, $[-2, 1]$ المبينة.

U U L A

معلمو الكويت
Kuwaitteacher.Com

س أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة f ومحور السينات في الفترة
 $f(x) = \sin x, \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ المبينة.



$$f(x) = \cos x, [0, \pi] \quad \text{س}$$

U U L A



ثانياً: مساحة منطقة محددة بمنحنى دالتين في الفترة $[a, b]$

أُوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة f و منحنى الدالة g و المستقيمين $x = 0$, $x = 1$ علماً بأن: $f(x) > g(x)$, $\forall x \in [0, 1]$



أُوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة f و منحنى الدالة g و المستقيمين $x = -1$, $x = 1$ علماً بأن: $f(x) > g(x)$, $\forall x \in [-1, 1]$



س أوجد مساحة المجموعة المحددة بمنحنى الدالة $f(x) = e^x$ و منحنى الدالة $x = -1 - x^2$: $g(x) = -1 - x^2$ والمستقيمين $x = 0, x = 3$: علماً بأن المنحنيين للدالتين g, f غير متقاطعين.



س أوجد مساحة المجموعة المحددة بمنحنى الدالة $f(x) = x^2 + 1$: f و منحنى الدالة $g(x) = -x^2 - 3$: g والمستقيمين $x = -1, x = 1$: علماً بأن المنحنيين للدالتين g, f غير متقاطعين.

U U L A



س أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنبي الدالتين :
 $y_1 = 2 - x^2$, $y_2 = -x$



س أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنبي الدالتين :
 $y_1 = x^2 + 2$, $y_2 = -2x + 5$

U U L A

معلمو الكويت
KuwaitTeacher.Com

س أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنتهي الدالتين :
 $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = -x^2 + 9$



س أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنتهي الدالتين :
 $f(x) = -2x^2 + 2$, $g(x) = x^2 - 1$

U U L A

معلمو الكويت
KuwaitTeacher.Com

س أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة f و منحنى الدالة g حيث:

$$f(x) = x^3 - 1 , g(x) = x - 1$$


س أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة f و منحنى الدالة g في كل مما يلي:

$$f(x) = 1 - x^3 , g(x) = -4x + 1$$

U U L A



س أوجد مساحة المنطقة المحددة بالمنحنين :
 $f(x) = x^3 - x$, $g(x) = 3 - 3x^2$



U U L A



حجم الأجسام الدورانية

$$V = \int_a^b \pi(f(x))^2 dx$$

س أوجد حجم المجسم الناتج من دوران المنطقة المستوية دورة كاملة حول محور السينات والمحددة بمنحنى الدالة $f : 2x^2 + 2$ ومحور السينات في الفترة $[-1,1]$.




س أوجد حجم المجسم الناتج من دوران المنطقة المستوية دورة كاملة حول محور السينات والمحددة بمنحنى الدالة $f : \sqrt{1-x}$ ومحور السينات في الفترة $[1,5]$.



س باستخدام التكامل المحدود أوجد جم المجسم الناتج من دوران المنطقة

المستوية حول محور السينات و المحددة بنصف الدائرة y

$$= \sqrt{r^2 - x^2}$$



س باستخدام التكامل المحدود أوجد جم المجسم الناتج من دوران المنطقة

المستوية حول محور السينات و المحددة بمنحنى الدالة :


$$f(x) = r \quad , \quad r \neq 0$$

س

U U L A




س أُوجِدَ حَجْمُ الْمَجْسِمِ النَّاتِحُ مِنْ دُورَانِ الْمَنْطَقَةِ الْمَسْتَوِيَّةِ دُورَةً كَامِلَةً حَوْلَ محَورِ السِّينَاتِ وَالْمَحَدُودَةِ بِمَنْحَنِيِّ الدَّالْتَيْنِ: $f(x) = x^2$ ، $g(x) = \sqrt{x}$



س أُوجِدَ حَجْمُ الْمَجْسِمِ النَّاتِحُ مِنْ دُورَانِ الْمَنْطَقَةِ الْمَسْتَوِيَّةِ دُورَةً كَامِلَةً حَوْلَ محَورِ السِّينَاتِ وَالْمَحَدُودَةِ بَيْنِ مَنْحَنِيِّ الدَّالْتَيْنِ: $f(x) = \frac{x^2}{2} + 1$ ، $g(x) = \frac{x}{2} + 2$



س أوجد حجم المجسم الناتج من دوران المنطقة المستوية دورة كاملة حول محور السينات و المحددة بمنحنبي الدالتين: $y_1 = \sin x, y_2 = \cos x$ على الفترة $[0, \frac{\pi}{4}]$



س أوجد حجم المجسم الناتج من دوران المنطقة دورة كاملة حول محور السينات و المحددة بمنحنبي الدالتين: $y_1 = x + 3, y_2 = x^2 + 1$

U U L A




طول قوس و معادلة منحنى دالة

قاعدة طول القوس


إذا كانت الدالة f' متصلة على $[a,b]$ فـإن طول القوس من منحنى $y = f(x)$ في $[a,b]$ هو :

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

s أوجد طول القوس من منحنى الدالة $f : f(x) = \sqrt{x^3}$ في الفترة $[0,4]$



s أوجد طول القوس من منحنى الدالة $f : f(x) = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 1$ في الفترة $[3,8]$



س أوجد طول القوس من منحنى الدالة $f : f(x) = \frac{1}{3}(3 + 2x)^{\frac{3}{2}}$ في الفترة $[0,6]$



س أوجد طول القوس من منحنى الدالة $f : f(x) = \frac{2}{9}(9 + 3x)^{\frac{3}{2}}$ في الفترة $[2,5]$

U U L A

معلمو
معلمو
KuwaitTeacher.Com

ثانياً: إيجاد معادلة منحنى دالة باستخدام التكامل

س أوجد معادلة منحنى الدالة f الذي ميله عند أي نقطة $P(x,y)$ يساوي $A(1,2)$ و يمر بالنقطة $(2, 3x^2 - 4x + 1)$




س أوجد معادلة منحنى الدالة f الذي ميله عند أي نقطة $P(x,y)$ يساوي x و يمر بالنقطة $(2, 3x^2 + x)$

U U L A



س أوجد معادلة منحنى الدالة f الذي ميله عند أي نقطة $P(x,y)$ يساوي $4x^3 + 6x^2 - 2x + 1$ و يمر بالنقطة $(1,0)$



س أوجد معادلة منحنى الدالة f الذي ميله عند أي نقطة $P(x,y)$ يساوي $-8x^3 + 3x^2 - 2x + 4$ و يمر بالنقطة $(-1, -5)$

U U L A



س إذا كان ميل العمودي على منحنى الدالة f عند أي نقطة عليه (x, y) يساوي $A(-5,3) - \sqrt{5} - 4x$


س إذا كان ميل العمودي لمنحنى الدالة f عند أي نقطة عليه (x, y) هو $1 - 2x$ فما وجد معادلة المنحنى علمًا بأنه يمر بالنقطة $B(1,0)$

U U L A

معلمو الكويت
Kuwaitteacher.Com

س لتكن: $f''(x) = 6x - 6$

فأوجد معادلة الدالة f إذا كانت النقطة $P(-1, 15)$ نقطة درجة للدالة.



س لتكن: $f''(x) = 5x - 2$

فأوجد معادلة الدالة f إذا كانت النقطة $P(2, -2)$ نقطة درجة للدالة.

U U L A

معلمو الكويت
KuwaitTeacher.Com

المعادلات التفاضلية

المعادلات التفاضلية

هي معادلات تحتوي على دالة مجهولة و بعض مشتقاتها.
نستخدم عادة y بدلًا من $f(x)$.

رتبة المعادلة التفاضلية

هي أعلى رتبة لمشتقة دالة موجودة في هذه المعادلة.
 $y' = xy - 2y - x - 1$, $y' = -8$ هي معادلات تفاضلية من الرتبة الأولى.
 $y'' = -8 + 2xy' - y = 0$, $y'' = \frac{4x}{y}$ هي معادلات تفاضلية من الرتبة الثانية.

درجة المعادلة التفاضلية

هي أكبر أس للأعلى المشتقات رتبة.
 $y'' + (y')^2 + y = 1$ هي معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى.
 $(y')^2 = \frac{4x}{y}$ هي معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية.

تدريب

س أكمل الجدول التالي محددًا رتبة و درجة كل معادلة من المعادلات التفاضلية فيه.

المعادلة التفاضلية	الرتبة	الدرجة
$y' = 5y$	1	1
$y'^2 = \frac{4x}{y}$	1	2
$y'' = 5y' + xy$	2	1
$(y'')^2 = 1 + (y')^3$	2	2
$y''' = (y')^2 + x^3$	3	1

س أثبت أن الدالة : $y' - 2xy = e^{x^2}$ هي حل للمعادلة التفاضلية : $0 = 0$



س أثبت أن الدالة : $y' + 3 = 3y$ هي حل للمعادلة التفاضلية : $1 = 2e^{3x} + 1$

U U A L A



النوع الأول: المعادلات التفاضلية من الرتبة الأولى و الدرجة الأولى التي على الصورة $y' = f(x)$ حلها يكون على الصورة: $y = \int f(x) dx$.

س حل المعادلة: $y' = 3x^2 - 1$

س حل المعادلة: $y' = 7x^2 + 9x - 1$

س حل المعادلة: $y' = 3x^2 - 1$, $y = 2$ عند $x = 1$ و التي تتحقق

U U L A

س حل المعادلة: $y' = 8x^3 - 3x^2 + 4$, $y = 5$ عند $x = 1$ و التي تتحقق

**النوع الثاني: المعادلات التفاضلية على الصورة $g(x).h(y) = y'$ يتم حلها
بطريقة فصل المتغيرات**

س $y' - 2xy = 0$



س $\frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x}$

U U L A

معلمو
معلمو
KuwaitTeacher.Com

النوع الثالث: المعادلات التفاضلية على الصورة ٠
 $y' = ay : a \neq 0$ **يكون حلها:** $y = ke^{ax}$

س أوجد حلًّا للمعادلة: $y' = 4y$ إذا كان $y = 2$ عند $x = 0$



س أوجد حلًّا للمعادلة: $y' = -2y$ إذا كان $y = 3$ عند $x = 0$

U U L A



النوع الرابع: المعادلات التفاضلية على الصورة ٠ $y' = ay + b : a \neq 0, b \neq 0$

يكون حلها: $k \in R^*$ $y = ke^{ax} - \frac{b}{a}$ حيث

أوجد حلًّا للمعادلة: $2y' + y = 1$ إذا كان $y = 2$ عند $x = -1$ س




أوجد حلًّا للمعادلة: $3y' - 2y = 4$ إذا كان $y = 3$ عند $x = 0$ س

U U L A



النوع الخامس: المعادلات التفاضلية على الصورة:
 $y'' = f(x)$
يتم حل هذه المعادلات بخطوتين:
 $y' = \int f(x) dx = F(x) + C_1$
ثم
 $y = \int (F(x) + C_1) dx$

س حل المعادلة: $y'' = 3x^2 - 2x$






س حل المعادلة: $y'' = -3x^2 + 6x$

U U L A

معلموت
KuwaitTeacher.Com

اسم الوحدة
القطع المخروطية

			الشكل
المستوى مواز للمحور ولا يدويه	المستوى ليس عمودياً على المحور وليس موازياً لرأسم	المستوى مواز لرأسم ولا يدويه	وضع المستوى
قطع زائد	قطع ناقص	قطع مكافئ	القطع الناتج



U U L A



القطع المكافئ

القطع المكافئ





القطع المكافئ هو مجموعة كل النقاط في المستوى المتساوية البعدين عن نقطة ثابتة مطلقة (البؤرة) وعن مستقيم ثابت مطلق (الدليل).



كاظم

مختصرات
فوتوكالومات
Kuwaitteacher.Com

القطع مكافئ رأسه نقطة الأصل (0,0)

$y^2 = 4px$	$x^2 = 4py$	الصورة العامة		
إلى اليمين أو إلى اليسار	إلى أعلى أو إلى أسفل	الفترة		
($p, 0$)	($0, p$)	البؤرة		
$x = -p$	$y = -p$	الدليل		
محور السينات ($x - axis$)	محور الصادات ($y - axis$)	محور التناظر		
$ p $		المسافة من الرأس إلى البؤرة		
$ p $		المسافة من الرأس إلى الدليل		
$p > 0$	$p < 0$	$p > 0$	$p < 0$	إشارة p
				الشكل



أُوجد معادلة القطع المكافئ الذي:

س رأسه نقطة الأصل و بؤرتها $F(4, 0)$

س بؤرتها $(-3, 0)$ و دليله المستقيم: $y = 3$





س أُوجد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل و بؤرتها $(-4, 0)$

س أُوجد معادلة القطع المكافئ الذي بؤرتها $(0, 2)$ و دليله المستقيم $y = -2$




أُوجِدَتِ الْبُؤْرَةُ وَمُعَادِلَةُ الدَّلِيلِ لِقَطْعِ مَكَافِئٍ، ثُمَّ ارْسَمَ شَكْلًا تَقْرِيبِيًّا لِهَذَا الْقَطْعِ فِي كُلِّ مَعَالِي

س المعادلة: $x^2 = -2y$





س المعادلة: $\frac{1}{3}y^2 = x$





أوجد البؤرة و الدليل لقطع مكافئ، ثم ارسم شكلًا تقريريًّا لهذا القطع في كل مما يلي :

س المعادلة: $y = \frac{x^2}{4}$



س المعادلة: $x = -\frac{1}{5}y^2$



س أوجد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل و يمر بالنقطة $(1, 2)$ و خط تماثله $x - axis$.



س أوجد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل و يمر بالنقطة $(1, 1)$ و خط تماثله $y - axis$.

U U L A



س أوجد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه $(0,0)$ ويمر بالنقطتين $(1,4)$, $A(-1,4)$

س أوجد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل و معادلة دليله $x = -3$



س أوجد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل و معادلة دليله $y = 1$



س تُستخدم ميكروفونات مكافئة على جانبي ملعب للتقاط الأصوات من داخل الملعب.

إذا كان قد تولد ميكروفون مكافئ من تدوير قطع مكافئ معادلته: $y^2 = 15x$ فحدد موضع البؤرة (جهاز الاستقبال الإلكتروني) لهذا القطع المكافئ.



س تصنع إحدى الشركات الكشافات المكافئة لنوعيات عديدة من السيارات.
إذا كان لأحد هذه الكشافات سطح مكافئ متولد من تدوير القطع المكافئ الذي معادلته $y^2 = 12x$, فأين سيكون موضع المصباح الكهربائي ؟




س تصنع إحدى الشركات مصابيح أهامية للسيارات. إذا كان أحد المصابيح على شكل سطح مكافئ متولد من تدوير قطع مكافئ معادلته $y^2 = 12x$, فما ينجب وضع لمبة المصباح؟



س في السؤال السابق: ما معادلة القطع المكافئ إذا كانت اللمبة تبعد 4 (وحدات قياس) عن رأس القطع المكافئ؟

U U L A





س يصل سلك معدني متذيل بين رأسى عمودي جسر. السلك المعدنى هو على صورة قطع مكافىء. يبعد العمودان عن بعضهما مسافة 180 m و يبلغ ارتفاع كل منها 33 m , يبلغ أصغر ارتفاع للسلك عن الطريق العام 3 m , وضعت على الطريق دعامات للسلك المتذلي. أوجد طول الدعامة التي تبعد 10 m عن أي من العمودين.




U U L A



القطوع المخروطية القطع الناقص

القطع الناقص

القطع الناقص هو مجموعة كل النقاط في المستوى التي يكون مجموع بعدي كل نقطة منها عن نقطتين ثابتتين في المستوى ثابتاً.





شكل (b)

$$a^2 = b^2 + c^2$$

طول المحور الأكبر: $2a$
طول المحور الأصغر: $2b$
البعد بين البورتين: $2c$
العلاقة الأساسية: $c^2 = a^2 - b^2$



معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الأصل $(0, 0)$ كالتالي:

$a > b > 0$	$a > b > 0$	المعادلة
$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	
		بيان القطع
ينطبق على محور الصادات	ينطبق على محور السينات	المحور الأكبر
$A_1(0, -a), A_2(0, a)$	$A_1(-a, 0), A_2(a, 0)$	الرأسان طرفا المحور الأكبر
$2a$		طول المحور الأكبر
$B_1(-b, 0), B_2(b, 0)$	$B_1(0, -b), B_2(0, b)$	طرفا المحور الأصغر
$2b$		طول المحور الأصغر
$F_1(0, -c), F_2(0, c)$	$F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$	البؤرتان
$a^2 = b^2 + c^2$		العلاقة الأساسية
$y = -\frac{a^2}{c}, y = \frac{a^2}{c}$	$x = -\frac{a^2}{c}, x = \frac{a^2}{c}$	معادلتنا الدليليين
القطع الناقص منتظر حول كل من محوريه و مركزه		الانتظار

س إذا كانت: $1 = \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{10}$ معادلة قطع ناقص فأوجد:
▪ رأس القطع وطرفي المدورة الأصغر
▪ البويرتين
▪ معادلتي الدليليين
▪ طول كل من المحورين ثم ارسم شكلًا تقريريًّا للقطع




U U L A




س إذا كانت: $1 = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}$ معادلة قطع ناقص فما وجد:
▪ رأس القطع وطرفي المدورة الأصغر
▪ البؤرتين
▪ معادلتي الدليليين
▪ طول كل من المدورةين ثم ارسم شكلًا تقربياً للقطع





U U L A



س أوجد معادلة القطع الناقص الذي يُورتَاه: $F_1(0, -3)$, $F_2(0, 3)$ و طول محوره الأصغر 4 , ثم ارسم شكلًا تقريريًّا لهذا القطع.



س أوجد معادلة القطع الناقص الذي يُورتَاه: $F_1(-2, 0)$, $F_2(2, 0)$ و طول محوره الأكبر 6 , ثم ارسم شكلًا تقريريًّا لهذا القطع.



س أوجد البؤرتين و الرأسين و طول المدورة الأكبر للقطع الناقص الذي معادلته:
$$25x^2 + 16y^2 - 400 = 0$$



س أوجد البؤرتين و الرأسين و طول المدورة الأكبر للقطع الناقص الذي معادلته:
$$x^2 + 4y^2 = 16$$

U U L A

معلمو الكويت
KuwaitTeacher.Com

س أوجد معايير قطع ناقص مركزه (0,0) إذا كان محوره الأكبر ينطبق على المحور الصادي وطوله 16 cm و المسافة بين البورتين . 10 cm



س أوجد معايير قطع ناقص مركزه (0,0) إذا كان محوره الأكبر ينطبق على المحور السيني وطوله 12 cm و المسافة بين البورتين 8 cm.



س أوجد معادلة القطع الناقص الذي إحدى بؤرتيه $F(2,0)$ و يمر بالنقطة $A(2,1)$


س أوجد معادلة قطع ناقص الذي مدورة الأصغر أفقى طوله m 10 و يمر بالنقطة $A(2,2\sqrt{6})$



U U L A

معلمو الكويت
KuwaitTeacher.Com

س للقطع الناقص الذي يولد السطح الناقص لجهاز تفتيت الحصوات، محور أكبر نقطتاه الطرفيتان $A_2(6,0)$ ، $A_1(-6,0)$ ، و محور الأصغر إحدى نقطتيه الطرفيتين $B_1(0,2.5)$ ، $B_2(0,-2.5)$ ، أوجد إحداثيات البؤرتين.




س يتولد المجسم الناقص لأحد أجهزة تفتيت الحصوات، من دوران قطع ناقص نقطتا طرفيه محوره الأكبر $A_2(8,0)$ ، $A_1(-8,0)$. إذا كانت إحدى نقطتي طرفي محوره الأصغر $B_1(0,3.5)$ ، فأوجد إحداثيات البؤرتين.

U U L A



س لمتابعة الهمس في الحالات البيضاوية الشكل فإن الصوت الذي ينطلق من بؤرة يمكن الاستماع إليه بشكل تام في البؤرة الثانية. على افتراض أن إحدى الحالات الكبرى مبنية على شكل بيضاوي طولي مدوريها $m = 46$ و $m = 98$. على أي مسافة من مصدر الصوت يجب أن يكون موقع شخص ليتمكن من سماعه بشكل واضح؟



U U L A



س على افتراض أن الصالة بيضاوية الشكل طولي مدوريها 36 m , 78 m . على أي مسافة من مصدر الصوت يجب أن يكون موقع شخص ليتمكن من سماع الصوت المنطلق بشكل واضح ؟




U U L A



القطع الزائد

القطع الزائد

القطع الزائد هو مجموعة كل النقاط في المستوى التي تكون القيمة المطلقة للفرق بين بعدي كل نقطة منها عن نقطتين ثابتتين في المستوى ثابتاً.



U U L A



معادلة القطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل كالتالي:



$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	المعادلة
		بيان القطع
$A_1(0, -a), A_2(0, a)$	$A_1(-a, 0), A_2(a, 0)$	طراً المحور القاطع الرأسان
ينطبق على مدوار الصادات	ينطبق على مدوار السينات	المحور القاطع (الأساسي)
$2a$	$2b$	طول المحور القاطع
$B_1(-b, 0), B_2(b, 0)$	$B_1(0, -b), B_2(0, b)$	طراً المحور المرافق
$2b$	$2a$	طول المحور المرافق
$F_1(0, -c), F_2(0, c)$	$F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$	البؤرتان
$c^2 = a^2 + b^2$		العلاقة الأساسية
$y = \pm \frac{a}{b}x$	$y = \pm \frac{b}{a}x$	معادلة الخطين المقاربدين
$y = \pm \frac{a^2}{c}$	$x = \pm \frac{a^2}{c}$	معادلة الدليلين
القطع متناظر حول مدواريه و مركزه		التناظر

س لتكن: $144 - 9x^2 - 16y^2 = 0$ معادلة قطع زائد فأوجد:

- رأسى القطع
- البؤرتين
- معادلتي الدليليين
- طول كل من المدوارين
- معادلة كل من الخطين المقاربين ثم ارسم شكلًا تخطيطيًّا للقطع



U U L A




س لتكن: $225 - 25x^2 = 9y^2$ معادلة قطع زائد فأوجد:



- رأسى القطع
- البؤرتين
- معادلتي الدليلين
- طول كل من المحورين
- معادلة كل من الخطين المقاربين ثم ارسم شكلًا تخطيطيًّا للقطع




U U L A



س أوجد معادلة القطع الزائد الذي يُؤرطاه $F_1(0, -3)$, $F_2(0,3)$ و رأساه $A_2(0,2)$, $A_1(0, -2)$. ثم أوجد معادلة كل من خطيه المقاربين و ارسم شكلًا تقريريًّا للقطع.



أوجد معادلة القطع الزائد الذي يُؤرطاه $F_1(-4,0)$, $F_2(4,0)$ و رأساه $A_2(2,0)$, $A_1(-2,0)$. ثم أوجد معادلة كل من خطيه المقاربين و ارسم شكلًا تقريريًّا للقطع.



س أُوجد معادلة القطع الزائد الذي يمر بـ $(0,0)$ و يحدى بؤرتيه $F(0, \sqrt{34})$ و معادله
أحد خطيه المقاربین هي: $y = \frac{3}{5}x$

س أُوجد معادلة القطع الزائد الذي يحدى بؤرتيه $F(\sqrt{41}, 0)$ و معادله أحد خطية
المقاربین $y = \frac{4}{5}x$

U U L A

معلمو الكويت
KuwaitTeacher.Com

س أوجد معادلة القطع الزائد الذي مركزه $(0, 0)$ وأحد رأسيه $(-4, 0)$ ويمر بالنقطة $(5, -2)$

س أوجد معادلة القطع الزائد الذي أحد رأسيه $\left(0, \frac{5}{4}\right)$ ويمر بالنقطة $\left(-\sqrt{3}, -\frac{5}{2}\right)$



U U L A

معلمو الكويت
Kuwaitteacher.Com

أوجب معادلة قطع زائد لمدار مركبة فضائية حول كوكب المشتري علماً أن: **س**

$$a = 38942360 \text{ km}, c = 778547200 \text{ km}$$



U U L A


معلمو الكويت
KuwaitTeacher.Com

القطع المخروطية الاختلاف المركزي

القطع المخروطي

القطع المخروطي هو مجموعة كل النقاط في المستوى الإحداثي حيث تكون نسبة بعد كل منها من نقطة ثابتة (البؤرة) إلى بعدها عن مستقيم ثابت (الدليل) في نفس المستوى تساوي مقداراً ثابتاً.

- إذا $1 = e$ يكون القطع المخروطي **قطعاً مكافئاً**
- إذا $1 > e$ يكون القطع المخروطي **قطعاً ناقضاً**
- إذا $1 < e$ يكون القطع المخروطي **قطعاً زائداً**




حدد نوع القطع في كل مما يلي ثم أوجد معادلته.

س اختلافه المركزي ($e = 1$) و بؤرته ($F(-1,0)$) وبؤرتها ($(e = -1,0)$)

U U L A

معلمو
فروض
KuwaitTeacher.Com

س اختلافه المركزي $F(-4\sqrt{2}, 0)$ و إحدى بؤرته $(e = \frac{4}{5})$



س اختلافه المركزي $(e = \sqrt{3})$ و معادلة أحد دليليه

U U L A

معلموت
Kuwaitteacher.Com

أوجد الاختلاف المركزي لكل قطع معاً يلي حيث معادلته:

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \quad \text{س}$$



$$x^2 + \frac{y^2}{25} = 1 \quad \text{س}$$

U U L A



$$24y^2 = 600 + 25x^2 \quad \text{س}$$

س أوجد طول المحور القاطع للقطع الزائد الذي اختلافه المركزي $(e = 2)$ و طول محوره المرافق 6 وحدات.



س أوجد طول المحور الأكبر للقطع الناقص الذي اختلافه المركزي $\left(e = \frac{\sqrt{5}}{3}\right)$ و طول محوره الأصغر 4 وحدات.



يمكن وضع الأقمار الاصطناعية في مدارات بيضاوية الشكل (قطع ناقص) في دورانها حول الأرض.

لنفترض أن قمراً صناعياً يتحرك في مدار بيضاوي (قطع ناقص) حول الأرض حيث الاختلاف المركزي ($e = 0.04$) و طول نصف محوره الأكبر 7500 km و إحدى بؤرتيه مركز الأرض.

س أوجد معادلة مدار القمر الاصطناعي.



س على افتراض أن طول نصف قطر الأرض 6372 km فأوجد أطول و أقصر بعد للقمر الاصطناعي عن سطح الأرض.

U U L A



إذا كان القمر الصناعي له مدار بيضاوي (قطع ناقص) حول الأرض حيث اختلافه المركزي $e = 0.05$ و طول نصف محوره الأكبر 8600 km و إحدى بؤرتيه مركز الأرض.

س أوجد معادلة مدار القمر الصناعي.



س إذا كان نصف قطر الأرض 6372 km فأوجد أطول و أقصر بُعد للقمر الصناعي عن سطح الأرض.

U U L A



المتغيرات العشوائية المتنقّلة

المتغير العشوائي
Random Variable

هو دالة مجالها فضاء العينة لتجربة عشوائية S و مجالها المقابل هو \mathbb{R} ومداها مجموعه جزئية من \mathbb{R} حيث

$X : S \rightarrow \mathbb{R}$
(X هو المتغير العشوائي لتجربة عشوائية S فضاء العينة, \mathbb{R} مجموعه الأعداد الحقيقة).

دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي X

إذا كان X متغيراً عشوائياً متنقلاً مداه $\{x_1, x_2, x_3, \dots\}$ فإن دالة التوزيع الاحتمالي f تعزف كالتالي:
 $f(x_i) = P(X = x_i)$, $i = 1, 2, 3, \dots$

و يمكن تمثيلها بالجدول التالي:

x_i	x_1	x_2	...
$f(x_i)$	$P(x_1)$	$P(x_2)$...

U U L A



في تجربة رمي حجر نرد مرة واحدة، المتغير العشوائي X يعبر عن:
الجذر التربيعي للعدد الظاهر على الوجه العلوي عندما يكون الجذر التربيعي
عديداً كلياً و الصفر لغير ذلك.
فأوجد :

س فضاء العينة (S) و عدد عناصره (n).

س مدى المتغير العشوائي X .

س احتمال وقوع كل عنصر من عناصر فضاء العينة (S):
 $f(x_i) = P(X = x_i)$:

س دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي X .

عند رمي حجر نرد مرة واحدة، إذا كان المتغير العشوائي X يعبر عن:
"مربع العدد الظاهر مطروحاً منه 1 عندما يكون العدد الظاهر أصغر من 4 ، و
1 – لغير ذلك".
فأوجد :

s فضاء العينة (S) و عدد عناصر فضاء العينة (S) n .

s مدى المتغير العشوائي X .


s احتمال وقوع كل عنصر من عناصر فضاء العينة (S).

s دالة التوزيع الاحتمالي f للمتغير العشوائي X .

عند إلقاء قطعة نقود ثلاثة مرات متتالية، إذا كان المتغير العشوائي X يعبر عن "عدد الصور" فأوجد ما يلي :

س فضاء العينة (S) و عدد عناصره (n) .

س مدى المتغير العشوائي X .



س احتفال كل عنصر من عناصر مدى المتغير العشوائي X .




س دالة التوزيع الاحتمالي f للمتغير العشوائي X .



عند إلقاء قطعة نقود ثلاث مرات متتالية، إذا كان المتغير العشوائي X يعبر عن "عدد الكتابات" فأوجد ما يلي :

س فضاء العينة (S) و عدد عناصره (n) .

س مدى المتغير العشوائي X .



س احتفال كل عنصر من عناصر مدى المتغير العشوائي X .




س دالة التوزيع الاحتمالي f للمتغير العشوائي X .



بيان دالة التوزيع الاحتمالي

دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي X :

x	0	1	2	3
$f(x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$



إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي X هي :

x	-2	1	2	3
$f(x)$	0.3	0.1	k	0.2

فأوجد قيمة k .

إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي f للمتغير العشوائي X هي :

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	0.35	0.15	0.1	0.2	k

س فأوجد قيمة k .

س إذا كان X متغيراً عشوائياً متقطعاً مدام هو: $\{0, 1, 2, 3\}$
وكان: $f(0) = 0.1, f(1) = 0.6, f(2) = 0.15$
فأوجد $f(3)$, ثم اكتب دالة التوزيع الاحتمالي f للمتغير العشوائي X .



صندوق يحتوى على 10 كرات متماثلة منها 7 كرات بيضاء و 3 كرات حمراء.
سحبت عشوائياً 3 كرات معاً من الصندوق.
إذا كان المتغير العشوائي X يمثل عدد الكرات البيضاء،
فأوجد ما يلي :

س عدد عناصر فضاء العينة (S) .


س مدى المتغير العشوائي X .

س احتمال كل عنصر من عناصر مدى المتغير العشوائي X .

س دالة التوزيع الاحتمالي f للمتغير العشوائي X .



صندوق يحتوي على 10 كرات متماثلة منها 7 كرات بيضاء و 3 كرات حمراء.
سحبت أربع كرات عشوائياً معًا من الصندوق.
إذا كان المتغير العشوائي X يمثل عدد الكرات الحمراء،
فأوجد ما يلي :



س عدد عناصر فضاء العينة (S) .

س مدى المتغير العشوائي X .



س احتمال كل عنصر من عناصر مدى المتغير العشوائي X .



س دالة التوزيع الاحتمالي f للمتغير العشوائي X .



التوقع (الوسط) و التباين للمتغيرات العشوائية المتقطعة

يبين الجدول التالي دالة التوزيع الاحتمالي f للمتغير العشوائي المتقطع X :

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	0.43	0.29	0.17	0.09	0.02

فأوجد :

س التوقع (μ) .



س التباين (σ^2)

س الانحراف المعياري (σ)



يبين الجدول التالي دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي المتقاطع X :

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3

فأوجد :

س التوقع (μ).



س التباين (σ^2)

س الانحراف المعياري (σ)

U U L A



دالة التوزيع التراكمي لمتغير عشوائي متقطع

دالة التوزيع التراكمي

دالة التوزيع التراكمي F للمتغير العشوائي المتقطع عند القيمة a هي احتمال وقوع المتغير العشوائي X بحيث يكون X أصغر من أو يساوي a أي أن:

$$F(a) = P(x \leq a)$$

الجدول التالي يبيّن دالة التوزيع الاحتمالي f للمتغير العشوائي المتقطع X :

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	0.43	0.29	0.17	0.09	0.02

إذا كانت F دالة التوزيع التراكمي للمتغير العشوائي X . فأوجد:

س $F(0)$

س $F(1)$

س $F(3.5)$

س $F(4)$

س $F(5)$

س $F(8)$

الجدول التالي يبيّن دالة التوزيع الاحتمالي f للمتغير العشوائي المقطوع X :

x	3	4	5
$f(x)$	0.5	0.3	0.2

إذا كانت F دالة التوزيع التراكمي للمتغير العشوائي X . فأوجد:

$$F(2) \quad \text{س}$$



$$F(3) \quad \text{س}$$



$$F(4) \quad \text{س}$$

$$F(4.5) \quad \text{س}$$



$$F(5) \quad \text{س}$$



$$F(7) \quad \text{س}$$

الجدول التالي يبين بعض قيم دالة التوزيع التراكمي F للمتغير العشوائي المتقطع X :

x	1	2	3	5
$f(x)$	0.15	0.2	0.6	1

فأوجد :

$$P(1 < X \leq 3)$$



$$P(X > 2)$$



يبين الجدول التالي بعض قيم دالة التوزيع التراكمي F للمتغير العشوائي المتقطع X :

x	1	2	3	4
$f(x)$	0.25	0.40	0.65	1

فأوجد :

$$P(2 < X < 4)$$



$$P(X > 3)$$

U U L A



توزيع ذات حددين

نعلم من خلال دراستنا أن بعض التجارب العشوائية يكون لها ناتجان أو عدة نواتج يمكن اختزالها إلى ناتجين فقط أي أن فضاء العينة يصبح محتوياً على عنصرين فمثلاً:

- عند إلقاء قطعة نقود مرة واحدة يكون الناتج إما صورة أو كتابة.
- عند تأدية الطالب اختباراً في مادة ما تكون النتيجة إما ناجح أو رسوبي.
- عند دخول شخص اختبار الحصول على رخصة القيادة تكون النتيجة ناجحة أو رسوبي.

وهكذا فإننا قيد دراسة التجارب التي يكون لها ناتجان فقط وهي ما يسمى **بتجربة ذات الحدين**.

و التي تتبع دالة التوزيع الاحتمالي المتقطع.

تجربة ذات الحدين

هي تجربة عشوائية تتحقق الشروط التالية:

- ت تكون التجربة من عدد n من المحاولات المستقلة و المتماثلة.
- (المحاولات المستقلة تعني أن نتيجة كل محاولة لا تؤثر ولا تتأثر بنتائج المحاولات الأخرى).
- كل محاولة يكون لها ناتجان فقط مثل (نجاح أو فشل)
- احتمال الحصول على أحد الناتجين يكون ثابتاً من تجربة إلى أخرى. و سوف نرمز لهذا الاحتمال بالرمز P .

و تسمى كل محاولة من المحاولات التجربة **محاولة برنولي Bernoulli**.

احتمال النجاح في x من المحاولات يعطى بالعلاقة

$$P(X = x) = f(x) = C_x \cdot P^x \cdot (1 - P)^{n-x}, n \in \mathbb{Z}^+$$

حيث n عدد المحاولات

مجموعة القيم الممكنة للمتغير العشوائي $X = \{0, 1, 2, \dots, n\}$

x عدد مرات النجاح في n من المحاولات

P احتمال النجاح

$(1 - P)$ احتمال الفشل

إذا كان X متغيراً عشوائياً ذو حدين و معلمتيه هما: $n = 7$, $P = 0.1$. فأوجد:

$$P(X = 0) \quad \text{س}$$

$$P(1 < X \leq 3) \quad \text{س}$$

إذا كان X متغيراً عشوائياً ذو حدين و معلمتيه هما: $n = 6$, $P = 0.6$. فأوجد:

$$P(X = 1) \quad \text{س}$$

$$P(2 < X \leq 4) \quad \text{س}$$

U U L A



التوقع و التباين للتوزيع ذات الحدين

$$\begin{aligned}\text{التوقع: } \mu &= nP \\ \text{التباین: } \sigma^2 &= nP(1 - P) \\ \text{الانحراف المعياري: } \sigma &= \sqrt{nP(1 - P)}\end{aligned}$$

س ينتج مصنع سيارات 200 سيارة يومياً، إذا كانت نسبة إنتاج السيارات المعيبة 0.01 فما وجد التوقع و التباين و الانحراف المعياري لعدد السيارات المعيبة في يوم واحد.



س ينتج مصنع سيارات 350 سيارة يومياً، إذا كانت نسبة إنتاج السيارات المعيبة 0.02 فما وجد التوقع و التباين و الانحراف المعياري لعدد السيارات المعيبة في يوم واحد.

U U L A



س في تجربة إلقاء قطعة نقود 5 مرات. أوجد التوقع و التباين و الانحراف المعياري إذا كان المتغير العشوائي X هو ظهور صورة.

س في تجربة إلقاء قطعة نقود 8 مرات. أوجد التوقع و التباين و الانحراف المعياري إذا كان المتغير العشوائي X هو ظهور كتابة.



ع ع ل ا



المتغيرات العشوائية المتصلة (المستمرة)

المتغير العشوائي المتصل
Continuous Random Variable


هو المتغير التي تكون مجموعه القيم الممكنة له عبارة عن فتره من الأعداد الحقيقية أي أن مدى المتغير العشوائي المتصل $\{b \leq x \leq a\}$ وهي مجموعه غير قابلة للعد.

إذا كان X متغيراً عشوائياً متصل و دالة كثافة الاحتمال له هي:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} & : 1 \leq x \leq 5 \\ 0 & \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

فأوجد:

$$\text{س } P(1 < X \leq 5)$$



$$\text{س } P(X < 3)$$



$$\text{س } P(X \geq 1.5)$$




$$\text{س } P(X = 2)$$

إذا كان X متغيراً عشوائياً متصلأ، فدالة كثافة الاحتمال له هي:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6} & -3 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

فأوجد:



$$P(X < 2)$$



$$P(-1 < X < 1)$$



$$P(-1.5 < X < 2.5)$$



$$P(X = 0)$$

إذا كان X متغيراً عشوائياً متصل، و دالة كثافة الاحتمال له هي:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{8}x & : 0 < x \leq 4 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

فأوجد:

$$P(0 \leq X \leq 4)$$
 س



$$P(X \leq 2)$$
 س


$$P(X > 2)$$
 س

U U L A



إذا كان X متغيراً عشوائياً متصلّاً، و دالة كثافة الاحتمال له هي:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x & : 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$



فأوجد:

$$P(X < 1) \quad \text{س}$$



$$P(X \geq 1) \quad \text{س}$$

$$P(X = 1) \quad \text{س}$$

U U L A



التوزيع الاحتمالي المنتظم لمتغير عشوائي متصل (مستمر)

دالة كثافة الاحتمال للتوزيع الاحتمالي المنتظم على $[a,b]$ هي:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}x & : a \leq x \leq b \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

التوقع (الوسط) للتوزيع الاحتمالي المنتظم هو:

$$\mu = \frac{a+b}{2}$$

التبالين للتوزيع الاحتمالي المنتظم هو:

$$\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

U U L A



لتكن الدالة f :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} : 0 \leq x \leq 3 \\ 0 : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

فأوجده

س أثبت أن الدالة هي دالة كثافة احتمال.

س أثبت أن الدالة f تتبع التوزيع الاحتمالي المنتظم.



$$P(1 < X \leq 3) \quad \text{אוסף ס}$$



س أوجد التوقع و التباين للدالة f

لتكن الدالة f :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} : 1 \leq x \leq 3 \\ 0 : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

فأوجد:

س أثبت أن الدالة f هي دالة كثافة احتمال.



س أثبت أن الدالة f تتبع التوزيع الاحتمالي المنتظم.

$$P(2 < X \leq 3)$$

أوجد التوقع و التباين للدالة f




التوزيع الاحتمالي الطبيعي $N(\mu, \sigma^2)$

Natural Probability Distribution $N(\mu, \sigma^2)$

يعتبر التوزيع الاحتمالي الطبيعي من أهم التوزيعات الاحتمالية المتمثلة وقد سبق أن درسنا متنبئ التوزيع الطبيعي و خواصه و التي منها:

- المتوسط الحسابي = الوسيط = المنوال
- يكون بيان المتنبئ على شكل ناقوس (جرس) متماثل حول محوره $(x = \mu)$
- يمتد المتنبئ من طرفيه إلى $-\infty$ و إلى ∞ (لا يقطع محوره السينات).
- المساحة تحت المتنبئ تساوي الواحد الصحيح (وحدة مساحة).
- المستقيم الرأسى $\mu = \bar{x}$ يقسم المساحة تحت المتنبئ إلى قطعتين متماثلتين مساحة كل منها تساوي نصف (نصف وحدة مساحة)



منحنى التوزيع الطبيعي $N(\mu, \sigma^2)$

التوزيع الطبيعي المعياري


إذا كان المتوسط الحسابي للتوزيع الطبيعي $0 = \mu$ و الانحراف المعياري $1 = \sigma$ يسمى التوزيع الطبيعي **بالتوزيع الطبيعي المعياري**.

الشكل المرسوم يمثل بيان متنبئ التوزيع الطبيعي المعياري.

نعلم أن متنبئ التوزيع الطبيعي يتعدد بكل من التوقع μ و التباين لها σ^2 و نظراً لاختلاف قيم σ^2, μ من توزيع لآخر فإننا نقوم بتحويل أي توزيع

طبيعي إلى توزيع طبيعي معياري وفق التحويل $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$

و تم وضع جداول التوزيع الطبيعي المعياري في نهاية الوحدة للتوزيع الطبيعي $N(\mu, \sigma^2)$



منحنى التوزيع الطبيعي $N(0, 1)$

حساب الاحتمالات للتوزيع الطبيعي $N(\mu, \sigma^2)$

إذا كان للمتغير العشوائي X التوزيع الطبيعي $N(\mu, \sigma^2)$ أي التوزيع الذي توقعه μ و تباينه σ^2 و أردنا حساب احتمالات تتعلق بالمتغير X فإننا نستخدم جدول التوزيع الطبيعي المعياري المعرف في آخر الورقة باتباع الخطوات الموضحة التالية لإيجاد $P(a \leq X \leq b)$:

- يوجد القيمة المعيارية الم対اظرة للقيمة a بالتعويض في العلاقة:

$$z_1 = \frac{a - \mu}{\sigma}$$

و القيمة المعيارية الم対اظرة للقيمة b بالتعويض في العلاقة:

$$z_2 = \frac{b - \mu}{\sigma}$$

نستخدم العلاقة: $P(a < X \leq b) = P(z_1 < z \leq z_2)$

- نستخدم أحد جداول المساحة تحت المنحنى الطبيعي (4) ، (5) لحساب الطرف الأيسر من العلاقة السابقة.

حساب الاحتمالات للتوزيع الطبيعي المعياري $P(z)$

- إذا كانت $a \geq 0$ حيث $z \leq a$ أو $z \geq a$ نستخدم جدول z رقم (4).
- إذا كانت $a < 0$ حيث $0 \leq z \leq a$ أو $z \geq a$ نستخدم جدول z رقم (5).

إذا كان z هو التوزيع الطبيعي المعياري للمتغير العشوائي X فأوجد:

$$P(z \leq 2.18) \quad \text{س}$$

$$P(z \geq 2.43) \quad \text{س}$$


$$P(1.4 \leq z \leq 2.6) \quad \text{س}$$

$$P(z \leq 0.95) \quad \text{س}$$


$$P(z > 0.71) \quad \text{س}$$


$$P(1.45 \leq z \leq 3.26) \quad \text{س}$$

إذا كان z هو التوزيع الطبيعي المعياري للمتغير العشوائي X فما يندرج:

$$P(z \leq -0.55) \quad \text{س}$$

$$P(-2.2 \leq z \leq -1.6) \quad \text{س}$$



$$P(-1.3 \leq z \leq 0.28) \quad \text{س}$$



$$P(z \leq -0.12) \quad \text{س}$$



$$P(-3.2 \leq z \leq -0.1) \quad \text{س}$$

$$P(-5.26 \leq z \leq 0.69) \quad \text{س}$$

يمثل المتغير X درجات الطلاب في مادة الرياضيات. إذا كان توزيع هذه الدرجات يتبع التوزيع الطبيعي الذي وسطه $\mu = 40$ وانحرافه المعياري $\sigma = 8$ فأوجد:

$$P(30 < X \leq 65) \text{ س}$$



$$P(X \geq 45) \text{ س}$$

U U L A

