



# الفيزياء

الصف العاشر

الجزء الأول

telegram

قناة يوسف عزمي للفيزياء

العام الدراسي

2023 / 2022

كتاب الطالب

المرحلة الثانوية

الطبعة الثانية



وزارة التربية

# الفيزياء

١٠

الصفّ العاشر

كتاب الطالب

الجزء الأوّل

المرحلة الثانويّة

اللجنة الإشرافية لدراسة ومواءمة سلسلة كتب العلوم

أ. بّراك مهدي بّراك (رئيساً)

أ. مصطفى محمد مصطفى علي

أ. راشد طاهر الشمالي

أ. سعاد عبد العزيز الرشود

أ. فتوح عبد الله طاهر الشمالي

أ. تهاني ذعار المطيري

الطبعة الثانية

حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة لوزارة التربية - قطاع البحوث التربوية والمناهج

إدارة تطوير المناهج

KuwaitTeacher.Com

الطبعة الأولى ٢٠١٢ - ٢٠١٣ م  
الطبعة الثانية ٢٠١٤ - ٢٠١٥ م  
٢٠١٦ - ٢٠١٧ م  
٢٠١٨ - ٢٠١٩ م  
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م

## فريق عمل دراسة ومواءمة كتب الفيزياء للصف العاشر الثانوي

أ. عاصي محمد نوري العاشور

أ. سامي عبد القوي محمد  
أ. عنود محمد يوسف الكندري  
أ. عادل عبد العليم العوضي  
أ. عنود الطريقي حسيكان الذايدي

دار التَّربويّون House of Education ش.م.م.م. وبيرسون إديوكيشن ٢٠١٢

شاركنا بتقييم مناهجنا



الكتاب كاملاً



معلمة  
صفحة  
ذات السلاسل - الكويت  
أودع بمكتبة الوزارة تحت رقم (٥٧) بتاريخ ٢٠١٤/٥/٦ م  
Kuwaitteacher.Com





صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح  
أمير دولة الكويت

معلمة في الكويت  
KuwaitTeacher.Com

معلمة في الكويت  
KuwaitTeacher.Com



سَمُو الشَّيْخِ نَوَافِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّبَّاحِ

وَلِيِّ عَهْدِ دَوْلَةِ الْكُوَيْتِ

معلمة في الكويت  
صفوة  
KuwaitTeacher.Com

معلمة في الكويت  
KuwaitTeacher.Com

## مقدمة

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. محمد بن عبدالله وصحبه أجمعين.

عندما شرعت وزارة التربية في عملية تطوير المناهج. استندت في ذلك إلى جملة من الأسس والمرتكزات العلمية والفنية والمهنية. حيث راعت متطلبات الدولة وارتباط ذلك بسوق العمل، وحاجات المتعلمين والتطور المعرفي والعلمي. بالإضافة إلى جملة من التحديات التي تمثلت بالتحدي القيمي والاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي وغيرها. وإن كنا ندرك أن هذه الجوانب لها صلة وثيقة بالنظام التعليمي بشكل عام وليس المناهج بشكل خاص.

وما يجب التأكيد عليه. أن المنهج عبارة عن كم الخبرات التربوية والتعليمية التي تُقدم للمتعلم. وهذا يرتبط أيضًا بعمليات التخطيط والتنفيذ. والتي في محصلتها النهائية تأتي لتحقيق الأهداف التربوية. وعليه أصبحت عملية بناء المناهج الدراسية من أهم مكونات النظام التعليمي. لأنها تأتي في جانبين مهمين لقياس كفاءة النظام التعليمي. فهي من جهة تمثل أحد المدخلات الأساسية ومقياسًا أو معيارًا من معايير كفاءته من جهة أخرى. عدا أن المناهج تدخل في عملية إنماء شخصية المتعلم في جميع جوانبها الجسمية والعقلية والوجدانية والروحية والاجتماعية.

من جانب آخر. فنحن في قطاع البحوث التربوية والمناهج. عندما نبدأ في عملية تطوير المناهج الدراسية. ننطلق من كل الأسس والمرتكزات التي سبق ذكرها. بل إننا نراها محفزات واقعية تدفعنا لبذل قصارى جهدنا والمضي قدمًا في البحث في المستجدات التربوية سواء في شكل المناهج أم في مضامينها. وهذا ما قام به القطاع خلال السنوات الماضية. حيث البحث عن أفضل ما توصلت إليه عملية صناعة المناهج الدراسية. ومن ثم إعدادها وتأليفها وفق معايير عالمية استعدادًا لتطبيقها في البيئة التعليمية.



ولقد كانت مناهج العلوم والرياضيات من أول المناهج التي بدأنا بها عملية التطوير، إيماناً بأهميتها وانطلاقاً من أنها ذات صفة عالمية، مع الأخذ بالحسبان خصوصية المجتمع الكويتي وبيئته المحلية، وعندما أدركنا أنها تتضمن جوانب عملية التعلم ونعني بذلك المعرفة والقيم والمهارات، قمنا بدراساتها وجعلها تتوافق مع نظام التعليم في دولة الكويت، مركزين ليس فقط على الكتاب المقرر ولكن شمل ذلك طرائق وأساليب التدريس والبيئة التعليمية ودور المتعلم، مؤكداً على أهمية التكامل بين الجوانب العلمية والتطبيقية حتى تكون ذات طبيعة وظيفية مرتبطة بحياة المتعلم.

وفي ضوء ما سبق من معطيات وغيرها من الجوانب ذات الصلة التعليمية والتربوية تم اختيار سلسلة مناهج العلوم والرياضيات التي أكملناها بشكل ووقت مناسبين، ولتحقق نقلة نوعية في مناهج تلك المواد، وهذا كله تزامن مع عملية التقويم والقياس للأثر الذي تركته تلك المناهج، ومن ثم عمليات التعديل التي طرأت أثناء وبعد تنفيذها، مع التأكيد على الاستمرار في القياس المستمر والمتابعة الدائمة حتى تكون مناهجنا أكثر تفاعلية.

### د. سعود هلال الحربي

الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج

# المحتويات

## الجزء الأول

الوحدة الأولى: الحركة

الوحدة الثانية: المادة وخواصها الميكانيكية

## الجزء الثاني

الوحدة الثالثة: الاهتزاز والموجات

الوحدة الرابعة: الكهرباء الساكنة (الإلكتروستاتيكية) والتيار المستمر

معاً  
صفوة الكويت  
KuwaitTeacher.Com

# محتويات الجزء الأول

12	الوحدة الأولى : الحركة
13	الفصل الأول: الحركة في خطّ مستقيم
14	الدرس 1-1: مفهوم الحركة والكميّات الفيزيائية اللازمة لوصفها
26	الدرس 1-2: معادلات الحركة المعجلة بانتظام في خطّ مستقيم
31	الدرس 1-3: السقوط الحرّ

40	الفصل الثاني: القوّة والحركة
41	الدرس 2-1: مفهوم القوّة والقانون الأول لنيوتن
46	الدرس 2-2: القانون الثاني لنيوتن – القوة والعجلة
55	الدرس 2-3: القانون الثالث لنيوتن والقانون العامّ للجاذبية
62	مراجعة الوحدة الأولى
68	الوحدة الثانية: المادّة وخواصّها الميكانيكية
69	الفصل الأوّل: خواصّ المادّة
70	الدرس 1-1: مقدّمة عن حالات المادّة
75	الدرس 1-2: التغيّر في المادّة
79	الدرس 1-3: خواصّ السوائل الساكنة
96	مراجعة الوحدة الثانية

فصول الوحدة

الفصل الأول

✓ الحركة في خط مستقيم

الفصل الثاني

✓ القوة والحركة

أهداف الوحدة

- ✓ يصف الحركة ويذكر أنواعها.
- ✓ يذكر وحدات قياس الكميات الأساسية ويستنتج وحدات قياس بعض الكميات المشتقة ويسمّي أدوات قياسها.
- ✓ يقارن بين الكميات الأساسية والمشتقة والكميات العددية والكميات المتجهة.
- ✓ يذكر قوانين الحركة الخطية المستقيمة.
- ✓ يفسّر معنى السقوط الحر ويذكر العوامل المؤثرة فيه.
- ✓ يربط معادلات الحركة بمواقف من الحياة اليومية.
- ✓ يكتسب المهارات الذهنية في حلّ الأمثلة والمسائل في الوحدة.
- ✓ يكتسب المهارات العملية في تعيين عجلة الجاذبية الأرضية.
- ✓ يعرف القوة كمتجه ويعرف معنى القصور الذاتي وعلاقته بالكتلة.
- ✓ يستنتج العلاقة بين القوة والحركة.

معالم الوحدة

- اكتشف بنفسك: وصف الحركة وقياسها الفيزياء والمجتمع: تجنب مخاطر السرعة الزائدة.
- الفيزياء والرياضة: زمن التحليق الصلة بعلم الأحياء: الفعل ورد الفعل العلم والتكنولوجيا والمجتمع: من الألعاب النارية إلى الفضاء الخارجي الفيزياء في المجتمع: القانون الثالث لنيوتن والمجتمع.
- العلم والتكنولوجيا والمجتمع: لماذا يستخدم محمّل الكريات في الأجزاء الداخلية للآلات الميكانيكية؟



هناك العديد من المفاهيم الفيزيائية التي تُفسّر العلاقة الحركية بين الأجسام. على سبيل المثال، إنّ سقوط التفاحة على الأرض سيُفسّر أنّ الأرض تُحاول جذب التفاحة إلى أسفل، وفي الوقت نفسه تُحاول التفاحة جذب الأرض إلى أعلى، وعليه فإنّ هناك قوى متبادلة بين كلّ من الأرض والتفاحة، وهذه القوى متساوية في المقدار ولكنها متضادّة في الاتجاه، وهذه القوى المتبادلة تُسمّى الفعل وردّ الفعل. من خلال دراستك لهذه الوحدة، ومعرفتك لمعادلات الحركة، تستطيع أن تُدرك العلاقة الحركية بين الأجسام.

اكتشف بنفسك

وصف الحركة وقياسها

لإجراء هذا النشاط تحتاج إلى شريط متري وساعة إيقاف.

1. باستخدام الشريط المتري قم بتحديد مسافة خمسة أمتار (حدد المسافة بإشارات واضحة وكبيرة).

2. احسب كم تحتاج من الزمن لقطع مسافة الخمسة أمتار عندما تسير بوتيرة عادية في خط مستقيم. سجّل الزمن اللازم لقطع هذه المسافة.

3. احسب كم تستطيع أن تقطع خلال خمس ثوانٍ عندما تسير بوتيرة عادية في خط مستقيم، سجّل المسافة المقطوعة.

4. كرّر الخطوات 2 و3 عندما تسير بوتيرة أسرع من السابق.

5. كرّر الخطوات 2 و3 عندما تسير بوتيرة أبطأ من السابق.

مقارنة واستنتاج:

في أيّ حالة احتجت إلى زمن أقلّ لقطع مسافة الخمسة أمتار؟

استنتج العلاقة بين المسافة التي قطعتها والزمن المستغرق لقطعها، والسرعة؟



### دروس الفصل

#### الدرس الأوّل

✓ مفهوم الحركة والكميات  
الفيزيائية اللازمة لوصفها

#### الدرس الثاني

✓ معادلات الحركة في خطّ مستقيم

#### الدرس الثالث

✓ السقوط الحرّ



نحن نختبر مفهوم السرعة والعجلة عندما نكون في السيارة .

عندما ننظر حولنا إلى مختلف الأشياء نستطيع أن نلاحظ أنّ بعضها ساكن وبعضها متحرّك، وأنّ بعضها يتحرّك بتسارع وبعضها يتباطأ. فنقول مثلاً إنّ الجدار ساكن وإنّ السيارة متحرّكة، كما أننا نقول بأنّ هذه السيارة تسير بسرعة أكبر من تلك الدراجة. فما المعيار الذي نعتمده في قراراتنا هذه؟

عندما نستنتج أنّ الجسم يتحرّك، نكون قد لاحظنا أنّ هنالك تغييراً في المسافة التي تفصله عنّا أو عن أيّ جسم آخر يكون بمثابة نقطة مرجعية. وعندما نستنتج أنّه ثابت لا يتحرّك، نكون قد لاحظنا بأنّ ليس هنالك أيّ تغيير في المسافة بين الجسم والنقطة المرجعية. لذلك وباختصار، نقول عن نقطة ماديّة إنها متحرّكة بالنسبة إلى نقطة مرجعية إذا تغيّر موقعها عنها بتغيّر الزمن. أمّا لملاحظة سرعة الجسم، يكفي أن نلاحظ المدة التي احتاجها الجسم لقطع مسافة محدّدة، فإن كانت الفترة الزمنية كبيرة نقول بأنّه بطيء، وإن كانت صغيرة نقول بأنّه سريع.

وفي هذا الفصل، سوف نُقدّم شرحاً أوسع لكلّ ما يتعلّق بالحركة والكميات الفيزيائية اللازمة لوصفها من سرعة وعجلة ونوع الحركة وغيرها...

## The Concept of Motion and the Physical Quantities Necessary to Describe it

- ✦ يصف الحركة ويذكر أنواعها .
- ✦ يقارن بين الكميات الأساسية والمشتقة والكميات العددية والكميات المتجهة .
- ✦ يذكر وحدات قياس الكميات الأساسية ويستنتج وحدات قياس بعض الكميات المشتقة ويسمّي أدوات قياسها .



(شكل 1)

حركة في تمايل الأشجار وتساقط أوراقها

تظهر الحركة في الكثير من الأشياء حولنا، فإننا نراها في نشاطات الإنسان اليومية، وفي السيارة على الطريق السريع، وفي تمايل الأشجار وتساقط أوراقها (الشكل 1)، وفي حركة النجوم وغيرها . من السهل التحقق من الحركة ولكن من الصعب وصفها . حتى علماء اليونان الذين اشتهروا منذ 2000 عام بما قدموه للفيزياء من مفاهيم ما زالت تُدرّس حتى اليوم، فشلوا في وصف الحركة! فشلوا لأنهم لم يفهموا بعض الكميات الفيزيائية اللازمة لوصفها مثل مفهوم المعدل أي المقدار المقسوم على الزمن، والذي سنعالجه في سياق درسنا، كما سنتعرّف ماهية القياس والاختلاف بين الكميات الأساسية والمشتقة، وأدوات ووحدات قياسها بحسب النظام الدولي للوحدات (SI)، وذلك لأهمية الموضوع في دراسة الحركة ووصفها . وسنصف الحركة مستخدمين مفهوم المعدل لتعرّف على كلٍّ من السرعة والعجلة وتُميّز بينهما .



(شكل 2)

عملية القياس مهمة جدًا لأنها جزء من حياتنا اليومية، ومن دونها لا نستطيع أن نقدر ما حولنا من أطوال أو أحجام أو فترات زمنية .

### 1. القياس والوحدات العلمية

تعني عملية القياس (الشكل 2) مقارنة مقدار معين بمقدار آخر من نوعه، أو كمية بكمية أخرى من نوعها، وذلك لمعرفة عدد مرّات احتواء الأول على الثاني، وغالبًا ما توصف عملية القياس بالأرقام العددية والوحدات . ونظام القياس المستخدم في معظم أنحاء العالم هو النظام الدولي للوحدات (SI) International System الذي يُعرّف بالنظام المتري، وهو




(شكل 3)

يُمكنك استخدام المسطرة المترية في قياس الأطوال الأقل من 1m .



(شكل 4)

يُستخدم جهاز الميكرومتر في قياس الأطوال الصغيرة جدًا .



(شكل 5)

تُستخدم القدمة ذات الوردية في القياسات الدقيقة .



(شكل 6)

الميزان ذو الكفتين لتقدير كتل الأجسام

يختلف بعض الشيء عن الأنظمة الأخرى للقياس والوحدات .  
الوحدات الأساسية في النظام المتري (SI) والتي تستخدم في قياس الكميات الأساسية (الطول - الكتلة - الزمن) موضحة في الجدول (1).

الرمز	اسم الوحدة	القياس
m.	Meter متر	Length الطول
kg.	Kilogram كيلوجرام	Mass الكتلة
s.	Second ثانية	Time الزمن

(جدول 1)

وحدات النظام المتري (SI units)

## Length

### 1.1 قياس الطول

يُعتبر المتر (m) أساس النظام المتري (SI) في قياس الطول، ومتر واحد يُساوي تقريبًا المسافة الرأسية بين مقبض باب الفصل الدراسي وأرضيته .

وتُسمى الأداة المستخدمة في قياس الطول بالمسطرة المترية (الشكل 3). أما في حالة الأطوال القصيرة جدًا، فتُستخدم أدوات خاصة يُسمى أحدها الميكرومتر (الشكل 4) والآخر القدمة ذات الوردية (الشكل 5). وعند قياس مسافات طويلة، نستخدم وحدات أكبر من المتر، كالكيلومتر (km)، حيث يُساوي الكيلومتر الواحد 1000 متر .

## Mass

### 2.1 قياس الكتلة

يُعتبر الكيلوجرام (kg) وحدة قياس الكتل في النظام الدولي (SI).

تُقاس الكتلة في النظام المتري (SI) بوحدة الكيلوجرام (kg). وفي المعمل يُمكن استخدام وحدات أقل من الكيلوجرام (kg)، مثل الجرام (g) الذي يُساوي  $\frac{1}{1000}$  من الكيلوجرام، وتُستخدم أحيانًا وحدات أقل من الجرام، مثل الميليغرام (mg) ويُساوي  $\frac{1}{1000}$  من الجرام. ولتقدير كتل الأجسام، تُستخدم أداة تُسمى الميزان، كما هو موضح في الشكل (6). يتكوّن الميزان من كفتين، توضع الكتلة المجهولة في إحدى الكفتين، ثم توضع كتل معلومة في الكفة الأخرى حتى تتم عملية الاتزان بينهما، بعد ذلك يُمكن تقدير الكتلة المجهولة. وهناك بعض الموازين (الموازين الرقمية) التي تُقدّر كتل الأجسام مباشرة من دون استخدام كتل معلومة .





(شكل 7)

تعتبر الساعة الذرية المصدر الرئيسي لقياس الزمن في المعهد الدولي للقياس والتكنولوجيا (NIST).



(شكل 8)

ساعة الإيقاف اليدوية



(شكل 9)

ساعة تعمل بالخلايا الكهروضوئية



(شكل 10)

الوماض الضوئي

يُقَدَّر الزمن في النظام المتري (SI) بالثانية (s)، والأجزاء الصغيرة من الثانية تُقَدَّر بالمللي ثانية (ms). كما توجد وحدات أكبر مثل الدقيقة (min)، والساعة (hr)، واليوم (day) والسنة (year). ويمكن قياس الزمن بواسطة جهاز يُسمَّى ساعة الإيقاف اليدوية أو ساعة الإيقاف الكهربائية كما بالشكل (8، 9). ويُسمَّى الجهاز الذي يُستخدم لقياس التردد والزمن الدوري للأجسام بالوماض الضوئي (الشكل 10).

### 1. الكميات الفيزيائية الأساسية والكميات المشتقة

#### Fundamental physical quantities and derived quantities

الكميات الفيزيائية الأساسية Fundamental physical quantities هي سبع كميات منها: الطول (L)، الكتلة (m)، الزمن (t). وهناك كميات فيزيائية تُسمَّى الكميات المشتقة Derived quantities مثل السرعة، والعجلة، والتردد، والطاقة، والضغط، والقدرة. معظم الكميات الفيزيائية يُمكن التعبير عنها بدلالة الطول (L) والكتلة (m) والزمن (t). وهناك ما يُسمَّى بمعادلة الأبعاد، وهي تعتمد أساساً على كلٍّ من الأبعاد الثلاثة (L, m, t). على سبيل المثال، أبعاد السرعة هي  $(L \cdot t^{-1})$  كما أنّ أبعاد الحجم هي  $(L^3)$ . يُمثّل الجدول (2) معادلة الأبعاد لبعض الكميات الفيزيائية:

الوحدة	الأبعاد	الكمية الفيزيائية
kg	[m]	الكتلة
m	[L]	الطول
s	[t]	الزمن
m <sup>2</sup>	[L <sup>2</sup> ]	المساحة
m <sup>3</sup>	[L <sup>3</sup> ]	الحجم
m/s	L/t	السرعة (v)
m/s <sup>2</sup>	L/t <sup>2</sup>	العجلة (a)
kg/m <sup>3</sup>	m/L <sup>3</sup>	الكثافة (d)
kg.m/s <sup>2</sup>	m.L/t <sup>2</sup>	القوة (F)
kg/m.s <sup>2</sup>	m/L.t <sup>2</sup>	الضغط (القوة/المساحة)


(جدول 2)

معادلات الأبعاد لبعض الكميات الفيزيائية




(شكل 11)

أي السفينتين تتحرك بالنسبة إلى الأخرى؟



(شكل 13)

حركة المقذوفات



(شكل 15)

الحركة الاهتزازية

ولكي نُضيف أو نطرح كمّيتين فيزيائيتين يجب أن يكون لهما الأبعاد نفسها. ويُمكننا أن نضيف أو نطرح قوّتين مثلاً، ولكن لا نستطيع إضافة قوّة إلى سرعة، لأنّهما كمّيتان مختلفتان وليس لهما الأبعاد نفسها.

### Motion and its kinds


### 3. الحركة وأنواعها

يرتبط مفهوم الحركة بتغيّر موضع الجسم بمرور الزمن بالنسبة إلى موضع جسم آخر ساكن. فعندما يتغيّر موضع جسم خلال فترة من الزمن (ما يُسمّى بالمعدّل)، يُقال إنّ الجسم قد تحرك خلال هذه الفترة (الشكل 11). ومن أنواع الحركة:

### Translational Motion

### 1.3 الحركة الانتقالية

في الحركة الانتقالية Translational Motion يتحرك الجسم بين نقطتين، الأولى تُسمّى نقطة البداية والأخرى نقطة النهاية. وتُعتبر الحركة في خطّ مستقيم (الشكل 12) وكذلك حركة المقذوفات (الشكل 13) من أمثلة الحركة الانتقالية.




(شكل 12)

الحركة في خطّ مستقيم

### Periodic Motion

### 2.3 الحركة الدورية

تُكرّر الحركة الدورية Periodic Motion نفسها خلال فترات زمنية متساوية، كما في حالة الحركة الدائرية (الشكل 14) والحركة الاهتزازية (الشكل 15).



(شكل 14)

حركة دائرية

تحتاج دراسة حركة الأجسام بصفة عامة، أن نعرف بعض المفاهيم الأساسية مثل المسافة، الإزاحة، السرعة والعجلة.



## 4. الكميّات العددية والكميّات المتّجهة

### Scalar quantities and vector quantities

#### 1.4 الكميّات العددية

##### المسافة

##### Distance

عندما يتغيّر موضع جسم خلال فترة زمنية ما، يُقال إنّ الجسم قد تحرّك مسافة محدّدة. وتُعرّف المسافة بطول المسار المقطوع أثناء الحركة من موضع إلى موضع آخر. مثلاً، إذا أردت القيام برحلة إلى مدينة الشعبية بادئاً رحلتك من مدينة الكويت، فإنّ المسافة بين الكويت والشعبية تعتمد على طول المسار الذي اتّبعت في الرحلة (الشكل 16).

وتُعتبر المسافة كميّة عددية، لأنّه تلزم معرفة مقدارها فقط (المقدار يتضمّن القيمة العددية والوحدة المستخدمة). على سبيل المثال، إذا قيل إنّ المسافة بين مدينة الكويت ومدينة الشعبية مقدارها 44km، فإنّ الرقم 44 يُمثّل القيمة العددية، و km هو وحدة قياس المسافة.

##### السرعة العددية

##### Speed

في حياتنا اليومية نصف حركة بعض الأشياء من حولنا بالتعبير «سريعة»، وبعضها الآخر بالتعبير «بطيئة»، ومثل هذا الوصف لا يستند إلى أساس كميّ. ولمقارنة حركة الأجسام بشكل كمي، ينبغي أن نستند إلى كميّة تُميّز هذا الوصف وهي السرعة العددية. فإذا تحرّكت سيارتان في المسار نفسه (المسافة)، تكون حركة إحداهما أسرع من الأخرى إذا استغرقت مدّة زمنية أقلّ من الأخرى في قطع هذا المسار. في المقابل، إذا تحرّكت السيارتان على مسارين مختلفين في الطول، وقطعتا المسارين في فترة زمنية متساوية، فإنّ السيّارة التي تقطع المسافة الأطول تكون أسرع من الأخرى.

من الملاحظتين السابقتين، يتّضح أنّ كلّاً من طول المسار (المسافة) والزمن المستغرق لقطع هذه المسافة، عاملان أساسيان في وصف الحركة، مثلاً: السيّارة التي تقطع مسافة مقدارها 44km خلال فترة زمنية مقدارها ساعة واحدة، يُقال إنّها تسير بسرعة عددية مقدارها 44km/h.

وتُعرّف السرعة العددية Speed بأنّها المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن.

$$v = \frac{d}{t} ، \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} = \text{السرعة}$$

وحدات قياس السرعة هي (km/h) أو (m/s)، وهناك دول تستخدم وحدة (miles/h) لقياس السرعة.

من خلال الجدول (3)، على الطالب أن يستنتج العامل المستخدم في تحويل السرعة من (km/h) إلى (m/s).



(شكل 16)

المسافة هي طول المسار المقطوع. فالمسافة بين مدينتي الكويت والأحمدي، على سبيل المثال، تُساوي 37km ومن الكويت إلى الشعبية تُساوي 44km

قيم بعض السرعات في وحدات مختلفة

$$5 \text{ m/s} = 18 \text{ km/h}$$

$$15 \text{ m/s} = 54 \text{ km/h}$$

$$20 \text{ m/s} = 72 \text{ km/h}$$

$$25 \text{ m/s} = 90 \text{ km/h}$$

$$30 \text{ m/s} = 108 \text{ km/h}$$

$$50 \text{ m/s} = 180 \text{ km/h}$$

(جدول 3)

## السرعة المتوسطة

## Average Speed

عندما نقوم برحلة من مدينة (أ) إلى مدينة (ب)، مثلاً، فإن المسافة بين المدينتين، طبقاً لمسار معين، تُساوي حوالي (210)km. ولكن في الواقع لن تسير السيارة بسرعة ثابتة، فأحياناً تسير بسرعة (90)km/h، وأحياناً أخرى (80)km/h، وأحياناً بسرعة (60)km/h. إذاً لن تسير السيارة بسرعة منتظمة.

فإذا أردنا معرفة ما يُسمّى السرعة المتوسطة Average speed، علينا معرفة الزمن الكلي الذي استغرقتة الرحلة (وليكن ثلاث ساعات) وكذلك المسافة الكلية بين المدينتين حوالي (210)km وبذلك تكون السرعة

المتوسطة هي:

$$\frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}} = \text{السرعة المتوسطة } (\bar{v})$$

$$\bar{v} = \frac{d_{\text{total}}}{t_{\text{total}}} = \frac{210}{3} = (70)\text{km/h}$$

$$= \frac{70 \times 1000}{60 \times 60} = (19.4)\text{m/s}$$

### مثال (1)

يوجد في معظم السيارات عدّاد للمسافات بجانب عدّاد السرعة. احسب السرعة المتوسطة إذا كانت قراءة عدّاد المسافات عند بدء الحركة صفر، وبعد نصف ساعة كانت (35)km.

#### طريقة التفكير في الحلّ

1. حلّل: اذكر المعلوم وغير المعلوم

المعلوم: الزمن الكلي  $t = (0.5)\text{h}$

المسافة الكلية  $d = (35)\text{km}$

غير المعلوم: السرعة المتوسطة  $\bar{v}$

2. احسب غير المعلوم:

باستخدام العلاقة الرياضية:

$$\bar{v} = \frac{d_{\text{total}}}{t_{\text{total}}}$$

بالتعويض عن المقادير المعلوم في المعادلة نحصل على:

$$\bar{v} = \frac{d_{\text{total}}}{t_{\text{total}}}$$

$$\bar{v} = \frac{35}{0.5} = (70)\text{km/h} = \frac{70 \times 1000}{60 \times 60} = (19.4)\text{m/s}$$

3. قيم: هل النتيجة مقبولة؟

تُعتبر السرعة (70)km/h سرعة مقبولة ومنطقية للسيارة.

## مسائل تطبيقية

1. قطع لاعب على دراجته الهوائية مسافة  $20\text{ km}$  في مدّة زمنية مقدارها ساعتان .

احسب السرعة المتوسطة للدراجة .

الحل:  $10\text{ km/h}$

2. قطع متسابق ركضاً  $150$  متراً في دقيقة واحدة . ما هي السرعة المتوسطة له؟

الحل:  $2.5\text{ m/s}$

3. يستطيع الفهد (الشكل 18) أن يعدو بسرعة ثابتة مقدارها

$25\text{ m/s}$  . احسب المسافة التي يُمكن أن يقطعها خلال:

(أ)  $10\text{ s}$

(ب)  $1\text{ min}$

(أ)  $250\text{ m}$

(ب)  $1500\text{ m}$

الحل:




(شكل 18)

يُعتبر الفهد من أسرع الحيوانات الأرضية وأحياناً تصل سرعة عدوه إلى أكثر من  $100\text{ km/h}$  .

## الإزاحة

## Displacement




(شكل 21)  
الفرق بين المسافة والإزاحة

عرفنا ممّا سبق أن المسافة كميّة عددية تلزم معرفة مقدارها فقط . ولكي نصف حركة الأجسام بصورة تفصيلية، يلزمنا معرفة اتجاه الحركة أيضًا . فعندما يكون مقدار المسافة مقترنًا بالاتّجاه، تُسمّى في هذه الحالة الإزاحة . تُعرّف الإزاحة Displacement بأنها المسافة في خط مستقيم في اتجاه محدد، فإذا تحرك جسم من الموضع (A) متّجهاً إلى الموضع (B) كما في (الشكل 21)، فالتغيّر في موضع الجسم تُمثله القطعة المستقيمة التي بدايتها النقطة (A) ونهايتها النقطة (B) وتُسمّى الإزاحة .

## السرعة المتّجهة

## Velocity

السرعة المتّجهة Velocity هي السرعة العددية ولكن في اتجاه محدد . مثلاً، هناك سيارة تتحرك بسرعة  $80\text{ km/h}$  باتجاه جنوب الكويت، هذا يعني أن مقدار السرعة هو  $80\text{ km/h}$  واتّجاهها هو جنوب الكويت . تكون السرعة المتّجهة منتظمة constant velocity إذا كانت ثابتة القيمة والاتّجاه، وتكون الحركة عندها مستقيمة ومنتظمة .




(شكل 22)  
منحنى (المسافة - الزمن) لسيارة تتحرك  
بسرعة منتظمة




(شكل 23)

يؤدي تغيير اتجاه الحركة إلى سرعة متجهة غير ثابتة .



(شكل 25)

يوضح منحنى (السرعة - الزمن) العجلة الموجبة .



(شكل 26)

يوضح منحنى (السرعة - الزمن) العجلة السالبة .

أما إذا حدث تغيير لأحد عناصر السرعة المتجهة فيُقال إن الجسم يتحرك بسرعة متجهة متغيرة *changing velocity* كما في (الشكل 23). إن تحرك جسم بسرعة عددية ثابتة ولكن في مسار منحني تكون حركته بسرعة متجهة متغيرة .


## تطبيق من الحياة الواقعية

### السرعة المتغيرة:

يوجد داخل كل سيارة ثلاث أدوات يُمكن بواسطتها التحكم في مقدار سرعة السيارة واتجاهها:

أولاً - دواصة البنزين، التي يُمكن بواسطتها زيادة مقدار السرعة .  
ثانياً - دواصة الفرامل، والتي يُمكن بواسطتها التحكم في تقليل مقدار السرعة .

ثالثاً - عجلة القيادة، والتي يُمكن بواسطتها تغيير اتجاه حركة السيارة (الشكل 24).



(شكل 24)

سيارة تسير في مسار دائري، ربما تسير بسرعة ثابتة المقدار، ولكنها ليست ثابتة الاتجاه، لأن اتجاه الحركة يتغير في كل لحظة بواسطة عجلة القيادة .

## Acceleration

## العجلة

ناقشنا في ما سبق مفهوم السرعة المتجهة المتغيرة . فإذا راقبنا حركة سيارة تسير على طريق (مسار)، لاحظنا أن سرعة السيارة تتغير بحسب أحوال الطريق، فتارة تزداد وتارة تتناقص . وتسمى الحركة التي يحدث فيها تغيير في مقدار السرعة أو اتجاهها أو الاثنين معاً الحركة المعجلة . والكمية الفيزيائية التي تُعبّر عن تغيير متجه السرعة خلال وحدة الزمن تُسمى بالعجلة **Acceleration** ورمزها «a» ووحدة قياسها بحسب النظام الدولي للوحدات هي  $(m/s^2)$  .

وبما أن السرعة هي كمية متجهة، فإن معدل تغييرها بالنسبة إلى الزمن، أي العجلة، هو أيضا كمية متجهة .




$$\text{العجلة} = \frac{\text{السرعة النهائية} - \text{السرعة الابتدائية}}{\text{التغيير في الزمن}} = \frac{\text{التغيير في متجه السرعة}}{\text{التغيير في الزمن}}$$

$$a = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{t} \text{ (m/s}^2\text{)}$$

منحنى (السرعة - الزمن):

يُمكن للعجلة أن تكون موجبة إذا ازدادت قيمة السرعة مع الزمن، ونقول إنَّ الحركة متسارعة (الشكل 25). ويُمكن أن تكون العجلة سالبة إذا تناقصت قيمة السرعة مع الزمن ونصف الحركة بأنَّها حركة متباطئة (الشكل 26). أما إذا بقيت السرعة ثابتة مع الزمن أي أنَّ العجلة تساوي صفرًا فنقول إنَّ الحركة بسرعة منتظمة (الشكل 27).



(شكل 27)

منحنى (السرعة - الزمن) يوضح الحركة بسرعة منتظمة

### العلاقة بين السرعة العددية والسرعة المتجهة والعجلة

عندما تكون داخل سيارة تتحرك في مسار منحنٍ بسرعة ثابتة، ولتكن  $50 \text{ km/h}$ ، سوف تشعر بتأثير العجلة، إذ إنَّ جسمك سوف يتحرك داخل السيارة في اتجاه معاكس لاتجاه انحناء الطريق. وبالرغم من أنَّ مقدار السرعة ثابت عددياً  $50 \text{ km/h}$ ، إلا أنَّ اتجاه السرعة قد تغير (لأنَّ الحركة في طريق منحنٍ تُؤدِّي إلى تغيير السرعة المتجهة).

### مثال (3)

خلال فترة زمنية مدتها خمس ثوانٍ، يتغير مقدار سرعة سيارة تتحرك في خطّ مستقيم من  $(50)\text{km/h}$  إلى  $(65)\text{km/h}$ . وفي الفترة الزمنية نفسها، تتحرك عربة نقل في خطّ مستقيم، من السكون إلى أن تصل إلى سرعة مقدارها  $(15)\text{km/h}$ . أيهما يتحرك بعجلة أكبر؟ احسب العجلة التي تتحرك بها كلّ من السيارة وعربة النقل.

#### طريقة التفكير في الحلّ

1. حلّ: اذكر المعلوم وغير المعلوم

المعلوم: الزمن للسيارتين الأولى والثانية :  $t = (5)\text{s}$

السيارة: السرعة الابتدائية  $(50)\text{km/h}$

السرعة النهائية  $(65)\text{km/h}$

عربة النقل: السرعة الابتدائية  $(0)\text{km/h}$

السرعة النهائية  $(15)\text{km/h}$

غير المعلوم: أيهما يتحرك بعجلة أكبر؟

#### 2. احسب غير المعلوم:

من خلال الأرقام، يتضح أنّ كلاً من السيارة وعربة النقل لهما زيادة في السرعة بمقدار  $(15)\text{km/h}$  خلال خمس ثوانٍ أي لهما العجلة نفسها ومقدارها هو:

$$\text{العجلة} = \frac{\text{التغير في متجه السرعة}}{\text{التغير في الزمن}}$$

$$a = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{\Delta t}$$

$$= \frac{15 \times 1000}{5 \times 1 \times 60 \times 60} = (0.83)\text{m/s}^2$$

#### 3. قيم: هل النتيجة مقبولة؟

إنّ قيمة العجلة منطقية لسيارة أو عربة نقل.

## مراجعة الدرس 1-1

أولاً - ضع علامة (✓) في المربع الواقع أمام الإجابة الأنسب لكل مما يلي:

1. واحدة مما يلي ليست من الكميات الفيزيائية الأساسية وهي:

الطول

الكتلة

الزمن

العجلة

2. الوحدة الدولية للكتلة هي:

الجرام

الطن

الكيلوجرام

الميليغرام

ثالثاً - اكتب الكميات الفيزيائية لمعادلات الأبعاد التالية:

$$mL^{-2}t^{-2}, mL^{-1}t^{-2}$$

رابعاً - عرّف كلاً من:

(أ) الحركة الانتقالية

(ب) الحركة الدورية

(ج) الإزاحة

(د) السرعة العددية

خامساً - متسابق قطع مسافة (4000)m خلال (30)min. احسب:

(أ) السرعة المتوسطة للمتسابق

(ب) المسافة التي يقطعها المتسابق خلال (1)h من بدء التسابق، إذا

حافظ على السرعة المتوسطة نفسها.


سادساً - احسب عجلة سيارة بدأت حركتها من السكون وبعد

(15)s أصبحت سرعتها (60)km/h.

## Equations of Uniformly Accelerated Rectilinear Motion

## الأهداف العامة

- ✎ يذكر معادلات الحركة الخطية المستقيمة .
- ✎ يربط معادلات الحركة بمواقف من الحياة اليومية .
- ✎ يكتسب المهارات الذهنية في حلّ الأمثلة والمسائل في الوحدة .



(شكل 28)

تسير السيارة بحركة معجلة عندما يحدث تغيير في حالة حركتها (تغير في مقدار السرعة أو الاتجاه أو الاثنين معاً)

ناقشنا لدى دراستنا للكميات المتجهة مفهوم الإزاحة وهو كمية متجهة تُمثّل بالمسار المستقيم الذي يقطعه الجسم من نقطة إلى أخرى باتجاه ثابت، وقلنا بينها وبين المسافة التي هي كمية عددية . واستنتجنا الفرق بين السرعة المتجهة والسرعة العددية، وانتقلنا من مفهوم السرعة المتجهة المتغيرة (المقدار أو الاتجاه أو الاثنين معاً مع مرور الزمن) (الشكل 28) لنُعرّف الحركة المعجلة، وعرّفنا العجلة بأنها تغير متجه السرعة خلال وحدة الزمن ووحدة قياسه هي  $(m/s^2)$  . في هذا الدرس، سوف ندرس الحركة المتغيرة في مقدار السرعة من دون الاتجاه أي الحركة المعجلة على خط مستقيم والتي تُسمى الحركة المعجلة بانتظام في خط مستقيم **Uniformly Accelerated Rectilinear Motion** (أو الحركة الخطية بعجلة ثابتة)، وسنكتب معادلتها ونستخدمها في حلّ بعض المسائل خلال الدرس .


## 1. معادلات الحركة المعجلة بانتظام

## Equations of uniformly accelerated motion

هناك ثلاث معادلات أساسية تربط بين المسافة والسرعة والعجلة والزمن في حالة الحركة بعجلة منتظمة، ويُمكن استنتاجها على النحو التالي:

– افترض أنّ هناك جسمًا يتحرك على خط مستقيم بسرعة ابتدائية

**Initial Speed** ( $v_0$ ) . ثم أخذت سرعته تتزايد بانتظام بمعدل زمني ثابت



(شكل 29)

يُمثل العجلة (a)، فإذا واصل الجسم حركته بهذا المعدل لفترة زمنية (t)، فإن مقدار الزيادة في سرعته هي (at)، وتُصبح سرعته عند نهاية الزمن (t) هي:

$$v = v_0 + at \longrightarrow (1.1)$$

هذه علاقة تربط بين الكميات الأربع (t, v\_0, a, v) فإذا عرفت ثلاث كميات منها يُمكنك حساب الكمية الرابعة. ويمكن أن نمثل العلاقة بين السرعة v والزمن t بخط مستقيم يساوي ميله مقدار العجلة (الشكل 29). بعض الحالات الخاصة للعلاقة (1.1):

(أ) إذا بدأ الجسم حركته من سكون (v\_0 = 0) فإن:

$$v = at$$

(ب) إذا كانت العجلة تساوي صفراً (a = 0) فإن:

$$v = v_0$$

أي أن الجسم في هذه الحالة يتحرك بسرعة ثابتة.

## مثال (1)

بدأت سيارة حركتها من سكون، ثم أخذت سرعتها تترادى بانتظام حتى بلغت (60) km/h خلال خمس ثوانٍ. احسب مقدار العجلة لهذه السيارة.

### طريقة التفكير في الحل

1. حلل: اذكر المعلوم وغير المعلوم

المعلوم: السرعة الابتدائية v\_0 = (0)m/s

السرعة النهائية v = (60)km/h

الزمن t = (5)s

غير المعلوم: العجلة؟

2. احسب غير المعلوم

باستخدام المعادلة الرياضية والتعويض عن المقادير المعلوم في المعادلة:

$$a = \frac{v - v_0}{t} = \frac{60 \times 1000}{1 \times 60 \times 60 \times 5} = (3.33)m/s^2$$

3. قيم: هل النتيجة مقبولة؟

تعتبر العجلة مقبولة لسيارة انطلقت من سكون.

## Braking time

## 2. زمن الإيقاف أو التوقف

عندما يتحرك جسم بعجلة سالبة، فإن سرعته الابتدائية (v\_0) تتناقص تدريجياً إلى أن يتوقف، أي أن السرعة النهائية (v) تُصبح مساوية للصفر، ويُسمى الزمن الذي تُصبح فيه (v = 0) بزمن التوقف (t). يُمكن حساب زمن التوقف (t) من المعادلة (1.1) وذلك بوضع (v = 0) واستبدال



## مسائل مع إجابات

1. يتحرك قطار بسرعة مقدارها  $(100)\text{km/h}$  . بعد كم ثانية يتوقف القطار إذا كان مقدار عجلة التباطؤ  $(a = -5 \text{ m/s}^2)$  الناتج:  $(5.55)\text{s}$
2. جسم يتحرك بسرعة  $(10)\text{m/s}$  بعد مرور  $(10)\text{s}$  أصبحت سرعته  $(30)\text{m/s}$  . احسب المسافة التي قطعها إذا كانت سرعته تتزايد بانتظام . الناتج:  $(200)\text{m}$

عجلة التسارع  $(a)$  بعجلة التباطؤ  $(-a)$  فنحصل على:

$$t = \frac{v_0}{a}$$

## 3. علاقة الإزاحة بالزمن والعجلة

إذا تحرك جسم على خطّ مستقيم بعجلة منتظمة  $(a)$  وكانت سرعته الابتدائية  $(v_0)$  وبعد فترة زمنية  $(t)$  بلغت سرعته النهائية  $(v)$  وكان قد قطع مسافة  $(d)$  بين نقطتين خلال هذه الفترة،

$$d = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \longrightarrow (1.2)$$

العلاقة (1.2) تُعطي الإزاحة  $(d)$  بدلالة السرعة الابتدائية  $(v_0)$  والزمن  $(t)$  والعجلة  $(a)$  .

بعض الحالات الخاصّة للعلاقة (1.2):

(أ) عندما يبدأ الجسم حركته من سكون  $(v_0 = 0)$  فإنّ

$$d = \frac{1}{2} at^2$$

أي أنّ إزاحة جسم متحرك بعجلة منتظمة مبتدئاً من السكون، وفي خطّ مستقيم تتناسب طردياً مع مربع الزمن المستغرق في قطع هذه الإزاحة .

(ب) وعندما يكون مقدار العجلة يساوي صفراً  $(a = 0)$  فإنّ

$$d = v_0 t$$

وفي هذه الحالة يتحرك الجسم بسرعة ثابتة تُساوي سرعته الابتدائية . ويكون أيضاً:

$$\bar{v} = v_0$$

## مثال (2)

سيارة تتحرك بسرعة  $(90)\text{km/h}$ . ضغط قائدها على دواسة الفرامل بحيث تناقصت سرعة السيارة بمعدل ثابت حتى توقف بعد مرور خمس ثوانٍ.  
احسب مقدار: (أ) عجلة السيارة خلال تناقص السرعة.  
(ب) إزاحة السيارة حتى توقفت حركتها.

### طريقة التفكير في الحل

1. حلل: اذكر المعلوم وغير المعلوم

$$v_0 = (90)\text{km/h} \quad \text{المعلوم: السرعة الابتدائية}$$

$$v = (0)\text{km/h} \quad \text{السرعة النهائية}$$

$$t = (5)\text{s} \quad \text{زمن المستغرق للوقوف}$$

غير المعلوم: العجلة - الإزاحة

2. احسب غير المعلوم:

لتحويل السرعة من  $(\text{km/h})$  إلى  $(\text{m/s})$ :

$$v_0 = 90 \times \frac{1000}{1 \times 60 \times 60} = (25)\text{m/s} \quad (\text{أ})$$

وباستخدام المعادلة الرياضية والتعويض عن المقادير المعلومه نحصل على:

$$v = v_0 + at$$

$$0 = 25 + 5a$$

$$a = -\frac{25}{5} = (-5)\text{m/s}^2$$

العجلة السالبة تعني أن سرعة الجسم تناقص.

$$d = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \quad (\text{ب})$$

$$d = 25 \times 5 - \frac{1}{2} \times 5 \times 25 = (62.5)\text{m}$$

3. قيم: هل النتيجة مقبولة؟

المسافة التي قطعها السيارة قبل التوقف كبيرة نسبياً، وهذا يشير إلى صعوبة إيقاف السيارة المسرعة، ويدفعنا للتشديد على أهمية مراعاة حدود السرعة على الطرقات، تجنباً للحوادث.

#### 4. علاقة السرعة النهائية والمسافة والعجلة

$$v^2 = v_0^2 + 2ad \longrightarrow (1.3)$$

### مراجعة الدرس 1-2

**أولاً -** اكتب معادلات الحركة المعجلة بانتظام في خط مستقيم.  
**ثانياً -** قطار يتحرك بسرعة  $(80)m/s$  بعجلة منتظمة سالبة  $(4)m/s^2$ .  
أوجد الزمن اللازم لتوقف القطار عند استخدام الفرامل واحسب  
كذلك إزاحة القطار حتى يتوقف.  
**ثالثاً -** احسب سرعة متزلج بعد  $(3)s$  من انطلاقه من السكون بعجلة  
 $(5)m/s^2$ .

**رابعاً -** احسب عجلة حركة سيارة انطلقت من السكون لتصل  
سرعتها إلى  $(100)km/h$  خلال  $(10)s$ .

**خامساً -** تتحرك سيارة بسرعة  $(30)m/s$  وقد قرر السائق تخفيف  
السرعة إلى النصف مستخدماً عجلة سالبة منتظمة قيمتها  
 $a = (-3)m/s^2$ .

(أ) أوجد الزمن اللازم لتخفيف هذه السرعة عند استخدام المكابح.  
(ب) احسب المسافة التي تقطعها السيارة حتى تصل إلى السرعة  
المطلوبة.

**سادساً -** يمثل الرسم البياني المقابل العلاقة بين (السرعة - الزمن)  
لسيارة متحركة والمطلوب حساب:


(أ) المسافة التي تقطعها السيارة بين  $s [0, 20]$

(ب) المسافة التي تقطعها السيارة بين  $s [20, 40]$

(ج) السرعة المتوسطة للسيارة

الأهداف العامة

- ✎ يُفسّر معنى السقوط الحرّ ويذكر العوامل المؤثرة فيه .
- ✎ يستنتج معادلات الحركة لجسم ساقط في مجال الجاذبية الأرضية .
- ✎ يكتسب المهارات العملية في تعيين عجلة الجاذبية الأرضية .



(شكل 30)

نحن نعرف أنّه من الآمن التقاط بعض الأشياء عندما تسقط من ارتفاع لا يزيد عن المترين ولكنّه من غير الآمن التقاطها إذا سقطت من بالون طائر مثلاً. والسؤال الذي نُفكّر فيه ونظره هو: ما سبب هذا الفرق على الرغم من أنّنا نلتقط الجسم نفسه ولديه الكتلة نفسها؟ في هذا الدرس، سوف نُجيب عن هذا التساؤل ونوضّح العلاقة بين الارتفاع وسرعة السقوط، وكيف تكتسب الأجسام سرعة أكبر خلال زمن سقوطها (الشكل 30) من مكان مرتفع أكثر من سقوطها من مكان قليل الارتفاع.



(شكل 31)

جهاز السقوط الحرّ مثبت عليه مؤشّر عداد السرعة، ويتمّ تسجيل السرعة اللحظية أثناء السقوط الحرّ مع الزمن.

الزمن المستغرق	السرعة اللحظية
0	0
1	10
2	20
3	30
4	40
5	50
:	:
:	:
t	10t

(جدول 4)

### مسألة مع الإجابة

احسب أقصى ارتفاع يصل إليه جسم قُذِف رأسيّاً إلى أعلى بسرعة ابتدائية  $(40)\text{m/s}$   
استعمل  $g = (10)\text{m/s}^2$   
الناتج:  $d = (80)\text{m}$

## 1. السقوط الحرّ في مجال الجاذبية الأرضية

### Free Fall and Gravity

هل تتعجل التفاحة أثناء سقوطها من الشجرة؟

تتحرك التفاحة من السكون، ثم تتزايد سرعتها أثناء سقوطها. ولكن مقدار الزيادة في هذه السرعة يتوقّف على الارتفاع الذي سقطت منه التفاحة. فعندما تسقط من ارتفاع عالٍ يكون الزمن المستغرق لكي تصل التفاحة إلى الأرض كبيراً، ومن ثم تكتسب سرعة أكبر وهذا يعني أنّ حركة التفاحة بعجلة تسارع موجبة.

تجعل الجاذبية الأرضية الأجسام تتعجل نحو الأسفل أثناء سقوطها، وفي الواقع يُؤثر الاحتكاك مع الهواء على عجلة الأجسام، ولكن إذا تخيلنا انعدام مقاومة الهواء، وإنّ الجاذبية هي الشيء الوحيد التي تُؤثر في سقوط الجسم، يكون سقوط الجسم سقوطاً حرّاً.

أي أن السقوط الحرّ Free Fall هو حركة جسم من دون سرعة ابتدائية بتأثير ثقله فقط مع إهمال تأثير مقاومة الهواء (الشكل 31). يُوضّح (الجدول 4) قيمة السرعة اللحظية لجسم يسقط سقوطاً حرّاً كلّ ثانية. ومن خلال الجدول نلاحظ ازدياد قيمة السرعة واكتساب الجسم للعجلة أثناء سقوطه، ويُمكن احتساب هذه العجلة من العلاقة:

$$\text{العجلة} = \frac{\text{التغيّر في السرعة}}{\text{الزمن المستغرق}}$$

$$g = \frac{(10)\text{m/s}}{(1)\text{s}} = (10)\text{m/s}^2$$

عندما يكون التغيّر في مقدار السرعة (m/s) خلال فترة زمنية (s)، تكون العجلة  $(\text{m/s}^2)$  Acceleration.

لذلك، فإنّ العجلة التي تسقط بها الأجسام سقوطاً حرّاً، مع إهمال مقاومة الهواء، هو في حدود  $(10)\text{m/s}^2$ ، وفي حالة السقوط الحرّ يُرمز للعجلة بالرمز (g)، إذ إن (g) هي عجلة الجاذبية الأرضية وهي تساوي تقريباً  $(9.8)\text{m/s}^2$  (للسهولة تُستخدم  $g = (10)\text{m/s}^2$  أثناء حلّ المسائل). ولحساب السرعة اللحظية لجسم يسقط سقوطاً حرّاً تُستخدم العلاقة:

$$\text{السرعة اللحظية (v)} = \text{عجلة الجاذبية (g)} \times \text{الزمن (t)}$$

$$v = gt \rightarrow (1.4)$$

وعلى المتعلّم أن يستخدم (الجدول 4) للتأكد من العلاقة (1.4).



## مثال (1)

ما هي سرعة حجر يسقط نحو الأرض (سقوطاً حرّاً) وذلك بعد فترة زمنية قدرها  $4.5\text{s}$  من لحظة بدء السقوط ، وبعد  $8\text{s}$  من لحظة بدء السقوط ثمّ بعد  $15\text{s}$  من لحظة بدء السقوط؟

طريقة التفكير في الحلّ

1. حلّ: اذكر المعلوم وغير المعلوم

المعلوم: الزمن  $t$ :

(أ)  $t = 4.5\text{s}$

(ب)  $t = 8\text{s}$

(ج)  $t = 15\text{s}$

عجلة الجاذبية الأرضية:  $g = 10\text{m/s}^2$

غير المعلوم: السرعة:  $v = ?$

2. احسب غير المعلوم:

باستخدام المعادلة الرياضية  $v = gt$

بالتعويض عن المقادير المعلومّة في المعادلة نحصل على:


(أ)  $45\text{m/s}$

(ب)  $80\text{m/s}$

(ج)  $150\text{m/s}$

3. قيم: هل النتيجة مقبولة؟

باستخدام (الجدول 4) يُمكن التأكد من الإجابات .



(شكل 32)

معدّل تغيير السرعة العددية في الثانية الواحدة يكون نفسه سواء أكان الجسم صاعداً أم هابطاً.

حتى الآن تمّت دراسة الأجسام التي تسقط سقوطاً حرّاً نحو الأرض، ولكن ماذا عن الأجسام التي تُقذَف لأعلى ثم بعد فترة زمنية، عند ارتفاع معين، تُغيّر اتجاهها وتسقط سقوطاً حرّاً نحو الأرض؟

في اللحظة التي يتم فيها تغيير اتجاه حركة الجسم من أعلى إلى أسفل، تكون قيمة السرعة اللحظية مساوية للصفر، وفي تلك اللحظة (عند أعلى ارتفاع يصل إليه الجسم) يبدأ الجسم في السقوط سقوطاً حرّاً من السكون متّجهاً نحو الأرض. وفي أثناء حركة الجسم لأعلى، يتحرّك الجسم بسرعة متّجهة متناقصة إلى أن يصل مقدار السرعة للصفر. وفي تلك الفترة يتحرّك الجسم بعجلة تباطؤ منتظمة لأنّ مقدار السرعة يتغيّر في كلّ لحظة إلى أن تصل قيمتها إلى الصفر، وبعد ذلك يعكس الجسم اتجاهه أخذاً في السقوط الحر على المسار السابق نفسه نحو الأرض ويبدأ بعجلة تسارع منتظمة.

كما هو موضح في (الشكل 32)، يكون مقدار السرعة اللحظية متساوياً عند النقاط التي تبعد مسافات متساوية عن نقطة بداية الحركة سواء أكان الجسم متحرّكاً لأعلى أم لأسفل. وبالطبع تكون السرعة المتّجهة مختلفة لأنها في اتجاهين متعاكسين. وأثناء كلّ ثانية من الحركة، يتغيّر مقدار كلّ من السرعة العددية، والسرعة المتّجهة بمعدّل  $(10) \text{m/s}$  كلّ ثانية، سواء أكان الجسم متحرّكاً لأعلى أم لأسفل.

## 1. السقوط الحرّ ومسافة السقوط

تختلف سرعة الأجسام المتحرّكة تماماً عن المسافة التي تتحرّكها تلك الأجسام، فالسرعة العددية والمسافة شيئان مختلفان. ولكي نفهم هذا الفرق، نستخدم (الجدول 4) لأنّه في نهاية الثانية الأولى من الحركة تكون السرعة اللحظية للجسم الساقط هي  $(10) \text{m/s}$ . ولكن هل هذا يعني أنّ الجسم سقط مسافة  $(10) \text{m}$  خلال الثانية الأولى؟ بالطبع لا. هناك فرق بين السرعة اللحظية والسرعة المتوسطة المرتبطة بها، فعندما يبدأ الجسم بالسقوط من السكون (أي أنّ سرعته اللحظية تُساوي صفراً) وبعد ثانية واحدة من السقوط أصبحت سرعته اللحظية  $(10) \text{m/s}$ ، تكون سرعته المتوسطة تُساوي  $(5) \text{m/s}$ . هذا يعني أنّ الجسم سقط مسافة  $(5) \text{m}$ . [لحساب القيمة المتوسطة لأي عددين: نجمع العددين ثم نقسم النتائج على 2].

ولكي نفهم الفرق بين السرعة المتوسطة والسرعة اللحظية ومسافة السقوط والعجلة نطرح المسألة التالية:

## مثال (2)

خلال فترة زمنية مدتها  $1\text{s}$ ، في (الجدول 4)، كانت سرعة الجسم الابتدائية  $10\text{m/s}$  والنهائية  $20\text{m/s}$ . احسب قيمة متوسط السرعة لهذا الجسم خلال تلك الفترة الزمنية. ما هي قيمة العجلة؟

### طريقة التفكير في الحل

1. حلل: اذكر المعلوم وغير المعلوم

المعلوم: السرعة اللحظية الابتدائية:  $v_0 = 10\text{m/s}$

السرعة اللحظية النهائية:  $v = 20\text{m/s}$

المدة الزمنية:  $t = 1\text{s}$

غير المعلوم: (أ) السرعة المتوسطة

(ب) العجلة

2. احسب غير المعلوم:

باستخدام العلاقة الرياضية:

$$\bar{v} = \frac{v + v_0}{2} \quad (أ)$$

بالتعويض عن المقادير المعلوم في المعادلة نحصل على:

متوسط السرعة:  $(\bar{v}) = 15\text{m/s}$

أما المسافة المقطوعة خلال هذه المدة تُساوي  $15\text{m}$ .

(ب) العجلة؟

باستخدام المعادلة الرياضية:

$$a = \frac{v - v_0}{t}$$

بالتعويض عن المقادير المعلوم في المعادلة نحصل على:

$$a = \frac{(20\text{m/s}) - (10\text{m/s})}{(1\text{s})} = 10\text{m/s}^2$$

3. قيم: هل النتيجة مقبولة؟

من خلال الإجابات يتبين الفرق بين السرعة المتوسطة والعجلة.

يُوضّح (الجدول 5) العلاقة بين المسافة الكلية التي يتحركها جسم

ساقط سقوطاً حرّاً من سكون، مقابل كل ثانية أثناء السقوط. فبعد

مرور ثانية واحدة من بدء السقوط، نجد أنّ الجسم سقط مسافة

مقدارها  $5\text{m}$ ، وبعد مرور ثانيتين نجد أنّ المسافة الكلية التي

سقطها الجسم تُساوي  $20\text{m}$ . وهكذا تُحسب هذه المسافات في

نهاية كل فترة زمنية وذلك

من خلال العلاقة الرياضية:

$$d = \frac{1}{2} gt^2$$

حيث  $g = 10\text{m/s}^2$

حاول أن تحسب مسافة السقوط الكلية لبعض الفترات الزمنية

مستخدماً (الجدول 5).

الزمن المستغرق (s)	مسافة السقوط (m)
0	0
1	5
2	20
3	45
4	80
5	125
:	:
:	:
t	$\frac{1}{2}gt^2$

(جدول 5)

### تَمْيِيز مَعَارِفَ المَقَارِنَة

حاول أن تحصل على أربع قطع

(أشياء) مختلفة الشكل والنوع،

ولكن متّفقة في الحجم مثلاً: قطعة

من القماش وأخرى من الورق وثالثة

من البلاستيك ورابعة من الألومنيوم.

1. حاول أن تُسقط القطع الأربع من

ارتفاع واحد (ثابت)، كل على

حدة.

2. سجّل الزمن الذي يستغرقه كل


جسم حتّى يصل إلى سطح

الأرض.

3. قارن بين النتائج التي حصلت

عليها. فسّر الاختلاف، إن وُجد.

وَيُمْكِن تَوْضِيحِ الْعِلَاقَةِ بَيْنَ الْمَسَافَاتِ الَّتِي يَقْطَعُهَا الْجِسْمُ أَثْنَاءَ السَّقُوطِ الْحَرِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الزَّمَنِ فِي الرَّسْمِ الْبَيَانِيِّ التَّالِي:



### مثال (3)

سقطت تفاحة من شجرة، وبعد ثانية واحدة ارتطمت بالأرض. احسب قيمة سرعة التفاحة لحظة اصطدامها بالأرض. احسب متوسط السرعة للتفاحة خلال تلك الثانية: ما هو ارتفاع التفاحة عن الأرض عند بدء السقوط؟

**طريقة التفكير في الحل**

1. **حلل:** اذكر المعلوم وغير المعلوم

المعلوم: المدة الزمنية

$$v_0 = (0)\text{m/s}$$

$$t = (1)\text{s}$$

غير المعلوم: (أ) السرعة لحظة الاصطدام بالأرض ؟  $v = ?$

(ب) متوسط السرعة ؟  $\bar{v} = ?$

(ج) مسافة السقوط ؟  $d = ?$

2. **احسب غير المعلوم:**

(أ) باستخدام العلاقة الرياضية:  $v = gt$

بالتعويض عن المقادير المعلوم في المعادلة نحصل على:

$$v = (10)\text{m/s}^2 \times (1)\text{s} = (10)\text{m/s}$$

(ب) وباستخدام العلاقة الرياضية:

$$\bar{v} = \frac{v + v_0}{2}$$

$$\bar{v} = \frac{(10)\text{m/s} + (0)\text{m/s}}{2} = (5)\text{m/s}$$

(ج) أمّا المسافة  $d$  فيمكن حسابها بالطريقتين:

$$d = \bar{v} \times t = (5)\text{ m/s} \times (1)\text{s}$$

$$d = \left(\frac{1}{2}\right) gt^2 = \frac{1}{2} (10)\text{m/s}^2 \times (1^2)\text{s}^2 = (5)\text{m}$$


3. **قيم:** هل النتيجة مقبولة؟

باستخدام (جدول 5)، تحقق من صحّة إجاباتك.



(شكل 33)

تؤثر مقاومة الهواء على سرعة الريشة والعملة المعدنية أثناء السقوط .



(شكل 34)

كلّ من العملة المعدنية والريشة يكتسب العجلة نفسها في حال عدم وجود مقاومة للهواء . ويمكنك إثبات ذلك بإجراء النشاط 3 في كتاب الأنشطة .

### 3. السقوط الحرّ: وزمن السقوط

لاحظنا ممّا سبق أنّ هنالك علاقة بين المسافة التي يقطعها الجسم (d) أثناء السقوط الحرّ والمدّة الزمنية التي استغرقتها عملية السقوط .

$$d = \frac{1}{2} gt^2$$

$$t = \sqrt{\frac{2d}{g}}$$

باستخدام هذه المعادلة يُمكن استنتاج زمن السقوط

### 4. معادلات السقوط الحرّ

بما أنّ السقوط هو حركة مستقيمة بعجلة منتظمة حيث قيمة العجلة تساوي (g)، يُمكننا استخدام معادلات الدرس الثاني «حركة مستقيمة بعجلة منتظمة» لاستنتاج معادلات السقوط الحرّ بتعويض (g) مكان (a) لنحصل على:

$$v = gt$$

سرعة السقوط اللحظية:

$$d = \frac{1}{2} gt^2$$

مسافة السقوط:

$$v^2 = 2gd$$

أمّا المعادلة التي تربط السرعة بالمسافة:

### 5. سقوط الأجسام ومقاومة الهواء لها

حاول أن تُسقط عملة معدنية، وريشة أحد الطيور من ارتفاع معيّن وفي آن واحد. تلاحظ أنّ العملة المعدنية تصل إلى سطح الأرض أسرع من الريشة (الشكل 33). إنّ مقاومة الهواء Air Resistance في الواقع هي المسؤولة عن هذا الاختلاف في قيمة العجلة التي تكتسبها كلّ من العملة المعدنية والريشة. ويُمكن التأكد من تلك الحقيقة عن طريق إجراء التجربة التالية:

1. ضع العملة المعدنية وريشة أحد الطيور في أنبوب زجاجي كما هو موضح في (الشكل 34).

2. اقلب الأنبوب وما في داخله، مع وجود الهواء في داخله، فنلاحظ أنّ العملة المعدنية تسقط بسرعة، في حين أنّ الريشة تتحرّك ببطء.

3. حاول أن تُفرغ الأنبوب من الهواء الموجود في داخله، ثم اقلبه بسرعة بمحتوياته.

تلاحظ أنّ كلّ من الريشة والعملة يسقطان جنبًا إلى جنب كما هو موضح في (الشكل 34) وبعجلة منتظمة تساوي  $g = (10)m/s^2$ .

يُمكن أن تُؤثر مقاومة الهواء في حركة أجسام، مثل الريشة أو الورقة، ولكنّ تأثيرها أقلّ بكثير على الأجسام المصمتة، مثل حجر أو كرة. وفي الكثير من الأحيان تكون مقاومة الهواء صغيرة جدًّا بحيث نهملها لتصبح حركة سقوط الجسم سقوطًا حرًّا.

## مراجعة الدرس 1-3

**أولاً -** ما المقصود بكلّ ممّا يلي:

(أ) السقوط الحرّ

(ب) أقصى ارتفاع

**ثانياً -** يقوم صبيّ بإفلات قطعة نقدية معدنية من شرفة منزله ، ويقوم بقياس الزمن اللازم لوصولها إلى الأرض فيجد أنّه  $s(2.5)$  . ما هو الارتفاع الذي تمّ السقوط منه؟

**ثالثاً -** لو تخيلنا أنّ التجربة السابقة تمّ إجراؤها على القمر حيث عجلة الجاذبية تُساوي  $\frac{1}{6}$  ما كانت عليه على الأرض ، ومن الارتفاع ذاته ، فكم سيكون زمن السقوط؟

**رابعاً -** يسقط حجر من قمة برج شاهق الارتفاع . عند وصوله إلى الطابق الثلاثين ذي الارتفاع  $m(105)$  ، استطاع أحدهم أن يقيس سرعة السقوط فوجد أنّها تساوي  $m/s(40)$  . كم ستبلغ هذه السرعة عند ارتطام الحجر بالأرض؟



الدرس الأول

مفهوم القوة والقانون الأول  
لنيوتن

الدرس الثاني

القانون الثاني لنيوتن - القوة  
والعجلة

الدرس الثالث

القانون الثالث لنيوتن والقانون  
العام للجاذبية



(شكل 37)


لا بدّ من التأثير بقوة أخرى بجانب قوة محرك السيارة لكي تتحرّك السيارة، لأنّ الثلج يُعيق تحركها.

إنّ السكون والحركة هما من الظواهر الطبيعية في هذا الكون. فنجد أنّ حالتَي السكون والحركة للأجسام قد استحوذتا على اهتمام الكثير من الفلاسفة والفيزيائيين بين مختلف الأمم وعلى مرّ العصور. وترتّب على هذا الاهتمام نتائج فكرية وعلمية كثيرة، ومن ثمّ نشأ فرع جديد من فروع الفيزياء يهتمّ بحركة الأجسام وأسبابها ويُسمّى الميكانيكا.

تُوضّح الصورة أعلاه مدى صعوبة حركة السيارة من دون أن تؤثر قوة كافية لتحريكها. قد نستطيع أن نُحرّك السيارة وذلك عند تشغيل محرّكها، ولكن في هذه الحالة قد تكون القوة الناتجة عن محرّك السيارة غير مجدية، حيث إنّ لا توجد قوى احتكاك بين إطارات السيارة والأرض. ولكي تتحرّك السيارة لا بدّ من قوة أخرى بجانب قوة محرّك السيارة حتّى تستطيع السيارة أن تتحرّك.

الأهداف العامة

- ✓ يعرّف القوّة كمتّجه .
- ✓ يعرّف القصور الذاتي وعلاقته بالكتلة .



(شكل 39)

تلاقي القوى المؤثرة عند نقطة التأثير .



(شكل 38)

نحن نعلم أنّ الكتاب الموضوع على الطاولة لا يُمكن أن يتحرّك من تلقاء ذاته، وأنّ السيّارات أو المركّبات لا تتوقف من دون استعمال المكابح ولا تتحرّك أو تُغيّر سرعتها من دون قوّة المحرّك . وتعلّمنا في درس السقوط الحرّ أنّ حركة السقوط الحرّ اعتمدت على قوّة خارجية أثّرت على الجسم وهي قوّة الجاذبية الأرضية . وتعلّمنا أنّ أوراق الشجر تسقط بفعل الجاذبية، ولكنّ الهواء يُغيّر حركتها فلا تسقط عمودياً كما هو مفترض . ومن هذه الأمثلة وغيرها نفهم العلاقة السببية بين القوّة والحركة .


فالقوّة Force هي المؤثر الخارجي الذي يُؤثر على الأجسام مسبباً تغييراً في شكل الجسم أو حجمه أو حالته الحركية أو موضعه .

1. مفهوم القوّة كمتّجه

القوّة كمّية متّجهة تتحدّد بثلاثة عناصر :

1. نقطة التأثير
2. الاتجاه
3. المقدار (الشدّة)


إذا أثّرت عدّة قوى مستوية على نقطة ماديّة، فإنّ هذه القوى لا بدّ أن تكون متلاقية عند نقطة التأثير كما هو موضح في (الشكل 39) . فمن الممكن أن تُؤثر قوتان أو أكثر على جسم ما من دون أن تُغيّر من حالته التي هو عليها من سكون أو حركة، بسرعة متّجهة ثابتة، إذ إنّ هذه القوى يُلغي بعضها تأثير البعض الآخر .



(شكل 41)

العالم الإيطالي جاليليو جاليليو (1564 – 1642)  
من مؤسسي الطريقة العلمية (المنهج  
العلمي) في الاكتشافات العلمية الحديثة

بعبارة أخرى، تُساوي محصلة هذه القوى صفرًا (جمع اتجاهي). ومن ثم يلزم وجود قوى محصلتها لا تُساوي صفرًا، وعادة ما تُسمّى قوى غير متزنة، وذلك لإحداث تغيير في حالة جسم ما من سكون إلى حركة أو العكس. وفي غياب قوة محصلة مؤثرة، يبقى الجسم الساكن ساكنًا، ويبقى الجسم المتحرك في خطّ مستقيم متحرّكًا بسرعة متّجهة منتظمة (الشكل 40).



(شكل 43)

إسحق نيوتن (1642 – 1727) أحد العلماء العظماء في المجال العلمي حيث ساهمت أفكاره في الكثير من العلوم ، مثل الرياضيات والفلك والفيزياء والميكانيكا . توصل إلى قوانين الحركة المعروفة باسمه وكان في منتصف العشرينيات من عمره .



(شكل 44)

تظل الأشياء ساكنة ما لم تُؤثر عليها قوة خارجية .



(شكل 45)

ماذا يحدث لراكب الدراجة عندما تقف الدراجة فجأة؟ ما هي القوة التي تُؤثر على راكب الدراجة؟

### 3. القانون الأول لنيوتن - قانون نيوتن للقصور الذاتي


وُلد إسحق نيوتن سنة 1642 (الشكل 43) . وعندما بلغ الرابعة والعشرين من عمره ، استطاع أن يُعيد صياغة النتائج التي توصل إليها جاليليو في ما يُسمّى بالقانون الأول لنيوتن ، والذي عادة ما يُسمّى قانون القصور الذاتي .

وينص القانون على أنه «يبقى الجسم الساكن ساكناً ، ويبقى الجسم المتحرك في خطٍّ مستقيم متحركاً بسرعة منتظمة ما لم تُؤثر على أيٍّ منهما قوةٌ تُغيّر في حالتهما» (الشكل 44) . نستطيع أن نُدرك القسم الأول من القانون بسهولة ، وذلك من خلال ملاحظتنا اليومية . فالجسم الساكن يبقى ساكناً ما لم تُؤثر عليه قوةٌ تُحرّكه .

أما القسم الثاني من القانون فيمكن تصوّره من خلال راكب الدراجة الموضح في (الشكل 45) الذي يُحرّك الدوّاسة برجليه فيجعل الدراجة تنطلق على الطريق .

بعد ذلك ، يتوقّف راكب الدراجة عن تحريك الدوّاسة ، ولكن يُلاحظ أنّ الدراجة تستمرّ في الحركة إلى أن تقف بعد مسافة ما .





(شكل 46)

يمكنك أن تُقدّر كمية المادة الموجودة في العلبة عندما تركلها بقدمك .

## تطبيقات حياتية

### على القصور الذاتي

#### بماذا تُفسّر؟

- ✎ اندفاع التلاميذ إلى الأمام عند توقّف باص المدرسة فجأة ومحاولة كلّ منهم الاستناد إلى الآخر أو الإمساك بأحد أجزاء الباص الثابتة .
- ✎ تأكيد شرطة المرور على ضرورة استخدام حزام الأمان الموجود داخل السيّارة عند قيادة السيّارة أو الانتقال بها .

## أسئلة تحليلية

1. هل kg (2) من الحديد لهما ضعف مقدار القصور الذاتي ل kg (1) من الحديد؟ اشرح .
2. هل kg (2) من الموز لهما ضعف مقدار القصور الذاتي ل kg (1) من البرتقال؟

ويعتمد طول هذه المسافة أو قصرها على عدّة عوامل ، منها:

1. القصور الذاتي لكلّ من راكب الدراجة والدراجة
2. قوى الاحتكاك بين إطارات الدراجة والطريق
3. مقاومة الهواء
4. استخدام راكب الدراجة لدوّاسة الفرامل

استكشف بنفسك

حاول أن تتركب دراجة ، ثمّ بيّن العلاقة بين العوامل السابقة وطول المسافة التي تقطعها الدراجة عند توقّفك عن تحريك الدوّاسة .

سؤال

ماذا يحدث لو أنّ قوّة التجاذب بين الشمس ومجموعة الكواكب المرتبطة بها قد اختفت؟ وما هو شكل المسار الذي سوف تتحرّك فيه تلك الكواكب؟

الإجابة:


سوف تتحرّك الكواكب بسرعة ثابتة المقدار والاتّجاه وفي خطّ مستقيم وليس في مسارات شبه دائرية كما هي الآن .

## الكتلة مقياس القصور الذاتي

حاول أن تقذف بإحدى قدميك علبة فارغة من الصفيح (الشكل 46) . كرّر المحاولة ثانية بالعلبة نفسها بعد ملئها بالرمل ، ثمّ كررها مرّة ثالثة بالعلبة نفسها ولكن بعد ملئها بمسامير من الحديد . بالطبع هناك اختلاف في التأثير الواقع على قدمك في الحالات الثلاث . ففي حالة العلبة المملوءة بالمسامير ، نجد أن كتلتها كبيرة ، أي أنّ القصور الذاتي لها كبير أيضاً . لذلك ، هي تحتاج إلى قوّة قذف أكبر لتغيير حالتها الحركية . أمّا في حالة العلبة المملوءة بالرمل فنجد أنّ تأثير (الكتلة - القصور الذاتي) أقلّ ، وأنّ تأثيرها على القدم يكون قليلاً . وفي حالة العلبة الفارغة فإنّ تأثير (الكتلة - القصور الذاتي) يكون قليلاً جدّاً ، فهي ليست بحاجة إلى قوّة كبيرة لتغيير حالتها الحركية .

فالقصور الذاتي Inertia هو الخاصية التي تصف ميل الجسم إلى أن يبقى على حاله ويقاوم التغيّر في حالته الحركية . وهناك علاقة بين القصور الذاتي وكتلة الجسم ، فالقصور الذاتي للسيّارة أكبر من القصور الذاتي للدراجة ، حيث إنّ كتلة السيّارة أكبر من كتلة الدراجة .





(شكل 47)

يُفسّر القصور الذاتي على ضوء القانون الأوّل لنيوتن حيث يظلّ الجسم ساكنًا أو متحرّكًا بسرعة ثابتة وفي خطّ مستقيم ما لم تُؤثّر عليه قوّة خارجية تُغيّر في سرعته المتّجهة .

## مراجعة الدرس 1-2

- أولاً** – ما هو الشرط اللازم لاتزان عدّة قوى متلاقية في نقطة؟
- ثانيًا** – عرّف القوة المتّجهة، وما هي الوحدة التي تُقاس بها؟
- ثالثًا** – اكتب نصّ القانون الأوّل لنيوتن .
- رابعًا** – وضح كيف استفاد نيوتن من تجارب جاليليو للحركة .
- خامسًا** – ما معنى القصور الذاتي، كيف يُمكن الاستدلال عليه عمليًا؟
- سادسًا** – وضح كيف يُمكن التغلب على قوى الاحتكاك في الآلات الميكانيكية؟

## الأهداف العامة

- ✎ يستنتج العلاقة بين العجلة وكلّ من القوّة والكتلة .
- ✎ يذكر الصيغ اللفظية والرمزية للقانون الثاني لنيوتن .
- ✎ يذكر أنّ القانون الأوّل لنيوتن حالة خاصّة من القانون الثاني ويُفسّره .
- ✎ يفسّر العلاقة بين السقوط ومقاومة الهواء .



(شكل 48)

القطار الدوار هو أحد ألعاب المدينة الترفيهية الذي يعتمد على الحركة المعجلة

معظم الأشياء التي تتحرّك من حولنا تبدأ حركتها من سكون، ثمّ تزداد سرعتها مع مرور الوقت، وأحياناً يحدث تباطؤ للحركة، وأحياناً أخرى يتغيّر مسار الحركة. ليس هناك قوّة محدّدة تُؤثّر في حركة مثل هذه

الأشياء، وحركة هذه الأشياء تُسمّى الحركة المعجلة Accelerated motion (الشكل 48). من هنا نجد أنّ للعجلة دوراً في معرفة إلى أيّ مدى تستطيع هذه الأشياء تغيير حركتها. عرفنا في ما سبق أنّ العجلة تعني معدّل التغيّر في متّجه السرعة خلال وحدة الزمن:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t}$$

$$\text{العجلة} = \frac{\text{التغيّر في متجه السرعة}}{\text{الزمن المستغرق}}$$




(شكل 49)

تتغيّر حالة كرة الهوكي عندما تضرب بالمضرب الخاصّ بها .

### 1. القوّة المسببة للحركة المعجلة بانتظام في خط مستقيم

نفترض أنّ هناك جسمًا في حالة سكون، مثل كرة الهوكي (الشكل 49)، وأنّ لاعب الهوكي قام بقذف الكرة بالمضرب الخاصّ بها. عندئذ، سنجد أنّ الكرة تتحرّك بسرعة معيّنة لمسافة ما.



(شكل 51)

علاقة بيانية بين القوّة والعجلة مع اختلاف الكتل

كيف انتقلت الكرة من السكون إلى الحركة؟ عند قذف الكرة بالمضرب، نجد أنّ قوّة المضرب أكسبت الكرة عجلة جعلتها تُغيّر من حالتها الساكنة إلى حالتها الحركية. إذا كانت القوّة تُسبّب عجلة. فقد تؤثر مجموعة من القوى على الجسم. فكيف ستكون العجلة الناتجة؟ العجلة التي يكتسبها الجسم تتوقف على محصلة القوى الخارجية المؤثرة عليه ولا تتغيّر الحالة الحركية للجسم عندما تكون محصلة هذه القوى الخارجية معدومة. وعليه، فإنّ العجلة تناسب طردياً مع القوة المحصلة.

## العلاقة بين القوّة والكتلة والعجلة



(شكل 50)

ماذا يجب أن يحدث لكي تتحرك العربتان بالعجلة نفسها؟

في (الشكل 50)، نجد أنّ هناك شخصاً يؤثر بمقدار ثابت من القوّة Force على عربة تحتوي على أشياء معيّنة. ويلاحظ عندما اختلفت كتلة الأشياء الموجودة في العربة، مع استمرار التأثير بمقدار القوة السابقة نفسها، أنّ مقدار العجلة قد قلّ. ويلاحظ أيضاً أنّ العربة التي تحتوي على كميات أكثر، تتحرك بعجلة أقل، أي أنّ العلاقة هي علاقة تناسب عكسي بين الكتلة (m) والعجلة (a).

### سؤال:

لكي تتحرّك كلّ من العربتين بالعجلة نفسها، ما هو مقدار الكتلة الذي يجب إضافته إلى العربة الأخرى؟

### الإجابة:

إنّ التغيّر في مقدار القوة المحصلة يُؤدّي إلى التغيّر في العجلة. فعندما تُبدل قوّة أكبر على إحدى العربات، مع ثبات مقدار كتلة كلّ من العربتين، نجد أنّ العربة التي أثرت عليها قوّة أكبر تتحرّك بعجلة أكبر. ومن خلال العلاقة البيانية الموضحة في (الشكل 51) يُمكن الاستدلال على العلاقة بين القوّة والعجلة والكتلة.

ونجد أن الجسم الذي كتلته (100)kg يتحرك بعجلة أكبر من الجسم الذي كتلته (200)kg تحت تأثير القوة المحصلة نفسها، أي أن العلاقة بين الكتلة والعجلة هي علاقة تناسب عكسي .  
توضح العلاقة البيانية أيضاً تأثير القوة والكتلة على العجلة التي يتحرك بها الجسم . فعند مقارنة ميل الخطّ المستقيم (فرق الصادات/فرق السينات) لكلّ جسم على حدة، نجد أن الجسم الذي كتلته (100)kg يتحرك تحت تأثير القوة المحصلة نفسها بعجلة تُساوي ضعف العجلة التي يتحرك بها الجسم الذي كتلته (200)kg .

### 3. القانون الثاني لنيوتن

بعد أن وصف القانون الأوّل لنيوتن ما يحدث عندما لا تُؤثر قوّة خارجية على جسم مادّي، جاء القانون الثاني لنيوتن ليستكمل العلاقة بين القوّة والحركة، ويصف ما يحدث عندما تُؤثر القوّة المحصلة على جسم ما . وينصّ القانون الثاني لنيوتن على أن «العجلة التي يتحرك بها جسم ما تتناسب طردياً مع القوّة المحصلة المؤثرة على الجسم، وعكسياً مع كتلته» .  
والمعادلة الرياضية للقانون هي:

$$\text{العجلة } \alpha \propto \frac{\text{القوى المحصلة}}{\text{الكتلة}}$$

$$a \propto \frac{F}{m} \longrightarrow (2.1)$$

حيث ( $\alpha$ ) تعني تناسب طردياً . ومن علاقة التناسب هذه، يمكننا أن نستنتج أن مقدار العجلة يكون كبيراً إذا كانت محصلة القوى المؤثرة على الجسم كبيرة (الشكل 52) .

في حال استخدام وحدات ثابتة لكلّ من العجلة والكتلة، على سبيل المثال، الكتلة (kg) والعجلة ( $m/s^2$ )، تُصبح وحدة القوة (N)، وبذلك تتخذ المعادلة رقم (2.1) المعادلة الرياضية التالية:

$$a(m/s^2) = \frac{F(N)}{m(kg)}$$

وهذا يعني أنه إذا كان هناك جسم كتلته (1)kg ويتحرك بعجلة مقدارها  $1m/s^2$ ، فإنّ القوّة المحصلة المؤثرة على الجسم تُساوي (1)N . وعليه

يُمكن تعريف النيوتن بأنّه القوّة اللازمة لجسم كتلته (1)kg لكي يتحرك بعجلة مقدارها  $1m/s^2$  .

وعليه، يتكوّن القانون الثاني لنيوتن في صورته الرياضية من ثلاث كمّيات فيزيائية هي: القوّة والعجلة والكتلة . وبالتالي، يُمكن حساب أيّ كمّية بينها بمجرد معرفة الكمّيتين الأخرين .



(شكل 52)

الحركة بعجلة كبيرة نتيجة محصلة قوّة هائلة

## مثال (1)

ما هي القوّة اللازمة لتحريك طائرة كتلتها  $(30\ 000)\text{kg}$  بعجلة مقدارها  $(1.5)\text{m/s}^2$ ؟

طريقة التفكير في الحلّ

1. حلّ: اذكر المعلوم وغير المعلوم:

المعلوم: الكتلة:  $m = (30\ 000)\text{kg}$

العجلة:  $a = (1.5)\text{m/s}^2$

غير المعلوم: القوّة:  $F = ?$

2. احسب غير المعلوم:

باستخدام القانون الرياضي:  $F = ma$ . بالتعويض عن المقادير المعلومّة في المعادلة نحصل على:

$$F = m a$$

$$= 30\ 000(\text{kg}) \times 1.5(\text{m/s}^2)$$

$$= (45\ 000)\text{kg} \cdot \text{m/s}^2$$

$$= (45 \times 10^3)\text{N}$$

3. قيم: هل النتيجة مقبولة؟

4. تحتاج الطائرات إلى قوّة كبيرة للتحركّ.

## مثال (2)

احسب العجلة التي تتحرّك بها سيّارة كتلتها  $(1000)\text{kg}$  عندما تؤثر عليها قوّة مقدارها  $(2000)\text{N}$ ؟ كم ستكون قيمة العجلة إذا ضاعفنا القوّة لمثلي ما كانت عليه؟

طريقة التفكير في الحلّ

1. حلّ:

اذكر المعلوم وغير المعلوم:

المعلوم: الكتلة:  $m = (1000)\text{kg}$

القوّة:  $F = (2000)\text{N}$

غير المعلوم: العجلة:  $a = ?$

2. احسب غير المعلوم:

باستخدام القانون الرياضي:  $a = \frac{F}{m}$ . بالتعويض عن المقادير المعلومّة في المعادلة نحصل على:

$$a = \frac{F}{m} = \frac{2000}{1000} = (2)\text{m/s}^2 \text{ (أ)}$$

(ب) إذا ضوعفت القوّة لتصبح  $F = (4000)\text{N}$ ، تُصبح العجلة:

$$a = \frac{F}{m} = \frac{4000}{1000} = (4)\text{m/s}^2$$

3. قيم: هل النتيجة مقبولة؟

عندما تتضاعف القوّة، لا بدّ أن تتضاعف العجلة نظرًا لعلاقة التناسب الطردي بين القوّة والعجلة.



## مراجعة الدرس 2-2

**أولاً** - ما هي العلاقة بين القوّة وكل من الكتلة والعجلة؟ وضّح إجابتك بواسطة التمثيل البياني .

**ثانياً** - اكتب نصّ القانون الثاني لنيوتن .

**ثالثاً** - احسب العجلة التي تتحرّك بها سيارة كتلتها  $500 \text{ kg}$  بتأثير محصّلة قوى مقدارها  $1200 \text{ N}$  .



## الأهداف العامة

- ✓ يذكر نص القانون الثالث لنيوتن ويُقدّم تفسيراً لبعض الظواهر والمشاهدات الحياتية.
- ✓ يدرك معنى الفعل وردّ الفعل في المواقف المختلفة.
- ✓ يذكر النص اللفظي والصيغة الرمزية للقانون العام للجاذبية، ويُطبّقه.
- ✓ يُقدّم تفسيراً علمياً لبعض المشاهدات الحياتية في ضوء القانون العام للجاذبية.



(شكل 62)


أثناء حركة القدمين ندفع الأرض إلى أسفل وفي الوقت نفسه تدفع الأرض القدم إلى أعلى، هذا هو مثال على الفعل وردّ الفعل.

إذا انحنيت بشدة فمن الممكن أن تسقط، أمّا إذا انحنيت ويداك ممدودتان لتلامس الحائط فإنك لن تسقط. فعندما تدفع بقوة باتجاه الحائط، فإنّ الحائط يدفعك بدوره وبالتالي لن تسقط. اسأل زملاءك عن سبب عدم سقوطك. كم منهم سيُجيب «لأنّ الحائط يدفعك ويجعلك ثابتاً في مكانك»؟ ربّما عدد قليل. وحده من يعلم بقوانين الفيزياء يُدرك أنّ الجدران يمكنها أن تدفعنا بالقوّة عينها التي ندفعها بها وباللحظة نفسها، وتماماً كما يحدث عندما نمشي على الأرض (الشكل 62).



(شكل 63)

أعضاء فريق التجديف يبذلون أقصى جهد يُعادل قوّة رد الفعل



(شكل 64)

إلى أي مدى تُؤثر قوّة فعل لوحة الغطس في أداء الغطّاس؟

## 1. التأثير المتبادل والقوّة

تناول نيوتن في قانونه الثالث طبيعة القوى المؤثّرة على الأجسام. فقد أوضح أنّ القوى تكون دائماً مزدوجة: إذا أثر جسم على آخر بقوة، فإنّ هذا الأخير يُؤثر بدوره على الأوّل، أي أنّ التأثير متبادل بين الجسمين. ففي رياضة التجديف، يقوم المجذاف بدفع الماء لكي يندفع القارب بعيداً عن الشاطئ (الشكل 63). وكذلك الحال بالنسبة إلى الذين يُمارسون


رياضة الغطس: فعندما يدفع الغطّاس لوحة الغطس نحو الأسفل، نجد أنّ لوحة الغطس ترتدّ عكسيّاً. وهي بذلك تُعطي الغطّاس قوّة تدفعه نحو الأعلى (الشكل 64). وعليه، فإنّ هناك ما يُسمّى بالفعل (قوّة تُبذل من جسم ما) وردّ الفعل (قوّة أخرى مساوية للقوّة الأولى في المقدار، ومضادّة لها في الاتجاه، وهي تُبذل من الجسم الآخر). ولقد صاغ نيوتن النتائج التي حصل عليها في ما يُسمّى بالقانون الثالث لنيوتن الذي ينصّ على أنّ: «لكلّ فعل ردّ فعل Action and Reaction مساوٍ له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه». يتزامن الفعل مع ردّ الفعل، وبالتالي لا يحصل الفعل قبل ردّ الفعل.

## 2. معنى الفعل وردّ الفعل Action and Reaction

في بعض الحالات، نجد صعوبة في التمييز بين قوى الفعل وردّ الفعل. فمثلاً، ما هو الفعل ورد الفعل في حال سقوط حجر؟ قد نقول إنّ قوّة جذب الأرض للحجر تُمثّل قوّة الفعل، ولكن هل يُمكننا تحديد قوّة ردّ الفعل؟ هل هي وزن الحجر؟ بالطبع لا، إذ يُعتبر الوزن صورة أخرى من قوّة الجذب للحجر. هل هي قوّة تنتج مع هبوط الحجر نحو سطح الأرض؟ أيضاً، الإجابة لا، لأنّ تأثير سطح الأرض لا يظهر على الحجر إلّا عند ارتطامه به. وعليه فإنّ هناك خطوات لكي تدرك معنى الفعل وردّ الفعل. في البداية لا بدّ من تعريف التفاعل: لنفترض أنّ هناك جسمًا (A) يتفاعل مع جسم آخر (B)، وعليه فإنّ قوّة الفعل وردّ الفعل يُمكن أن توصف على النحو التالي:

الفعل: الجسم (A) يبذل قوّة على الجسم (B).

ردّ الفعل: الجسم (B) يبذل قوّة على الجسم (A).



(شكل 65)


القوّة المزدوجة بين شيئين (A و B) عندما يبذل (A) فعلاً على (B)، فإنّ (B) يبذل ردّ فعل على (A) في الوقت نفسه.

وبذلك ، فإنّ تفاعل الجسمين (A) و (B) معًا يُنتج ما يُسمّى الفعل وردّ الفعل . إذا كان الفعل مبدولاً من الجسم (A) على الجسم (B) ، فإنّ ردّ الفعل يكون من الجسم (B) على الجسم (A) .



### 3. قانون الجذب العام لنيوتن

#### Newton's Law of Universal Gravitation



(شكل 69)

يتجاذب الجسمان بقوتين متساويتين في القيمة ومتعاكستين في الاتجاه. تعتمد قوة الجذب على البعد بين مركزي ثقلهما.

لم يكتشف نيوتن الجاذبية وإنما استطاع أن يُفسّر سقوط التفاحة ودوران القمر في قانون واحد سمّاه قانون التجاذب الكوني. أي أنّ ما اكتشفه نيوتن هو أنّ الجاذبية هي ظاهرة كونية تتحكّم في جميع الأجسام في الكون. فكلّ جسم يجذب إليه جميع الأجسام الأخرى بقوى مختلفة المقدار. فالأرض تجذبك وتجذب التفاحة والسيارة والقمر وأي شيء آخر، والتفاحة تجذبك وتجذب الأرض والنجوم وكلّ شيء آخر. باختصار، يتجاذب كلّ جسمين في الكون.

#### خصائص قوة التجاذب:

تعتمد قوة التجاذب بين جسمين على كتلتي الجسمين وعلى البعد بينهما. وينصّ قانون التجاذب العام لنيوتن (الشكل 69) على أنّ كلّ جسم يجذب الآخر بقوة يتناسب مقدارها طردياً مع حاصل ضرب كتلتيهما. وبالتالي تتناسب هذه القوة مع حاصل ضرب الكتلتين بحيث تزيد بزيادة أيّ من الكتلتين، كما يتناسب مقدارها عكسياً مع مربع البعد بين مركزي كتلتي الجسمين، أي أنّها تتناقص كلّما تباعد الجسمان أحدهما عن الآخر.

تتناسب قوة التجاذب بين جسمين طردياً مع حاصل ضرب الكتلتين، وعكسياً مع مربع البعد بين مركزي كتلتي الجسمين. يُمكن صياغة ما سبق كما يلي:

$$F \propto \frac{m_1 \times m_2}{d^2}$$

حيث: تُمثّل  $m_1$  كتلة أحد الجسمين، و  $m_2$  كتلة الجسم الثاني، أما (d) فترمز إلى البعد بين مركزي كتلتي الجسمين.

يُمكن تحويل علاقة التناسب السابقة إلى معادلة باستخدام ثابت الجذب

$$F = G \cdot \frac{m_1 \times m_2}{d^2}$$

العام G لنحصل على:

علماً أنّ قيمة هذا الثابت تُساوي قوة التجاذب بين جسمين كتلة كلّ منهما 1kg، والبعد بين مركزي كتلتيهما 1m، وهي قوة ضئيلة جداً بحيث لا نشعر بها.

وقد أظهرت التجارب أنّ القيمة التقريبية لهذا الثابت هي:

$$G = (6.67 \times 10^{-11}) \text{ N.m}^2/\text{kg}^2$$

#### هل تعلم؟

أجرى العالم الإنكليزي «هنري كافنديش» لأول مرة بعد 150 عاماً من وضع نيوتن لقانون التجاذب العام تجربة لقياس القوة الضئيلة التي تتبادلها كرتان من الرصاص بواسطة ميزان الفتل شديد الحساسية بواسطة torsion balance لتحديد قيمة ثابت الجذب العام (G). وقد استُخدمت هذه التجربة في حساب كتلة الكرة الأرضية، ولذلك سُمّيت «تجربة تعيين كتلة الأرض».



## سؤال للتحميل؟

لماذا أصبحت الأرض كروية الشكل؟

### أسئلة تطبيقية مع إجابات

1. احسب قوة الجذب بين الشمس

والأرض علمًا أن الأرض تدور

في مدار دائري حول الشمس،

وأن كتلة الأرض تُوازي

$$(6 \times 10^{24}) \text{ kg}$$

مقابل كتلة الشمس وهي

$$(19.8 \times 10^{29}) \text{ kg}$$

المسافة بين الشمس والأرض

$$(1.5 \times 10^{11}) \text{ m}$$

الجذب العام:

$$G = (6.67 \times 10^{-11}) \text{ N.m}^2/\text{kg}^2$$

$$F = (3.5 \times 10^{22}) \text{ N}$$

2. ماذا يحدث لقوة التجاذب بين

كتلتين عندما تزداد المسافة

بينهما إلى أربعة أضعاف.

$$F' = F/16$$

3. ماذا يحدث لقوة التجاذب بين

كتلتين عندما تقل المسافة بينهما

إلى الثلث.

$$F' = 9F$$

## مثال (1)

وُضعت كرة من الرصاص مجهولة الكتلة على بعد  $(0.4)\text{m}$  من كرة أخرى من النوع نفسه كتلتها  $(10)\text{kg}$ ، فكانت قوة التجاذب بينهما تُساوي  $(8 \times 10^{-8}) \text{ N}$ .

احسب الكتلة المجهولة علمًا أن ثابت الجذب العام يساوي:

$$G = (6.67 \times 10^{-11}) \text{ N.m}^2/\text{kg}^2$$

### طريقة التفكير في الحلّ

1. حلّل: اذكر المعلوم وغير المعلوم:

$$m_1 = 10 \text{ kg}$$

$$d = 0.4\text{m}$$

$$m_2 = ?$$

2. احسب غير المعلوم:

$$F = G \cdot \frac{m_1 m_2}{d^2}$$

بالتعويض عن المقادير المعلوم في المعادلة نحصل على:

$$8 \times 10^{-8} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 10 \times m_2}{(0.4)^2}$$

$$(0.4)^2 \times 8 \times 10^{-8} = 6.67 \times 10^{-11} \times 10 \times m_2$$

$$m_2 = \frac{(0.4)^2 \times 8 \times 10^{-8}}{6.67 \times 10^{-11} \times 10}$$

$$= (19.2) \text{ kg}$$

3. قيم: هل النتيجة مقبولة؟

بما أن قوة التجاذب صغيرة، فهذا يعني أن كتلة كل من الجسمين صغيرة.

## مثال (2)

احسب قوة الجذب بين كرتين كتلتاهما  $(10)\text{kg}$  و  $(5)\text{kg}$ ، وتساوي

المسافة التي تفصل بين مركزي كتلتيهما  $(0.5)\text{m}$ ، علمًا أن ثابت

$$G = (6.67 \times 10^{-11}) \text{ N.m}^2/\text{kg}^2$$

### طريقة التفكير في الحلّ

1. حلّل: اذكر المعلوم وغير المعلوم:

$$m_1 = (10)\text{kg}$$

$$m_2 = (5)\text{kg}$$

$$d = (0.5)\text{m}$$

$$F = ?$$

2. احسب غير المعلوم:

$$F = G \cdot \frac{m_1 m_2}{d^2}$$



(شكل 70)  
رجل يدفع الحائط بقوة

## مثال (2) تابع

بالتعويض عن المقادير المعروفة في المعادلة نحصل على:

$$F = G \cdot \frac{m_1 m_2}{d^2}$$

$$= \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 10 \times 5}{(0.5)^2}$$

$$= (1.33 \times 10^{-8})N$$

3. قيم: هل النتيجة مقبولة؟

بما أن كتلة كل من الجسمين صغيرة ، فهذا يعني أن قوة التجاذب صغيرة .

## مراجعة الدرس 2-3

أولاً - ضع علامة (✓) في المربع الواقع أمام الإجابة الأنسب لكل مما يلي:

1. □ تسقط الأجسام نحو الأرض نتيجة قوة جذب الأرض .
2. □ أي جسمين ماديين يجذب كل منهما الآخر بقوة تتناسب طردياً مع مربع المسافة بينهما .
3. □ تجذب الأجسام الصغيرة الأرض إليها .
4. □ يُساوي ثابت الجذب العام قوة الجذب بين كتلتين مقدار كل منهما 1kg والمسافة بينهما كبيرة جداً .

ثانياً - إذا دفعت الحائط بقوة 200N، كما في (الشكل 70)، فما مقدار القوة التي قد يبذلها الحائط عليك؟

ثالثاً - لماذا لا تستطيع أن تضرب ورقة في الجو بقوة 2000N؟

رابعاً - اذكر نص القانون الثالث لنيوتن مع ذكر بعض تطبيقاته .

خامساً - وضح فكرة عمل الصاروخ (الشكل 71) في ضوء القانون الثالث لنيوتن .

سادساً - (أ) احسب قوة الجذب بين سيارة كتلتها 1500kg

وشاحنة كتلتها 5000kg، إذا كانت المسافة الفاصلة بين مركز كتلتيهما تُساوي 5m .

(ب) ما مقدار القوة بينهما إذا بلغت المسافة بين السيارة والشاحنة عشرة أمتار؟ اشرح النتيجة انطلاقاً من قانون الجذب العام لنيوتن .



(شكل 71)  
إطلاق الصاروخ

## مراجعة الوحدة الأولى

Friction	الاحتكاك
Displacement	الإزاحة
Universal gravitation	الجذب العام
Translational motion	حركة انتقالية
Rectilinear motion	الحركة الخطية
Periodic motion	حركة دورية
Uniformly accelerated motion	الحركة المعجلة بانتظام
Initial speed	السرعة الابتدائية
Speed	السرعة العددية
Instantaneous speed	السرعة اللحظية
Velocity	السرعة المتجهة
Average speed	السرعة المتوسطة
Free fall	السقوط الحر
Acceleration	العجلة
Uniformly decelerated motion	عجلة تباطؤ منتظمة
Action and Reaction	الفعل وردّ الفعل
Inertia	القصور الذاتي
Force	القوة
Mass	الكتلة
Fundamental and derived quantities	كميات أساسية ومشتقة
Weight	الوزن
Air resistance	مقاومة الهواء

✎ الوحدات الدولية International System للقياس هي المتر للطول ، والكيلوجرام للكتلة ، والثانية للزمن . وهناك وحدات أخرى لا تُستعمل في فيزياء الميكانيك ، مثل الكلفن لدرجة الحرارة المطلقة والأمبير لشدة التيار .

✎ هناك علاقة بين الكميات الفيزيائية الأساسية والكميات الفيزيائية المشتقة ، وهذه العلاقة تُسمى معادلة الأبعاد .

✎ الحركة: هي أن يُغيّر الجسم موضعه مع الزمن بالنسبة إلى موضع جسم آخر ساكن .

✎ الإزاحة: هي كمية فيزيائية تُعبّر عن المسافة في خط مستقيم بين نقطتين من حيث المقدار والاتجاه .

✎ مقدار السرعة: هو معدّل تغيّر المسافة بالنسبة إلى الزمن ، ووحدته (m/s) .

✎ السرعة المتوسطة ( $\bar{v}$ ): هي المسافة الكلية المقطوعة أثناء الحركة مقسومة على الزمن الكلي .

✎ العجلة: هو معدّل تغيّر متجه السرعة خلال وحدة الزمن ، ووحدته ( $m/s^2$ ) .

- ✖ الكمية المتجهة: هي الكمية التي يلزم لتعريفها معرفة كل من مقدارها واتجاهها .
- ✖ الكمية العددية: هي الكمية التي يلزم لتعريفها معرفة مقدارها فقط .
- ✖ السقوط الحر: يعني سقوط الأجسام تحت تأثير جاذبية الأرض فقط مع عدم تأثير قوة مقاومة الهواء في حركتها . العجلة التي تسقط بها الأجسام سقوطاً حرّاً هي عجلة الجاذبية الأرضية ، وهي ذات مقدار ثابت يساوي تقريباً  $g = (10) \text{ m/s}^2$  .
- ✖ وفقاً لقانون الجذب العام لنيوتن ، يجذب كل جسم جميع الأجسام الموجودة في الكون بقوة تعتمد على كتلته وكتلة كل من هذه الأجسام ، وعلى البعد بين مراكز كتلة الأجسام المتجاذبة .
- ✖ تزيد قوة الجذب بزيادة الكتلة ، وتقل بزيادة البعد .
- ✖ القوة: هي كمية متجهة تحدث تغييراً في حالة الجسم عندما تؤثر عليه (سواء أكان من حالة سكون إلى حركة أم من حركة إلى سكون) .

✖ خاصية القصور الذاتي: هي خاصية للأجسام المادية ، تصف ميل الأجسام إلى أن تبقى على حالتها الحركية ، وتقاوم التغيير في سرعتها المتجهة .

#### القوانين

##### قوانين نيوتن للحركة

القانون الأول: «يبقى الجسم ساكناً أو متحرّكاً بسرعة منتظمة وفي خطّ مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة تُغيّر من حالته سكونه أو حالة حركته» .

القانون الثاني: «العجلة التي يتحرّك بها جسم ما تتناسب طردياً مع القوة المحصلة المؤثرة على الجسم ، وعكسياً مع كتلته» .

القانون الثالث: «لكلّ فعل ردّ فعل مساوٍ له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه» .

##### قانون الجذب العام

تتناسب قوة التجاذب بين جسمين طردياً مع حاصل ضرب الكتلتين ، وعكسياً مع مربع البعد بين مركزي كتلتي الجسمين .

#### معادلات

✖ معادلات الحركة المعجلة بانتظام في خطّ مستقيم:

$$1. v = v_0 + at$$

$$2. d = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$3. v^2 = v_0^2 + 2ad$$

معلمة  
قوة الكون  
KuwaitTeacher.Com

معادلات السقوط الحر:

– من السكون:

$$v = gt \quad 1.$$

$$d = \frac{1}{2} gt^2 \quad 2.$$

$$v^2 = 2gd \quad 3.$$

أما إذا سقط الجسم بسرعة ابتدائية، تُكتب المعادلات على الشكل التالي:

– بسرعة ابتدائية  $v_0$ :

$$v = v_0 + gt \quad 1.$$

$$d = v_0 t + \frac{1}{2} gt^2 \quad 2.$$

$$v^2 = v_0^2 + 2gd \quad 3.$$

$$g \approx 10 \text{m/s}^2 \quad 4.$$

يتمثل قانون نيوتن للجذب العام بالمعادلة التالية:


$$F = G \frac{m_1 m_2}{d^2}$$

ثابت الجذب العام «G» يساوي:

$$G = (6.67 \times 10^{-11}) \text{N.m}^2/\text{kg}^2$$

### خريطة مفاهيم الوحدة

استخدم المصطلحات الموضحة في الشكل التالي لرسم خريطة مفاهيم تهدف إلى تنظيم بعض الأفكار التي احتوتها الوحدة.





تحقق من فهمك

ضع علامة (✓) في المربع الواقع أمام الإجابة الأنسب في كل مما يلي:

1. الميليمتر هو وحدة قياس للطول تساوي:

$\frac{1}{100}$  cm

$\frac{1}{100}$  m

$\frac{1}{1000}$  m<sup>3</sup>

$\frac{1}{1000}$  m

2. من الكميات الفيزيائية الأساسية:

القوة

العجلة

السرعة

الزمن

3. معادلة أبعاد القوة هي:

mLt<sup>-2</sup>

mL<sup>-2</sup>t

Lt<sup>-2</sup>

mLt<sup>-1</sup>

4. العجلة هي معدّل تغير:


متّجه السرعة خلال وحدة الزمن

المسافة خلال وحدة الزمن

الإزاحة خلال وحدة الزمن

المسافة خلال وحدة السرعة

5. يُمثّل الشكل المقابل منحنى (المسافة، الزمن) لجسم ما. نستنتج من هذا المنحنى أنّ الجسم:




يتحرّك بسرعة متزايدة.

يتحرّك بسرعة ثابتة.

يتحرّك على خطّ مستقيم.

يظلّ ساكناً.

6. يُمثّل الشكل المقابل منحنى (السرعة، الزمن) لجسم متحرّك.



نستنتج من هذا المنحنى أنّ:

السرعة ثابتة.

العجلة متغيّرة.

العجلة منتظمة.

كلّ ما سبق.

7. من نتائج الحركة بعجلة موجبة:

- زيادة السرعة الابتدائية عن السرعة النهائية
- زيادة السرعة النهائية عن السرعة الابتدائية
- لا تتغير سرعة الجسم مع الزمن .
- زيادة المسافات التي يقطعها الجسم بنسبة زيادة الزمن .

8. كتاب الفيزياء موجود على طاولة أفقية:

- لا يوجد أيّ قوّة تؤثر عليه .
- لا يؤثر الكتاب بأيّ قوّة على الطاولة .
- محصلة القوى التي تُؤثر عليه تساوي صفراً .
- لا تؤثر الطاولة بأيّ قوّة على الكتاب .

9. جسمان يسقطان نحو الأرض سقوطاً حرّاً، كتلة الجسم الأول تُساوي مثلي كتلة الجسم الثاني، فإنّ نسبة العجلة التي يتحرّك بها الجسم الأول إلى العجلة التي يتحرّك بها الجسم الثاني  $\left(\frac{a_1}{a_2}\right)$  تُساوي:

- $\frac{1}{4}$         $\frac{1}{1}$         $\frac{2}{1}$         $\frac{1}{2}$

### تحقق من معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية:

1. ما الفرق بين السرعة اللحظية والسرعة المتوسطة؟
2. ماذا تُمثّل قراءة عدّاد السرعة الموجود في السيارة؟
3. ما هي الأدوات الموجودة في السيارة والتي يُمكن بواسطتها التحكم في مقدار السرعة وبتّجاهها؟
4. ماذا يمثّل ميل منحنى (السرعة - الزمن)؟
5. ماذا يعني السقوط الحرّ؟
6. حدّد العلاقات التالية مفترضاً أنّ حركة الجسم تبدأ من السكون:
  - (أ) العلاقة بين (السرعة والزمن) لجسم يتحرّك بعجلة منتظمة وفي خطّ مستقيم .
  - (ب) العلاقة بين (الإزاحة والزمن) لجسم يتحرّك بعجلة منتظمة وفي خطّ مستقيم .
  - (ج) العلاقة بين (الإزاحة والسرعة) لجسم يتحرّك بعجلة منتظمة وفي خطّ مستقيم .
7. وضح كيف تتغير قوّة الجاذبية مع الابتعاد عن مركز الأرض .
8. اشرح لماذا تقلّ قوّة الجذب بين الأرض والتّفاحة إلى الربع إذا ما أصبحت التّفاحة على ارتفاع يُساوي ضعف ارتفاعها الأول .
9. عرّف القوّة، وما هي الوحدة التي تُقاس بها؟
10. ما الفرق بين الثقل والكتلة؟ وضح إجابتك ببعض الأمثلة .

12. لماذا يسقط كل من العملة المعدنية وريشة الطائر بالعجلة نفسها داخل الأنبوب المفرغ من الهواء؟  
 13. عندما تسبح في الماء، فإنك تدفع الماء إلى الخلف (افتراض أن هذا هو الفعل)، فما هو رد الفعل؟  
 14. عندما تقفز إلى أعلى، فإن الكرة الأرضية ستدفع إلى أسفل. لماذا لا يستطيع أحد أن يلاحظ حركة الكرة الأرضية هذه؟

### تحقق من مهارتك

#### حل المسائل التالية:

(حيثما يلزم اعتبر عجلة الجاذبية الأرضية هي:  $g = (10)m/s^2$ )


1. أثناء سقوط جسم سقوطاً حرّاً من السكون، احسب السرعة التي يكتسبها هذا الجسم بعد  $s(5)$  من السقوط، وبعد  $s(7)$  من السقوط.
2. احسب العجلة التي تتحرّك بها سيارة من السكون وفي خطّ مستقيم إلى أن تبلغ سرعتها  $(100)km/h$  في  $s(10)$ .
3. سيارة متحرّكة في خطّ مستقيم بسرعة ثابتة تُساوي  $(60)km/h$ ، قطعت مسافة  $m(200)$ . احسب الزمن الذي استغرقته السيارة في قطع تلك المسافة.
4. تغيّرت سرعة قطار من  $(70)km/h$  إلى  $(50)km/h$  بانتظام خلال  $s(4)$ . احسب العجلة في تلك الفترة.
5. قذِف جسم رأسياً إلى أعلى بسرعة ابتدائية  $(80)m/s$ . ما مقدار أقصى ارتفاع يصل إليه هذا الجسم؟
6. احسب السرعة النهائية التي يسقط بها جسم ساكن من ارتفاع  $m(321)$ .
7. سقط عصفور صغير من فوق شجرة فوصل سطح الأرض خلال  $s(1.5)$ . احسب ارتفاع العش الذي سقط منه العصفور.
8. تقطع زرافة طولها  $m(6)$  أغصان شجرة وتسقطها على الأرض. احسب الفترة الزمنية التي يستغرقها غصن لكي يصل إلى سطح الأرض.
9. ما مقدار التغيّر في قوّة الجذب بين كوكبين إذا قلّ البعد بينهما إلى  $(0.1)$  من البعد الأصلي الفاصل بينهما؟
10. احسب التغيّر في قوّة الجذب بين جسمين ماديين عندما تزداد كتلتاهما لمثلي قيمتهما ويزداد البعد بين مركزيهما لمثلي قيمته.

### مهارة التواصل

اكتب تقريراً تبين فيه تأثير قوى التجاذب في جعل الأرض كروية الشكل. اذكر في تقريرك القوانين التي تُؤكّد وتدعم ما كتبت.

### نشاط بحثي

توجد دلائل على أنّ تمدد الكون مستمرّ. قم ببحث لدراسة هذه الظاهرة، وشرح إذا كانت هذه الدلائل تتفق أو تتعارض مع قانون نيوتن للجذب العامّ.



فصول الوحدة

الفصل الأول


خواص المادة

أهداف الوحدة

- يذكر حالات المادة الثلاث (صلبة، سائلة، غازية).
- يفسّر وجود حالة رابعة، هي البلازما (أو الحالة المتأينة)، ومتى تتكوّن.
- يشرح إمكانية تحوّل المادة من حالة إلى أخرى بتغيّر درجة حرارتها.
- يعرّف خاصية المرونة وقانون هوك وحدّ المرونة.
- يكتسب مهارة الرسوم البيانية.
- يُقارن بين مرونة المواد المختلفة وأهميتها في صنع النوابض القياسية.
- يُقدّر دور العلماء في تفسير الظواهر مثل مرونة الأجسام.
- يعرّف الضغط ويستنتج وحدات قياسه والعوامل التي يتوقّف عليها.
- يذكر نص قاعدة باسكال واستخداماتها في الحياة اليومية.
- يذكر قانون أرشميدس ويطبّقه عملياً.
- يعرّف ظاهرة التوتر السطحي وتواجدها في الحياة اليومية.
- يفسّر قوى التماسك والتلاصق.

معالم الوحدة

- اكتشف بنفسك: حالات المادة الفيزياء والمهن: المهندس المدني الفيزياء والجيولوجيا: الجبال الجليدية



اكتشف بنفسك

حالات المادة

نحن نعيش على الكوكب الوحيد بين كواكب المجموعة الشمسية المغطّي في غالبيته بالمياه. تتكوّن المحيطات والبحار والأنهار من  $H_2O$  في حالته السائلة. لو كانت الأرض أقرب بقليل إلى الشمس لتحوّلت مياه المحيطات إلى بخار. ولو كانت الأرض أبعد بقليل عن الشمس لكان الجليد يغطّي القسم الأكبر من سطحها، وليس فقط القطبان. لذا، فإنّ وضعية الأرض بالنسبة إلى الشمس داخل المجموعة الشمسية هي الأمثل. وكما تعلم، وكما تظهر في الصورة، ففي الحالة الصلبة للمادة، تكون الجزيئات متقاربة ومتماسكة، بينما في حالة السوائل، تستطيع الجزيئات أن تتحرّك بسهولة أكبر من مكان إلى آخر، وأن تأخذ شكل الوعاء الموضوعه فيه. أمّا في الحالة الغازية، تكون الجزيئات متباعدة.

اعتماداً على النص، أجب عن الأسئلة التالية:

- (أ) ممّ تتألّف المادة بشكل عام؟ ما هي الصيغة الكيميائية للماء؟
- (ب) ما هي حالات الماء الثلاث؟
- (ج) كيف يُمكن أن تتحوّل المادة من حالة إلى أخرى؟
- (د) ما الفرق بين الحالة الصلبة والحالة السائلة؟ وبين الحالة السائلة والغازية؟

دروس الفصل

الدرس الأوّل

الدرس الثاني

الدرس الثالث



الماء في صورته الثلاث (صلب - سائل - غاز)

تتواجد المادّة من حولنا في ثلاث حالات هي: الصلبة، السائلة والغازية. ويمكن للمادّة أن تُغيّر شكلها من حالة إلى أخرى. فالتلج، وهو الحالة الصلبة للماء، عند إمداده بالطاقة، يتفكك تركيبه البلوري ويتحوّل إلى الحالة السائلة. وعند إمداد الماء السائل بطاقة مناسبة، يتحوّل إلى الحالة الغازية (بخار الماء) كما يحدث عند غلي الماء. وتعتمد حالة المادّة على كلّ من درجة الحرارة والضغط، ودائمًا ما يُرافق تحوّل المادة من حالة إلى أخرى تبادل للطاقة.

في هذه الوحدة، سنهتمّ بدراسة حالات المادّة الثلاث فضلًا عن الحالة الرابعة: البلازما. كما سوف نتعرّف بعض الخواصّ الفيزيائية للمادّة مثل المرونة، وكيف عالجه العالم هوك. بالإضافة إلى ذلك، سنطلّع على قاعدتي باسكال وأرشميدس، وعلى خاصيّة التوتر السطحي للسوائل، وقوى التماسك وقوى التلاصق.



الأهداف العامة

- ✓ يعرّف خاصيّة المرونة وقانون هوك وحدّ المرونة.
- ✓ يكتسب مهارة تناول الأدوات المعملية ويستخدمها في تحقيق قانون هوك عملياً.
- ✓ يكتسب مهارة الرسوم البيانية.
- ✓ يقارن بين مرونة المواد المختلفة وأهمّيتها في صنع النوابض القياسية.
- ✓ يقدر دور العلماء في تفسير الظواهر مثل مرونة الأجسام.

1. المرونة (قانون هوك) Elasticity (Hooke's Law)

عند تعليق ثقل في نابض مثبت من الأعلى، يستطيل النابض، وتزداد استطالته بإضافة أثقال أخرى. وعند إبعاد الأثقال، يعود النابض إلى طوله الأصلي، وهنا نقول إنّه «مرن».

وعندما يضرب لاعب البيسبول الكرة، فهو يُغيّر لحظياً شكل الكرة، وعندما يقذف رامي السهام بسهمه، ينثني القوس أولاً ثمّ يرتدّ إلى شكله الأصلي عند ترك السهم لينطلق، كما في (الشكل 81).

ويُعتبر النابض وكرة البيسبول والقوس أمثلة عن أجسام مرنة، وعليه فإنّ المرونة Elasticity هي خاصيّة للأجسام تتغيّر بها أشكالها عندما تؤثر عليها قوّة ما، وبها أيضاً تعود الأجسام إلى أشكالها الأصلية عندما تزول القوّة المؤثّرة عليها.

لكن لا تعود كلّ الأجسام إلى أشكالها الأصلية بعد زوال تأثير القوى الموضوعّة عليها. فتلك الأجسام التي لا تستعيد أشكالها الأصلية بعد تشوهها بتأثير القوى تُسمّى أجساماً «غير مرنة»، كالصلصال والعجين والرصاص. فمن السهل أن تُشوّه قطعة من الرصاص، ولا تعود إلى شكلها الأصلي بعد زوال القوّة التي شوّهتها.

وباستخدام خاصيّة المرونة، تبيّن أنّ استطالة (التمدّد أو الانكماش)

الزنبرك تتناسب طردياً مع القوّة المؤثّرة عليه (الشكل 82).

وكان الفيزيائي الإنجليزي "روبرت هوك"، الذي عاصر العالم إسحق نيوتن، أوّل من توصّل إلى هذه العلاقة في منتصف القرن السابع عشر، ولذا سُمّيت قانون هوك


Hooke's Law الذي ينصّ على التالي: يتناسب مقدار الاستطالة أو الانضغاط ( $\Delta x$ ) الحادث لنابض تناسباً طردياً مع قيمة القوّة المؤثّرة (F)، أي أن  $F \propto \Delta x$ .

$$F = k\Delta x$$



(شكل 81)

القوس مرن بحيث يعود إلى شكله الأصلي بعد زوال القوّة المؤثّرة عليه.



(شكل 82)

تتناسب استطالة النابض طردياً مع قيمة القوّة المؤثّرة عليه.

## 2. الشدّة والاستطالة Intensity and Extension

عند استطالة أو انضغاط مادة مرنة بدرجة أكبر من حدّ معين، فإنّها لن تعود إلى شكلها أو حجمها الأصلي بعد زوال القوّة المؤثرة عليها، ويحدث لها ما يعرف بتشوّه مستديم. وهذا الحدّ المعيّن يُسمّى «حدّ أو نقطة المرونة»، ويتعامل قانون هوك مع الموادّ المختلفة تحت حدّ أو نقطة المرونة.

ولمعرفة مرونة الأجسام أهميّة كبيرة في الصناعة، لذلك تخضع هذه الموادّ لاختبارات خاصّة بهدف تعرّف صفات عديدة لها، ومن بينها المرونة.

### الإجهاد والانفعال

يُعرّف الإجهاد Stress بأنه «القوّة التي تؤثر على جسم ما وتعمل على تغيير شكله»، والتغير في شكل الجسم الناتج عن هذه القوّة يُسمّى الانفعال Strain. فإذا ضغطنا على كرة من المطاط يتغيّر شكلها الكروي، ثمّ تعود إلى شكلها وحجمها الأصليين عندما يزول الضغط (الإجهاد) الموضوع عليها.

وكذلك، إذا أثّرنا بقوّة شدّ (إجهاد) على سلك نابض من الصلب، فإنّ طولهُ سيزداد، وبالتالي يزداد مقدار استطالته (انفعاله) Strain مع زيادة القوّة المؤثرة. وبمجرد إلغاء القوّة المؤثرة على سلك النابض، يستعيد هذا الأخير طولهُ الأصلي. تُعتبر مادة سلك النابض من الموادّ المرنة، ويُعرّف هذا النوع من المرونة بالمرونة الطولية.

وقد لوحظ أنّ مقدار الانفعال في النابض يتناسب طرديّاً مع الإجهاد الواقع عليه بشرط أن يعود سلك النابض إلى طولهُ الأصلي. وقد أجرى هوك تجارب عملية لتبيان العلاقة بين استطالة سلك النابض (الانفعال)، والقوّة المؤثرة عليه (الإجهاد).

## 3. خواصّ المادّة المتّصلة بالمرونة

### Properties Related to the Elasticity of Matter

من خواصّ المادّة المتّصلة بالمرونة:

✦ الصلابة rigidity، وهي مقاومة الجسم للكسر.

✦ الصلادة hardness، وهي مقاومة الجسم للخدش.

فالنحاس أكثر صلادة من الذهب ويُمكن ترتيب المعادن تنازليّاً من حيث صلادتها: كالتالي: الصلب، الحديد، النحاس، الألمنيوم، الفضة، الذهب، الرصاص.

✦ الليونة ductility، هي إمكانية تحويل المادّة إلى أسلاك مثل النحاس.

✦ الطرق malleability، هي إمكانية تحويل المادّة إلى صفائح.

## مثال (1)

إذا علمت أنّ فرع شجرة يتبع قانون هوك، عند تعليق كتلة مقدارها  $(20)\text{kg}$  من طرف فرع شجرة، تدلّى هذا الأخير مسافة  $(10)\text{cm}$ . كم يتدلّى الفرع عند تعليق كتلة مقدارها  $(40)\text{kg}$  من النقطة نفسها؟ احسب المسافة كذلك عند تعليق كتلة مقدارها  $(60)\text{kg}$  علماً أنّ فرع الشجرة يتبع قانون هوك وأنّ هذه الكتل لا تتعدّى حدّ المرونة لفرع الشجرة  $g = (10)\text{m/s}^2$ .

### طريقة التفكير في الحلّ

1. حلّ: اذكر المعلوم وغير المعلوم:

المعلوم: الكتلة:  $m_1 = (20)\text{kg}$

الاستطالة:  $x_1 = (10)\text{cm}$

غير المعلوم: الاستطالة:  $x_2 = ?$  إذا كانت الكتلة  $m_2 = (40)\text{kg}$

الاستطالة:  $x_3 = ?$  إذا كانت الكتلة  $m_3 = (60)\text{kg}$

2. احسب غير المعلوم:

باستخدام الصيغة الرياضية لقانون هوك:

$$F = kx$$

بالتعويض عن المقادير المعلوم في المعادلة نحصل على:

$$F_1 = kx_1 = m_1g \Rightarrow k = \frac{m_1g}{x_1} = \frac{20 \times 10}{0.1} = (2000)\text{N/m}$$

$$F_2 = kx_2 = m_2g \Rightarrow x_2 = \frac{m_2g}{k} = \frac{40 \times 10}{2000} = (0.2)\text{m} = (20)\text{cm}$$

$$x_3 = \frac{m_3g}{k} = \frac{60 \times 10}{2000} = (0.3)\text{m} = (30)\text{cm}$$

3. قيم: هل النتيجة لها معنى؟

ترداد الاستطالة بازدياد الثقل.

## مثال (2)

عند تأثير قوة مقدارها (10)N على نابض ، استطال هذا الأخير بمقدار (4)cm . احسب الاستطالة التي تحدث بتأثير قوة مقدارها (15)N على النابض نفسه .

**طريقة التفكير في الحل**

**1. حلل:** اذكر المعلوم وغير المعلوم:

المعلوم: القوة:  $F = (10)N$

الاستطالة:  $x_1 = (4)cm$

غير المعلوم:

الاستطالة:  $x_2 = ?$  إذا كانت القوة  $F_2 = (15)N$

**2. احسب غير المعلوم:**

باستخدام الصيغة الرياضية لقانون هوك:  $F = kx$

بالتعويض عن المقادير المعلومه في المعادلة نحصل على:

$$\frac{F_2}{x_2} = \frac{F_1}{x_1} \Rightarrow \frac{15}{x_2} = \frac{10}{4}$$

$$x_2 = \frac{15 \times 4}{10} = 6cm$$

**3. قيم:** هل النتيجة لها معنى؟

تزداد الاستطالة بازدياد الثقل .

## مراجعة الدرس 1-2

**أولاً -** ما المرونة؟ اذكر بعض المواد المرنة وبعض المواد غير المرنة .

**ثانياً -** اختر الإجابة الصحيحة

1. مواد ذات مرونة (الصلصال - العجين - الصلب) .
2. العالم (إسحق نيوتن - روبرت هوك - جاليليو) هو الذي توصل إلى العلاقة بين القوة المؤثرة على نابض ومقدار الاستطالة .
3. مقدار القوة المؤثرة (يتناسب طردياً مع - يتناسب عكسياً مع - لا يتأثر ب) استطالة النابض .

**ثالثاً -** عرّف كلاً من الإجهاد والانفعال ، ثم اكتب العلاقة بينهما .

**رابعاً -** اذكر قانون هوك ، ثم ارسم منحنى الشدة - الاستطالة مبيناً على الرسم حدّ المرونة ، واشرح تجربة لتطبيقه عملياً في المختبر .



الأهداف العامة

- ✎ يعرف الضغط ووحدات قياسه .
- ✎ يعدد العوامل التي يتوقف عليها الضغط عند نقطة ما في باطن سائل .
- ✎ يذكر نصّ قاعدة باسكال واستخدامها في الحياة اليومية .
- ✎ يصف تركيب المكبس الهيدروليكي واستخداماتها في الحياة العملية .
- ✎ يذكر نصّ قاعدة أرخميدس (طفو - غوص) ويطبّقها عملياً .
- ✎ يعرف ظاهرة التوتر السطحي وتواجدها في الحياة اليومية .
- ✎ يعرف قوى التماسك بين جزيئات المادة الواحدة .
- ✎ يفسر قوى التلاصق بين جزيئات مادّتين مختلفتين .

يشغل علم السوائل الساكنة حيزاً مهماً في علم الفيزياء وذلك لما يحويه من تطبيقات واسعة في حياتنا، كما في الأنظمة الهيدروليكية حيث يتمّ نقل القوة والحركة والتحكّم بهما بواسطة سائل، وفي بناء السدود الذي يتطلب معرفة ضغط السوائل واتّجاهها، وفي آلية عمل الغوّاصات لتغوص أو تطفو، وفي عمل المضخّات المختلفة وأجهزة قياس الضغط وغيرها . في هذا الدرس، سنتطرّق إلى الضغط في السوائل، وإلى قانون باسكال ودوره في عمل المكبس الهيدروليكي . كذلك، سنتعرّف قاعدة أرخميدس وتفسيرها لظاهرتي الطفو والغوص، وسنتناول بعض التطبيقات لظاهرة التوتر السطحي .


Liquid Pressure

1. ضغط السوائل

يحدث وجود سائل ما في وعاء قوى على جدران الوعاء وقاعدته . ولكي نستكشف التفاعل بين السائل والسطح، من المفيد أن نسترجع مفهوم الضغط الذي يعني القوة العمودية المؤثرة على وحدة المساحة والمقاسة، وفق النظام الدولي للوحدات (SI)، بوحدة باسكال (Pa) أي  $(N/m^2)$  .

$$P = \frac{F}{A}$$


فالضغط الذي يحدثه الصندوق على سطح الطاولة يساوي محصّلة ثقله مقسوم على مساحة سطحه الملامس لسطح الطاولة . كذلك هي الحال بالنسبة إلى السائل الموجود في الوعاء الأسطواني الموضّح في (الشكل 83) إذ يساوي الضغط الذي يسببه السائل على قاعدة الوعاء محصّلة ثقله مقسوم على مساحة القاعدة (سوف نهمل الآن الضغط الجوي) .




(شكل 83)

يضغط السائل على قاعدة الوعاء كما يضغط الصندوق على سطح الطاولة .






(شكل 84)




(شكل 85)

يتساوى الضغط عند العمق نفسه بغض النظر عن شكل الوعاء.



(شكل 86)

الضغط في البحيرة الصغيرة العميقة أكبر من الضغط في البحيرة الكبيرة غير العميقة. ويتحمل السد الذي يحتجز الماء في البحيرة العميقة ضغط مياه أكبر من البحيرة الضحلة.



(شكل 87)

يساوي الضغط على نقطة A مجموع الضغوط.

## 2. الضغط عند نقطة في السائل

### Pressure to a Point in a Liquid

لنفترض أن نقطة (x) تقع في قاعدة عمود مساحتها (A) في باطن سائل كثافته (ρ)، وتبعد عن سطح السائل مسافة (h) (الشكل 84).

الضغط الناشئ عن السائل (P) عند نقطة (x) يساوي القوة التي يؤثر بها السائل على القاعدة مقسومة على مساحة تلك القاعدة.  $P = \frac{F}{A}$  علماً أن القوة المؤثرة على القاعدة تساوي وزن عمود السائل الذي ارتفاعه (h) ومساحة قاعدته (A).

وعليه يكون الضغط الناشئ عند نقطة (x):

$$P = \frac{mg}{A} = \frac{\text{وزن عمود السائل}}{\text{مساحة القاعدة}} = \text{الضغط}$$

$$P = \rho h g \quad (1)$$

نستنتج من المعادلة (1) أن ضغط السائل عند نقطة ما يتناسب طردياً مع عمق النقطة (h) أسفل سطح السائل ومع كثافة السائل (ρ). لهذا يكون للنقاط التي تقع في مستوى أفقي واحد داخل سائل متجانس ومتزن الضغط نفسه. ويمكن التحقق عملياً من ذلك باستخدام الأواني المستطرفة (الشكل 85).

وكلّما ازداد عمق النقاط عن السطح، ازداد الضغط عليها. ويُراعى هذا المبدأ في بناء جدران السدود المائية، فكلّما كانت كمية الماء المحتجزة خلف الجدار أعمق، احتاج هذا الأخير إلى سماكة أكبر (الشكل 86). إن القوى التي تُنتج الضغط عند أي نقطة في السائل تؤثر بشكل مساوٍ وفي جميع الاتجاهات. فعلى سبيل المثال، عندما تسبح تحت الماء ستشعر بالضغط نفسه على أذنك، بغض النظر عن اتجاه انحناء رأسك. أمّا إذا كان السائل معرضاً للهواء، أي للضغط الجوي، فيكون الضغط الكلي أو المطلق عند النقطة (x) في باطن السائل مساوياً لضغط السائل + الضغط الجوي، أي  $P_T = P_a + \rho gh$ .

في حالة سوائل مختلفة غير قابلة للامتزاج في إناء واحد (الشكل 87)، يساوي الضغط الكلي عند نقطة ما في قاع الإناء مجموع ضغوط السوائل المختلفة. أي أن:

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_a$$

$$= \rho_1 g h_1 + \rho_2 g h_2 + \rho_3 g h_3 + \dots + P_a$$

## مثال (1)

احسب ضغط الماء المؤثر على قاعدة حوض لتربية الأسماك طوله  $m(3)$  وعرضه  $m(1.5)$  وعمق مائه  $m(0.5)$ .

احسب مقدار القوة المؤثرة على تلك القاعدة.

أهمل الضغط الجوي في هذا المثال واستعمل كثافة الماء

$$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3 \text{ ومقدار عجلة الجاذبية } g = 10 \text{ m/s}^2$$

طريقة التفكير في الحل

1. حلل: اذكر المعلوم وغير المعلوم.

المعلوم: طول قاعدة الحوض وعرضها:  $3 \times 1.5 \text{ m}^2$

ارتفاع الماء:  $h = 0.5 \text{ m}$

كثافة الماء:  $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$

غير المعلوم: (أ) الضغط:  $P = ?$  (ب) القوة:  $F = ?$

2. احسب غير المعلوم:

$$(أ) \text{ باستخدام المعادلة التالية } P = \rho \times h \times g$$

وبالتعويض عن المقادير المعلوم في المعادلة نحصل على:

$$P = 1000 \times 0.5 \times 10$$

$$= 5000 \text{ Pa}$$

$$(ب) \text{ باستخدام المعادلة } P = \frac{F}{A} \text{ \& } F = P \times A$$


وبالتعويض عن المقادير المعلوم في المعادلة نحصل على:

$$F = P \times A = 5000 \times 3 \times 1.5$$

$$F = 22500 \text{ N}$$

3. قيم: هل النتيجة مقبولة؟

إجابات منطقية تناسب مع القيم المعطاة.



(شكل 88)

الأنبوب ذو الشعبتين

## 3. الأنابيب ذات الشعبتين U – tubes

نصب الماء في إحدى شعبتي الأنبوب ذي الشعبتين، فيأخذ سطح الماء في الشعبتين مستوى أفقيًا واحدًا.

نصب كمية من الزيت الذي لا يمتزج بالماء في الشعبة (ب). يرتفع الماء في الشعبة (أ)، وينخفض في الشعبة (ب).

نسمي النقطة (A) عند السطح الفاصل بين الزيت والماء (الشكل 88).



بما أن النقطتين (A) و (B) في مستوى أفقي واحد، يكون الضغط عند نقطة (B) = الضغط عند النقطة (A):


$$P_a + \rho_1 g h_1 = P_a + \rho_2 g h_2$$

$$\rho_1 g h_1 = \rho_2 g h_2$$

$$\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{h_2}{h_1}$$

حيث:  $h_1$  = ارتفاع سطح الزيت عن السطح الفاصل و  $\rho_1$  = كثافة الزيت  
 $h_2$  = ارتفاع سطح الماء عن السطح الفاصل و  $\rho_2$  = كثافة الماء  
و يُمثّل المقدار  $\frac{\rho_1}{\rho_2}$  الكثافة النسبية للزيت التي يُمكن احتسابها بمعرفة  
كثافة الماء .





(شكل 91)  
المكبس الهيدروليكي

## 6. قاعدة (مبدأ) باسكال Pascal's Principle

في القرن السابع عشر، وضع العالم «بليز باسكال» القاعدة (المبدأ) التالية: «ينقل كل سائل ساكن محبوس أيّ تغيير في الضغط عند أيّ نقطة إلى باقي نقاط السائل، وفي جميع الاتجاهات». وتُسمّى وحدة قياس الضغط في النظام الدولي (SI) باسم العالم باسكال، وتُستخدم هذه القاعدة في المكبس الهيدروليكي (الشكل 91).

فعند ملء أنبوب له شكل حرف U بالماء ووضع مكبس عند كل من نهايتي الأنبوب، نلاحظ أنّ الضغط المؤثر على المكبس الأيسر ينتقل عبر الماء إلى المكبس الأيمن، ويؤثر عليه بالمقدار نفسه.

عندما تكون مساحة مقطع الفرع الأيمن للأنبوب أكبر من مساحة مقطع الفرع الأيسر، وإذا استخدم مكبس يُناسب كلّ فرع، فإنّ النتيجة ستكون مشوّقة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت مساحة مقطع المكبس الأيسر  $1\text{cm}^2$  ومساحة مقطع المكبس الأيمن  $50\text{cm}^2$ ، وإذا افترضنا وضع ثقل إضافي مقداره  $1\text{N}$  على المكبس الأيسر، فإنّ ضغطاً إضافياً مقداره  $1\text{N}/\text{cm}^2$  سينتقل عبر السائل ويدفع المكبس الكبير (الأيمن) لأعلى. كما يُؤثر ضغط مقداره  $1\text{N}/\text{cm}^2$  على كلّ  $1\text{cm}^2$  من المكبس الأيمن، وبالتالي ستمارس عليه قوّة مقدارها  $50\text{N}$ . وعليه، يُمكن لهذا المكبس رفع ثقل مقداره  $50\text{N}$ ، أي 50 مرّة مثل الثقل المؤثر على المكبس الصغير (الأيسر). وبالطبع يُمكن مضاعفة هذا الرقم تبعاً لمساحة كلّ من المكبس الكبير والمكبس الصغير.

وفي إطار المثال السابق نفسه، إذا تحرك المكبس الصغير لأسفل مسافة  $10\text{cm}$ ، فإنّ المكبس الكبير سيتحرك لأعلى مسافة  $\frac{1}{50}$  من هذه المسافة أي  $0.2\text{cm}$ .


وهذا يُشبهه إلى حدّ كبير الرافعة الميكانيكية، ومعنى ذلك أنّ:

حاصل ضرب القوّة المؤثرة  $\times$  المسافة التي يتحرّكها المكبس الصغير = حاصل ضرب القوّة الناتجة  $\times$  المسافة التي يتحرّكها المكبس الكبير.

وينطبق هذا أيضاً على المكبس الهيدروليكي المستخدم في محطات البنزين (الشكل 92) أو لدى أطباء الأسنان أو في الفرامل الهيدروليكية للسيارات.

سؤال

هل يُمكن استخدام الماء بدلاً من الزيت في الروافع الهيدروليكية المستخدمة في محطات البنزين؟ ولماذا؟



(شكل 92)

استعمال قاعدة باسكال في محطات خدمة السيارات

يُستخدم المكبس الهيدروليكي لرفع أثقال كبيرة بتأثير قوى صغيرة. فإذا افترضنا أن مساحتي مقطعي فرعي أنبوب المكبس المعدني هما  $A_1$  و  $A_2$  (الشكل 93)، وأن المكبس عديماً الاحتكاك، وإذا استخدمنا زيتاً غير قابل للانضغاط، فإن المكبس يعمل كالتالي:

1. عندما تُؤثر قوّة ( $F_1$ ) على المكبس الصغير، فإنّ هذه القوّة تُسبب ضغطاً ( $P$ )

$$P = \frac{F_1}{A_1} \quad \text{حيث (1):}$$

2. ينتقل هذا الضغط إلى جميع أجزاء السائل وإلى السطح السفلي للمكبس الكبير، والذي يُؤثر عليه بقوّة ( $F_2$ ) حيث:

$$F_2 = P \cdot A_2 \quad (2)$$

$$F_2 = \frac{F_1}{A_1} \cdot A_2$$


$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \quad \text{أي:}$$

3. عند التأثير بالقوّة ( $F_1$ ) على المكبس الصغير، فإنّه يتحرّك لأسفل مسافة ( $d_1$ ) ويتولّد ضغط نتيجة القوّة المؤثرة على المكبس الكبير فتحرّكه لأعلى مسافة ( $d_2$ ). وفي حالة المكبس المثالي (لا يوجد فقدان للطاقة) فإنّ:

الشغل المبذول على المكبس الكبير = الشغل المبذول من قبل المكبس الصغير

$$F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2 \quad (3)$$





(شكل 93)  
المكبس الهيدروليكي

تمثل الفائدة الآلية للمكبس الهيدروليكي النسبة بين القوة الكبيرة المؤثرة على المكبس الكبير إلى القوة الصغيرة المؤثرة على المكبس الصغير ، أو النسبة بين مساحة المكبس الكبير إلى مساحة المكبس الصغير ، والتي يُشار إليها بالرمز (ε) (إيسيلون) حيث:

$$\varepsilon = \frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1} = \frac{d_1}{d_2}$$

أي أن الفائدة الآلية أيضًا هي:

النسبة بين المسافة التي يتحركها المكبس الصغير إلى المسافة التي يتحركها المكبس الكبير ، وذلك إذا افترضنا أن كفاءة المكبس هي 100% ، أي لا يوجد أي فقدان للطاقة .

$$\text{كفاءة المكبس الهيدروليكي} = \frac{\text{الشغل المبذول بالمكبس الكبير}}{\text{الشغل المبذول بالمكبس الصغير}} = \frac{F_2 \cdot d_2}{F_1 \cdot d_1}$$

تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد عملياً مكبس كفاءته 100% ، وذلك بسبب قوى الاحتكاك بين المكابس وجدران الأنابيب ، ولوجود فقاعات هوائية في الزيت .

## مثال (2)

إذا استخدمنا مكبساً لرفع سيارة كتلتها  $(1000) \text{kg}$  ، وافترضنا أن مساحة المكبس الصغير  $(50) \text{cm}^2$  ومساحة المكبس الكبير  $(2) \text{m}^2$  ، احسب القوة اللازمة لرفع السيارة .

### طريقة التفكير في الحل

1. حلل: اذكر المعلوم وغير المعلوم .

المعلوم: كتلة السيارة:  $m = (1000) \text{kg}$

القوة المؤثرة على المكبس الكبير:  $F_2 = mg = 1000 \times 10 = 10\,000 \text{N}$

مساحة المكبس الكبير:  $A_2 = (2) \text{m}^2$

مساحة المكبس الصغير:  $A_1 = (50 \times 10^{-4}) \text{m}^2$

غير المعلوم: القوة اللازمة لرفع السيارة ؟  $F_1 = ?$

### 2. احسب غير المعلوم:

باستخدام القاعدة الرياضية لمبدأ باسكال:  $\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$

بالتعويض عن المقادير المعلوم في المعادلة ، نحصل على:

$$\frac{F_1}{50 \times 10^{-4}} = \frac{10\,000}{2} \Rightarrow F_1 = 25 \text{ N}$$

### 3. قيم: هل النتيجة مقبولة؟

نحتاج إلى  $(25) \text{N}$  فقط لرفع سيارة تزن  $(10\,000) \text{N}$  ، وهذا يبين دور المكبس الهيدروليكي في رفع الأشياء الثقيلة .

## أسئلة تطبيقية وحلها

1. أثرت قوّة مقدارها  $(20)N$  على المكبس الصغير الذي تبلغ مساحته مقطعه  $(0.2)m^2$  في مكبس باسكال .  
إذا افترضنا أنّ مساحة المقطع الكبير تساوي  $(2)m^2$  ، احسب:  
(أ) الضغط الذي انتقل عبر السائل  
(ب) القوّة المبذولة على المكبس الثاني  
الناتج:  
(أ)  $(100)Pa$   
(ب)  $(200)N$
2. ضغطت ممرضة على مكبس محقن طبيّ بقوّة مقدارها  $(15)N$  . احسب القوّة المؤثرة على الثقب الذي يخرج منه الدواء السائل إذا افترضنا أنّ نصف قطر أسطوانة المكبس يُساوي  $(2)cm$  ، ونصف قطر الثقب الذي خرج منه الدواء يُساوي  $(1)mm$  .  
الناتج:  $(3.75 \times 10^{-2})N$

## مثال (3)

- مكبس هيدروليكي قطرا مكبسيه  $(4)cm$  و  $(30)cm$  ، احسب:  
(أ) مقدار القوّة المؤثرة على المكبس الصغير في حال رفع كتلة مقدارها  $(200)kg$  .  
(ب) المسافة التي يتحرّكها المكبس الكبير إذا تحرك المكبس الصغير مسافة  $(10)cm$  .  
(ج) الفائدة الآلية للمكبس الهيدروليكي .  $(g = (10)m/s^2)$

### طريقة التفكير في الحلّ

1. حلّل: اذكر المعلوم وغير المعلوم .  
المعلوم: نصف قطر المكبس الصغير:  $r_1 = (2 \times 10^{-2})m$   
نصف قطر المكبس الكبير:  $r_2 = (15 \times 10^{-2})m$   
الكتلة على المكبس الكبير  $m = (200)kg$   
المسافة التي تحركها المكبس الصغير:  $d_1 = (10)cm$   
غير المعلوم: (أ) مقدار القوّة على المكبس الصغير:  $F_1 = ?$   
(ب) المسافة التي تحركها المكبس الكبير:  $d_2 = ?$   
(ج) الفائدة الآلية:  $\varepsilon = ?$

### 2. احسب غير المعلوم:

- (أ) باستخدام القاعدة الرياضية لمبدأ باسكال:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

$$A_2 = \pi r_2^2, A_1 = \pi r_1^2, F_2 = m_2 g$$

بالتعويض عن المعلوم في المعادلة ، نحصل على:

$$\frac{F_2}{\pi r_2^2} = \frac{F_1}{\pi r_1^2} \Rightarrow F_1 = \frac{4 \times 10^{-4} \times 200 \times 10}{225 \times 10^{-4}} = 35.56 N$$

(ب) بالتعويض عن المعلوم في المعادلة التالية:

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{d_1}{d_2}$$

$$d_2 = \frac{A_1 \cdot d_1}{A_2} = \frac{\pi r_1^2 \cdot d_1}{\pi r_2^2}$$

$$d_2 = \frac{4 \times 10^{-4} \times 10}{225 \times 10^{-4}} = (0.178)cm$$

(ج) بالتعويض عن المعلوم في المعادلة ، نحصل على:

$$\varepsilon = \frac{A_2}{A_1} = \frac{\pi r_2^2}{\pi r_1^2} \frac{225 \times 10^{-4}}{4 \times 10^{-4}} = 56.25$$

### 3. قيم: هل النتيجة مقبولة؟

- يتبيّن من الإجابات دور المكبس الهيدروليكي في رفع الأجسام الثقيلة ، فنحن نحتاج إلى  $(3.5)kg$  لرفع  $(200)kg$  .



## مثال (4)

مكبس هيدروليكي تبلغ مساحة مقطع مكبسه الصغير  $10\text{cm}^2$  ومساحة مقطع مكبسه الكبير  $200\text{cm}^2$ . احسب:

- (أ) القوة التي تؤثر على المكبس الصغير عند وضع ثقل قدره  $10\,000\text{N}$  على المكبس الكبير.  
 (ب) المسافة التي يجب أن يتحرّكها المكبس الصغير واللازمة لرفع الثقل الموضوع على المكبس الكبير مسافة قدرها  $0.2\text{cm}$ ، مع اعتبار عدم فقدان أيّ قدر من الطاقة نتيجة للاحتكاك.  
 (ج) المسافة التي يجب أن يتحرّكها المكبس الصغير واللازمة لرفع الثقل الموضوع على المكبس الكبير مسافة  $0.2\text{cm}$ ، في حال فقدانه  $20\%$  من الطاقة نتيجة الاحتكاك.

### طريقة التفكير في الحلّ

1. حلّل: اذكر المعلوم وغير المعلوم.

المعلوم: مساحة مقطع المكبس الصغير:  $A_1 = 10\text{cm}^2$

مساحة مقطع المكبس الكبير:  $A_2 = 200\text{cm}^2$

القوة المبذولة على المكبس الكبير:  $F_2 = 10\,000\text{N}$

المسافة التي تحرّكها المكبس الكبير:  $d_2 = 0.2\text{cm}$

غير المعلوم: (أ) مقدار القوة على المكبس الصغير:  $F_1 = ?$

(ب) المسافة التي تحرّكها المكبس الصغير مع إهمال الاحتكاك:  $d_1 = ?$

(ج) المسافة التي تحرّكها المكبس الصغير لرفع الثقل الموضوع مسافة  $0.2\text{cm}$  في

حال هدر  $20\%$  من الطاقة.

### 2. احسب غير المعلوم:

(أ) باستخدام القاعدة الرياضية لمبدأ باسكال:  $\frac{F_2}{A_2} = \frac{F_1}{A_1}$

$$\frac{10\,000}{200 \times 10^{-4}} = \frac{F_1}{10 \times 10^{-4}}$$

$$F_1 = (500)\text{N}$$

(ب) بالتعويض عن المعلوم في المعادلة، نحصل على:

$$F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2$$

$$500 \times d_1 = 10\,000 \times 0.2 \times 10^{-2}$$

$$d_1 = (0.04)\text{m} = (4)\text{cm}$$

(ج) نسبة فقدان (هدر) الطاقة =  $20\%$  كفاءة المكبس =  $80\%$

$$\varepsilon = \frac{F_2 \cdot d_2}{F_1 \cdot d_1} \Rightarrow \frac{80}{100} = \frac{10\,000 \times 0.2 \times 10^{-2}}{500 d_1}$$

$$d_1 = (0.05)\text{m} = (5)\text{cm}$$

### 3. قيم: هل النتيجة مقبولة؟

في حال الاحتكاك، نحتاج إلى شغل أكبر لتعويض هدر الطاقة وبالتالي تحريك المكبس الصغير مسافة أطول.

## مراجعة الدرس 1-3

**أولاً -** اكتب معادلة الضغط عند نقطة ما في باطن سائل سطحه معرّض للهواء الجوّي .

**سادساً -** اذكر بعض التطبيقات لقاعدة باسكال .

**سابعاً -** حوض يحوي ماءً مالحاً كثافته  $(1030) \text{kg/m}^3$  . إذا افترضنا أنّ ارتفاع الماء يبلغ  $1 \text{m}$  وأنّ مساحة قاعدة الحوض تساوي  $(500) \text{cm}^2$  ، احسب:

(أ) الضغط الكليّ على القاعدة

(ب) القوّة المؤثّرة على القاعدة

(ج) الضغط على أحد الجوانب الرأسية للحوض

علماً أنّ الضغط الجويّ المعتاد يساوي  $(1.013 \times 10^5) \text{N/m}^2$  ، وعجلة الجاذبية الأرضية  $(10) \text{m/s}^2$  .

**تاسعاً -** مكبس هيدروليكيّ تساوي مساحة مقطع مكبسه الصغير  $(20) \text{cm}^2$  ومساحة مقطعه الكبير  $(2) \text{m}^2$  ، احسب:

(أ) القوّة المؤثّرة على المكبس الصغير ، لرفع كتلة وزنها  $(20\ 000) \text{N}$

موضوعة على مكبسه الكبير .

(ب) الفائدة الآلية لهذا المكبس الهيدروليكيّ .

## مراجعة الوحدة الثانية

### المفاهيم

Elastic Limit	حدّ المرونة	Stress	الإجهاد
Pressure	الضغط	Strain	الانفعال
Hooke's Law	قانون هوك		
Elasticity	مرونة		
Hydraulic Press	مكبس هيدروليكي		

### الأفكار الرئيسية في الوحدة

- ✎ المرونة هي خاصية تُميّز الأجسام الصلبة. فعند تأثير قوى خارجية على الجسم الصلب، قد يتغيّر شكل هذا الأخير أو حجمه، وعند زوال القوّة يعود الجسم الصلب إلى حالته الأصلية.
- ✎ قانون هوك: اكتشف هوك أنّ استطالة نابض تتناسب طردياً مع القوّة المؤثرة عليه.
- ✎ العلاقة البيانية بين الاستطالة والقوّة المؤثرة على النابض هي علاقة خطية إلى نقطة تُسمّى حدّ المرونة. بعد تجاوز هذه النقطة يفقد الجسم مرونته تدريجياً حتى يصل إلى نقطة القطع أو الكسر.
- ✎ قانون هوك: القوّة المؤثرة = ثابت المرونة × الاستطالة
- ✎ عند تصميم الآلات وتشبيد الجسور والمنشآت الهندسية، تُؤخذ بعين الاعتبار خواصّ المواد الصلبة المستخدمة في صناعتها. وتخضع هذه المواد لاختبارات خاصّة للتعرف على صفات عديدة من بينها المرونة، التأكد من مدى صلاحيتها وتحملها للإجهاد الذي سيُمارَس عليها، وملاحظة القوّة الناشئة من التمدد بالحرارة أو الانكماش بالبرودة. ومن ضمن خصائص المادة نذكر: الليونة، والصلابة والصلادة، والطواعية.
- ✎ الضغط هو القوّة المؤثرة على وحدة المساحات، والتي تُقاس في النظام الدولي للوحدات (SI) بوحدة  $N/m^2$  (الباسكال Pa).
- ✎ ضغط السائل عند نقطة ما في باطنه  $= \rho gh$ .
- ✎ الضغط الكلي في باطن سائل ما معرّض للهواء الجوّي  $= P_a + \rho gh$ .

✎ قاعدة باسكال: عندما يُؤثر ضغط على سائل ما محبوس في إناء، ينتقل مقدار الزيادة في الضغط إلى جميع أجزاء السائل وفي جميع الاتجاهات، كما ينتقل إلى جدران الإناء المحتوي على السائل وقاعه.



ومن تطبيقات هذه القاعدة: المكبس الهيدروليكي في محطات البنزين والصيانة، الفرامل الهيدروليكية، كراسي العلاج عند أطباء الأسنان، مكابس بالات القطن، مكابس المطابع المستخدمة في تجليد الكتب، وغيرها.

#### معادلات

$$F = k\Delta L = kx \text{ قانون هوك}$$

$$P = \frac{F}{A} \text{ الضغط}$$


$$P = \rho \times h \times g \text{ الضغط في السوائل}$$

$$P = \rho hg + P_{at} \text{ الضغط مع وجود ضغط الهواء}$$

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \text{ قانون باسكال}$$

#### خريطة مفاهيم الوحدة

استخدم المصطلحات الموضحة في الشكل التالي لرسم خريطة مفاهيم تهدف إلى تنظيم بعض الأفكار التي احتوتها الوحدة.



## تحققا من فهمك

ضع علامة (✓) في المربع الواقع أمام الإجابة الأنسب في كلِّ ممَّا يلي:

3. إنَّ ضغط السائل على نقطة ما في وعاء يتناسب طرديًّا مع:
- حجم السائل
- عمق النقطة أسفل سطح السائل
- ارتفاع النقطة بالنسبة إلى قاع الوعاء
- جميع الاحتمالات خاطئة
4. إذا أحدثت كتلة مقدارها 2kg استطالة مقدارها 3cm على زنبرك معيَّن، فإنَّ كتلة مقدارها 6kg قد تُحدث على النابض نفسه استطالة بوحدة السنتيمتر تُساوي: (لنفترض أنَّها لم تتخطَّ حدَّ المرونة)
- 6
- 9
- 10
- 12
5. يُقاس الضغط الجويّ بوحدة:
- N/m<sup>2</sup>
- Nm<sup>2</sup>
- Pa/m
- N/m

## أسئلة مراجعة الوحدة 2

تحقق من معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية:

1. عرّف المرونة واذكر بعض خواصّ المادّة المتعلّقة بالمرونة .
2. اكتب نص قانون هوك وارسم منحنى يُظهر القوّة والاستطالة مبيّناً:  
 (أ) حدّ المرونة  
 (ب) ثابت المرونة  
 (ج) ما هي وحدة قياس ثابت المرونة؟
3. عرّف الضغط واذكر وحدة قياسه .
4. (أ) بيّن في الرسم الجهاز المستخدم في قياس الضغط الجوّي في مكان ما .  
 (ب) عرّف الضغط الجوّي .  
 (ج) اذكر وحدة قياسه وفق النظام الدولي للوحدات (SI) .
5. كم يُساوي مقدار الضغط الكلّي عند نقطة ما في باطن سائل إذا كان:  
 (أ) سطح السائل معرّض للهواء الجوّي  
 (ب) السائل في إناء مغلق وغير معرّض للهواء الجوّي
6. بيّن العوامل المؤثّرة في كلّ من:  
 (أ) ضغط السائل عند نقطة في باطنه  
 (ب) دفع السائل لجسم مغمور فيه كليّاً أو جزئياً


9. اذكر بعض التطبيقات العملية لكلّ من:

(أ) قاعدة باسكال

تحقق من مهاراتك

حلّ المسائل التالية:

2. يحتوي الوعاء الموجود في الصورة على (20)cm من زئبق Hg تساوي كثافته  $(13\ 600)\text{kg/m}^3$  ،




وعلى (40)cm من الماء المالح تساوي كثافته  $(1\ 040)\text{kg/m}^3$  ، حيث إن الضغط الجوي يساوي  $(10^5)\text{Pa}$  .

(أ) احسب الضغط المؤثر على نقطة A على السطح العلوي للماء المالح.

(ب) احسب الضغط المؤثر على نقطة B على عمق (50)cm من السطح الأفقي الفاصل بين الهواء والماء المالح .

(ج) احسب الضغط المؤثر على نقطة C في قاع الوعاء المستخدم .




3. وضعنا في وعاء ذي شعبتين ومفتوح من الجهتين كمية من الزئبق بحيث أصبح السطحان الفاصلان بين الزئبق والهواء في كلٍّ من الشعبتين على مستوى أفقي واحد . إذا قمنا بإضافة (25)cm من الماء على الشعبة الأولى ، احسب كم سيصبح ارتفاع الزئبق في الشعبة الثانية بالنسبة إلى المستوى الأفقي للسطح الفاصل بين الزئبق والماء .

4. نابض طوله الأصلي  $L_0$  بدون إضافة أي كتلة . عند إضافة كتلة مقدارها (200)g ، أصبح طول النابض (10)cm . وعند إضافة كتلة مقدارها (600)g ، أصبح طوله (20)cm .

(أ) احسب طول النابض الأصلي  $L_0$  .  
(ب) احسب ثابت المرونة k .

5. يُمثّل الرسم البياني الموضّح العلاقة بين الضغط عند نقطة ما وعمقها داخل سائل ساكن . معتمداً على الرسم ، احسب:



(أ) الضغط الجوي عند سطح السائل  
(ب) الضغط عند النقطة (A)

(ج) عمق النقطة (A) تحت سطح السائل  
علماً أنّ كثافة السائل  $= (1\ 000)\text{kg/m}^3$  وعجلة الجاذبية الأرضية  $= (10)\text{m/s}^2$  .

### مهارة التواصل

اكتب نصّ قاعدة باسكال وبيّن ارتباط هذه القاعدة وأهمّيتها في تطوير الكثير من التقنيات المستخدمة في حياتنا اليومية.

### نشاط بحثي

تُعدّ «البلازما» إحدى حالات المادة الأكثر توفّرًا في الكون إذ تُشكّل 99% من المادة. قم ببحث تُبيّن فيه ماهيّة هذه الحالة، والعوامل المؤثّرة في تكوينها، وإمكانية وجودها على الأرض.



# مصطلحات

**المنهج العلمي Scientific Method:** هو عبارة عن مجموعة من التقنيات والطرق لاكتساب العلوم المُكتشفة وتنظيمها للوصول إلى نظريات جديدة أو تصحيح نظريات قديمة . (صفحة 15)

**الأتمتة Automation:** هو مصطلح مستحدث يطلق على كل شيء يعمل ذاتيًا بدون تدخل بشري . (صفحة 19)

**المدخلات Inputs:** تشمل جميع العناصر والمكونات اللازمة لتطوير المنتج، من أفراد، نظريات وبحوث، أهداف، آلات، موادّ وخامات، أموال، تنظيمات إدارية، أساليب عمل، وتسهيلات الفرص للحلول التكنولوجية . (صفحة 19)

**العمليات Processes:** هي الطريقة المنهجية المنظّمة التي تُعالج بها المدخلات باستخدام المعرفة ومهارات التصميم والتنفيذ والتصنيع والتشغيل لتشكيل المنتج . (صفحة 19)

**المخرجات Outputs:** هي المنتج النهائي بعد اختباره وتقييمه في شكل نظام تكنولوجي كامل وجاهز للاستخدام كحلول للمشكلات . (صفحة 20)

**السرعة العددية Speed:** هي المسافة المقطوعة خلال فترة زمنية محدّدة . (صفحة 30)

**السرعة المتوسطة Average Speed:** هي المسافة الكلية المقطوعة خلال الرحلة مقسومة على الزمن الكلي . (صفحة 31)

**السرعة اللحظية Instantaneous Speed:** تُساوي السرعة اللحظية لجسمٍ يتحرّك بسرعة متغيّرة في لحظة معيّنة ميل المماسّ إلى منحنى (المسافة-الزمن) للحركة في هذه اللحظة . (صفحة 33)

**الإزاحة Displacement:** هي المسافة في خط مستقيم في اتجاه معيّن . (صفحة 33)

**السرعة المتّجهة Velocity:** هي السرعة العددية ولكن في اتجاه محدّد . (صفحة 33)

**العجلة Acceleration:** هي الكميّة الفيزيائية التي تُعبّر عن تغيّر السرعة بالنسبة إلى الزمن . (صفحة 34)

**الحركة المعجّلة بانتظام في خط مستقيم Uniformly Accelerated Rectilinear Motion:** هي الحركة المتغيّرة في مقدار السرعة من دون الاتجاه . (صفحة 38)

**السقوط الحر Free Fall:** هو حركة جسم من دون سرعة ابتدائية بتأثير ثقله فقط مع إهمال تأثير مقاومة الهواء. (صفحة 44)

**القوة Force:** هي المؤثر الخارجي الذي يؤثر على الأجسام مسبباً تغييراً في شكل الجسم أو حجمه أو حالته الحركية أو موضعه. (صفحة 53)

**الاحتكاك Fiction:** هي القوة المقاومة التي تحدث عند تحرك سطحين متلاصقين باتجاهين متعاكسين عندما يكون بينهما قوة ضاغطة تعمل على تلاحمهما معاً. (صفحة 54)

**القصور الذاتي Inertia:** هو الخاصية التي تصف ميل الجسم إلى أن يبقى على حاله ويقاوم التغيير في حالته الحركية. (صفحة 56)

**البلازما Plasma:** هي الحالة الرابعة للمادة، وهي عبارة عن خليط من الأيونات السالبة (إلكترونات) والأيونات الموجبة. (صفحة 85)

**المرونة Elasticity:** هي خاصية للأجسام تتغير بها أشكالها عندما تؤثر عليها قوة ما، وبها أيضاً تعود الأجسام إلى أشكالها الأصلية عندما تزول القوة المؤثرة عليها. (صفحة 87)

**قانون هوك Hooke's Law:** هو مقدار الاستطالة أو الانضغاط ( $F=R \Delta x$ ) الذي يتناسب مع قيمة القوة المؤثرة ( $F$ )، أي أن  $F \propto x$ . (صفحة 87)

**الإجهاد Stress:** هو القوة التي تؤثر على جسم ما وتعمل على تغيير شكله. (صفحة 88)

**التوتر السطحي Surface Tension:** هو ظاهرة تجعل سطح السائل مرناً ومشدوداً. (صفحة 103)

**قوى التماسك Cohesion Forces:** هي قوى الجذب بين جزيئات المادة الواحدة. (صفحة 106)

**قوى التلاصق Adhesion Forces:** هي قوى الجذب بين جزيئات مادتين مختلفتين. (صفحة 106)

معاكم  
قوة الكو  
KuwaitTeacher.Com

