

@MOH82FALAH  
أ / محمد نوري الفلاح



وزارة التربية

# الرياضيات

## كرّاسة التمارين



الصف الثاني عشر أدبي  
الفصل الدراسي الثاني

طبعة الثانية

كتاب الطالب

Kuwaitteacher.Com



# الربيعان

## الصف الثاني عشر أدبي

### الفصل الدراسي الثاني

## كِرَاسَةُ التَّمَارِينِ

اللجنة الإشرافية لدراسة ومواءمة سلسلة كتب الرياضيات

## أ. حسين على عبدالله (رئيساً)

أ. فتحية محمود أبو زور      أ. حصة يونس محمد على

الطبعة الثانية

١٤٤٣

م ۲۰۲۲ - ۲۰۲۱

حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة لوزارة التربية - قطاع البحوث التربوية والمناهج  
ادارة تطوير المناهج

الطبعة الأولى م ٢٠١٤  
الطبعة الثانية م ٢٠١٦  
م ٢٠١٨  
م ٢٠١٩  
م ٢٠٢٠  
م ٢٠٢١

فريق عمل دراسة ومواءمة كتب الرياضيات للصف الثاني عشر أدبي

أ. فتحي محمد عبد الفتاح (رئيساً)

أ. محمود عبد الغني محمد

أ. سعيد أحمد علي خلف

أ. يسرى شملان أحمد البحر

أ. عيدة خلف عواد الشمري

أ. هنادي حباس غنيم المجلول

دار التَّرْبَوَيُون House of Education ش.م.م. وبيرسون إديوكيشن ٢٠١٤ م

شاركنا بتقييم مناهجنا



الكتاب كاملاً





حضره صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح  
أمير دولة الكويت

**H.H. Sheikh Nawaf AL-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah**  
**The Amir Of The State Of Kuwait**

معلمو الكويت  
Kuwaitteacher.Com

معلّمات  
Kuwaitteacher.Com



سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

ولي عهد دولة الكويت

**H.H. Sheikh Meshal AL-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah**

**The Crown Prince Of The State Of Kuwait**



معلّمات  
Kuwaitteacher.Com

## المحتويات

### الوحدة الرابعة: المتغيرات العشوائية والتوزيعات الاحتمالية

٨ .....	تمَرْنٌ ٤-١
٢٨ .....	تمارين إثرائية ..
٢٩ .....	اختبار الوحدة الرابعة ..

### الوحدة الخامسة: المتابينات والبرمجة الخطية

٣٢ .....	تمَرْنٌ ٥-١
٣٤ .....	تمَرْنٌ ٥-٢
٣٦ .....	تمارين إثرائية ..
٣٧ .....	اختبار الوحدة الخامسة ..



## المتغيرات العشوائية والتوزيعات الاحتمالية

### Discrete Random Variables and Probability Distributions

(٤-١) المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة)

#### Discrete Random Variables

#### المجموعة ١ تمارين أساسية

(١) في تجربة إلقاء قطعة نقود متماثلة ثلاثة مرات مرتين متتالية، أوجد مجموعة القيم للمتغيرات العشوائية التالية وحدد فيما إذا كانت متغيرات عشوائية متقطعة أم لا:

(أ) المتغير العشوائي سـ الذي يمثل عدد الكتابات.

(ب) المتغير العشوائي صـ الذي يمثل ربع عدد الكتابات.

(ج) المتغير العشوائي عـ الذي يمثل عدد الكتابات مضاعفـاً له ١.

(د) المتغير العشوائي لـ الذي يمثل ضعفـ عدد الكتابات.

(٢) في تجربة إلقاء قطعة نقود متماثلة مرتين متتاليتين، إذا كان المتغير العشوائي سـ يعبر عن عدد الصور فأوجد:

(أ) فضاء العينة (ف).

(ب) مدى المتغير العشوائي سـ.

(ج) احتمال وقوع كل عنصر من عناصر فضاء العينة (ف)  $(D(S_{rr})) = L(S_r) = S_r)$ .

(د) دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي سـ.

(٣) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي  $D$  للمتغير العشوائي سـ هي:

٣	٢	١	٠	-١	سـ
$0,3$	$0,2$	كـ	$0,3$	$0,1$	$D(S)$

فأوجد قيمة كـ.

(٤) إذا كان سـ متغيراً عشوائياً متقطعاً مدهاً هو:  $\{1, 2, 3, 4\}$  وكان  $D(1) = 1, D(2) = 0, D(3) = 0, D(4) = 2$ .

فأوجد  $D(2)$ ، ثم اكتب دالة التوزيع الاحتمالي  $D$  للمتغير العشوائي سـ.

(٥) صندوق يحوي ١٠ كرات متماثلة منها ٦ كرات حمراء و ٤ كرات بيضاء سُحبَت ٥ كرات عشوائياً معًا من الصندوق. إذا كان المتغير العشوائي  $S$  يمثل عدد الكرات البيضاء. فأوجد ما يلي:

(أ) عدد عناصر فضاء العينة ( $n(f)$ ).

(ب) مدى المتغير العشوائي  $S$ .

(ج) احتمال كل عنصر من عناصر مدى المتغير العشوائي  $S$ .

(د) دالة التوزيع الاحتمالي  $D(S)$  للمتغير العشوائي  $S$ .

(٦) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي  $D(S)$  للمتغير العشوائي  $S$  هي:

٣	٢	١	٠	$S$
٠,١	٠,٤	٠,٣	٠,٢	$D(S)$

فأوجد التوقع  $E(S)$  للمتغير العشوائي  $S$ .

(٧) ٤ بطاقات متماثلة مرقمة بالأرقام ١، ٢، ٣، ٤ وضعَت في كيس، سُحبَت بطاقة عشوائياً فإذا كان  $S$  هو «الرقم المدون على البطاقة المسحوبة من الكيس» فأوجد:

(أ) فضاء العينة ( $f$ ).

(ب) مدى المتغير العشوائي  $S$ .

(ج) احتمال كل عنصر من عناصر مدى المتغير العشوائي  $S$ .

(د) دالة التوزيع الاحتمالي  $D(S)$  للمتغير العشوائي المتقطع  $S$ .

(هـ) التوقع  $E(S)$  للمتغير العشوائي  $S$ .

(٨) الجدول التالي يبين دالة التوزيع الاحتمالي  $D(S)$  لمتغير عشوائي متقطع  $S$ .

١٠	٩	٨	٧	$S$
$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	$D(S)$

أوجد:

(أ) التوقع ( $E(S)$ ).

(ب) التباين ( $D(S)$ ).

(ج) الانحراف المعياري ( $\sigma$ ).

(٩) الجدول التالي يبين دالة التوزيع الاحتمالي  $F(x)$  للمتغير العشوائي المتقطع  $X$ .

٤	٣	٢	١	٠	س
٠,٣	٠,٢٥	٠,١	٠,١٥	٠,٢	$F(x)$

أوجد:  $F(0)$ ,  $F(1)$ ,  $F(2)$ ,  $F(3)$ ,  $F(4)$ ,  $F(5)$  حيث  $F(x)$  دالة التوزيع التراكمي للمتغير العشوائي  $X$ .

(١٠) الجدول التالي يبين بعض قيم دالة التوزيع التراكمي  $F(x)$  للمتغير العشوائي المتقطع  $X$ .

٧	٥	٣	١-	س
١	٠,٧	٠,٤٥	٠,١	$F(x)$

أوجد:

(أ)  $L(1 < X \leq 5)$ .

(ب)  $L(3 < X \leq 7)$ .

(ج)  $L(X < 3)$ .

(١١) لتكن  $F(x)$  دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي  $X$  كما في الجدول التالي:

٤	٣	٢	١	س
٠,٣	٠,١	٠,٢	٠,٤	$F(x)$

ارسم بيان دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي  $X$ .

(١٢) عند القاء قطعة نقود معدنية متباينة مرتين متتاليتين وملاحظة الوجه العلوي ليكن  $S$  المتغير العشوائي الذي يمثل عدد مرات ظهور الصورة.

(أ) أوجد فضاء العينة  $\Omega$ .

(ب) أوجد مدى المتغير العشوائي  $S$ .

(ج) أوجد احتمال وقوع كل عنصر من عناصر فضاء العينة  $\Omega$ .

(د) أوجد دالة التوزيع الاحتمالي  $F(x)$  للمتغير العشوائي  $S$ .

(هـ) ارسم دالة التوزيع الاحتمالي  $F(x)$  للمتغير العشوائي  $S$ .

(و) أوجد دالة التوزيع التراكمي  $F(x)$  للمتغير العشوائي  $S$ .

(١٣) إذا كان سـ متغيراً عشوائياً ذو حدود مـ = ٥ ، لـ = ١٠ ، فأوجد:

- (أ) لـ(سـ = صفر).  
(ب) لـ(٢ < سـ ≤ ٤).

(١٤) في تجربة إلقاء قطعة نقود متباينة ١٠ مرات، احسب احتمال ظهور كتابة ٤ مرات.

(١٥) عند إلقاء حجر نرد منتظم ٧ مرات متباينة، أوجد:  
(أ) احتمال ظهور العدد ٢ خمس مرات.  
(ب) احتمال ظهور العدد ٢ مرة واحدة على الأقل.  
(ج) احتمال ظهور العدد ٢ مرة واحدة على الأكثر.

(١٦) ينتج مصنع ١٠٠ وحدة يومياً، إذا كانت نسبة إنتاج الوحدات المعيبة ٣٪ . أوجد التوقع والتبالين والانحراف المعياري لعدد الوحدات المعيبة.

(١٧) إذا رميـنا قطعة نقود معدنية متباـنة ١٢ مرـة.  
(أ) احسب احتمـال الحصول على صورة ٧ مـرات.  
(ب) أوجـد التـوقع والـتبـالـين.

(١٨) في أحد مصانع الإطارات تـبيـن أن ٥٪ من الإطارات غير صالحـة للاستـعمال. إذا سـحبـنا ١٠ إـطـارات، فأـوجـد التـوقع والـتبـالـين للـإـطـاراتـ الغـيرـ الصـالـحةـ.

(١٩) يـتـجـ مـصنـعـ أـلبـانـ ٢٥٠٠ عـلـبةـ يـوـمـيـاـ فإذاـ كـانـتـ نـسـبـةـ إـنـتـاجـ الـعـلـبـ الفـاسـدـةـ ٥٪ . أـوجـدـ التـوقـعـ والـتبـالـينـ والـانـحرـافـ المـعـيـارـيـ لـعـدـدـ الـعـلـبـ الفـاسـدـةـ فـيـ أـحـدـ الـأـيـامـ.

(٢٠) نـسـبـةـ الطـلـابـ الـذـيـنـ يـشـارـكـونـ فـيـ المـسـابـقـاتـ الـعـلـمـيـةـ فـيـ إـحـدىـ الـمـدارـسـ ٢٠٪ . إـذـاـ تـمـ اـخـتـيـارـ ١٥ طـالـبـاـ عـشوـائـيـاـ مـنـ طـلـابـ الـمـدـرـسـةـ فـأـوجـدـ اـحـتـمـالـ أـنـ يـكـونـ مـنـهـمـ ٥ طـلـابـ يـشـارـكـونـ فـيـ المـسـابـقـاتـ الـعـلـمـيـةـ.

(٢١) رـمـيـتـ قـطـعـةـ نـقـودـ مـتـبـاـنـةـ ١٦ مـرـةـ. أـوجـدـ كـلـاـ منـ:  
الـتـوقـعـ،ـ الـتـبـالـينـ،ـ الـانـحرـافــ المـعـيـارـيـ لـعـدـدـ مـرـاتـ ظـهـورـ الصـورـةـ.



## المجموعة ب تمارين تعزيزية

(١) في تجربة إلقاء قطعة نقود متباينة ثلاثة مرات متتالية، أوجد مجموعة القيم للمتغيرات العشوائية التالية وحدّد فيما إذا كانت متغيرات عشوائية متقطعة أم لا:

(أ) المتغير العشوائي سـ الذي يمثل عدد الصور.

(ب) المتغير العشوائي صـ الذي يمثل ثلاثة أمثال عدد الصور.

(ج) المتغير العشوائي عـ الذي يمثل عدد الكتابات مطروحاً منه ١.

(٢) كيس به ثلاثة بطاقات متباينة مرقمة من ١ إلى ٣، سُحبَت عشوائياً بطاقتان واحدة تلو الأخرى مع الإرجاع إذا كان المتغير العشوائي سـ هو «مجموع العددين على البطاقتين». فأوجد:

(أ) فضاء العينة (ف).

(ب) مدى المتغير العشوائي (سـ).

(ج) احتمال وقوع كل عنصر من عناصر فضاء العينة (ف):  $(d(s_r)) = l(s_r = s_r)$ .

(د) دالة التوزيع الاحتمالي دـ للمتغير العشوائي (سـ).

(٣) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي دـ للمتغير العشوائي سـ هي:

١	٠	١-	سـ
٠,٤	كـ	٠,٢	$d(s)$

فأوجد قيمة كـ.

(٤) إذا كان سـ متغيراً عشوائياً متقطعاً مداه هو:  $\{-1, 0, 2, 3, 4\}$  وكان  $d(-1) = 1, d(0) = 2, d(2) = 0, d(3) = 4$ .

أوجد  $d(4)$ ، ثم اكتب دالة التوزيع الاحتمالي دـ للمتغير العشوائي سـ.

(٥) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي دـ للمتغير العشوائي سـ هي:

٤	٣	٢	١	سـ
٠,٣	٠,١	٠,٤	٠,٢	$d(s)$

أوجد التوقع لمـ للمتغير العشوائي سـ.

(٦) صندوق يحوي ٨ كرات متماثلة منها ٦ كرات حمراء وكراتان بيضاء. سُحبَت عشوائياً ٣ كرات معًا من الصندوق. إذا كان المتغير العشوائي  $s$  يمثل عدد الكرات الحمراء. فأوجد ما يلي:

(أ) عدد عناصر فضاء العينة ( $n$ ).

(ب) مدى المتغير العشوائي  $s$ .

(ج) احتمال كل عنصر من عناصر مدى المتغير العشوائي  $s$ .

(د) دالة التوزيع الاحتمالي  $D(s)$  للمتغير العشوائي  $s$ .

(٧) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي  $D(s)$  للمتغير العشوائي المقطعي  $s$  هي:

٣	٢	١	٠	-١	$s$
٠,٣	٠,١	٠,٣	٠,١	٠,٢	$D(s)$

أوجد التوقع  $E(s)$  للمتغير العشوائي  $s$ .

(٨) ٤ بطاقات متماثلة مرقمة بالأرقام ٠، ١، ٢، ٤ وضعت في كيس، سُحبَت بطاقة عشوائياً، إذا كان  $s$  هو «الرقم المدون على البطاقة المسحوبة من الكيس» فأوجد التوقع والتباين والانحراف المعياري للمتغير العشوائي  $s$ .

(٩) الجدول التالي يبين دالة التوزيع الاحتمالي  $D(s)$  لمتغير عشوائي مقطعي  $s$ .

٣	٢	١	٠	$s$
$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{9}$	$D(s)$

فأوجد:

(أ) التوقع ( $E(s)$ ).

(ب) التباين ( $\sigma^2$ ).

(ج) الانحراف المعياري ( $\sigma$ ).

(١٠) الجدول التالي يبين دالة التوزيع الاحتمالي  $D(s)$  للمتغير العشوائي المقطعي  $s$ .

٢	١	٠	-١	$s$
٠,٣	٠,٤	٠,٢	٠,١	$D(s)$

أوجد:  $T(-1)$  ،  $T(0)$  ،  $T(0,5)$  ،  $T(1)$  ،  $T(1,5)$  ، حيث  $T$  دالة التوزيع التراكمي للمتغير العشوائي  $s$ .

(١١) الجدول التالي يبين بعض قيم دالة التوزيع التراكمي  $F(x)$  للمتغير العشوائي المتقطع  $X$ .

٤	٢	٠	-٢	$F(x)$
١	٠,٧٥	٠,٣٠	٠,١٥	

أو جد:

(أ)  $L(-2 < x \leq 2)$ .

(ب)  $L(0 < x \leq 4)$ .

(ج)  $L(x > 0)$ .

(١٢) لتكن  $D$  هي دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي  $X$  كما في الجدول التالي:

٣	٢	١	٠	$D(x)$
٠,٣	٠,١	٠,٤	٠,٢	

ارسم بيان دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي  $X$ .

(١٣) إذا كان  $X$  متغيراً عشوائياً ذو حدود ومعلماته هما:  $n = 8$  ،  $L = 1$  ،  $U = 0$

فأو جد:

(أ)  $L(X = 0)$ .

(ب)  $L(1 < X \leq 4)$ .

(١٤) عند القاء قطعة نقود معدنية متماثلة ثلاث مرات متتالية وملحوظة الوجه العلوي ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يمثل عدد مرات ظهور كتابة.

(أ) أو جد فضاء العينة (ف).

(ب) أو جد مدى المتغير العشوائي ( $X$ ).

(ج) أو جد احتمال وقوع كل عنصر من عناصر فضاء العينة (ف).

(د) أو جد دالة التوزيع الاحتمالي  $D$  للمتغير العشوائي  $X$ .

(هـ) ارسم دالة التوزيع الاحتمالي  $D$  للمتغير العشوائي  $X$ .

(و) أو جد دالة التوزيع التراكمي  $F(x)$  للمتغير العشوائي  $X$ .



(١٥) عند إلقاء حجر نرد منتظم ٥ مرات متتالية، أوجد:

(أ) احتمال ظهور العدد ٤ ثلاث مرات.

(ب) احتمال ظهور العدد ٤ مرة واحدة على الأقل.

(ج) احتمال ظهور العدد ٤ مرة واحدة على الأكثر.

(١٦) عند إلقاء قطعة نقود معدنية مترنجة ثلات مرات متتالية. أوجد احتمال ظهور «صورتين فقط».

(١٧) أسرة تضم ستة أطفال، إذا كان احتمال أن يكون أي طفل ذكر هو ٥٠، فأوجد:

(أ) احتمال أن يكون بينهم ثلاثة ذكور فقط.

(ب) احتمال أن يكون عدد الذكور أقل من عدد الإناث.

(١٨) يتوج مصنع أجهزة حاسوب ٢٥٠ جهازاً يومياً. إذا كانت نسبة إنتاج الأجهزة المعيبة ٢٠٪، فأوجد التوقع والتبالين والانحراف المعياري لعدد الأجهزة المعيبة في أحد الأيام.

(١٩) يتوج مصنع أجهزة تلفاز وكانت نسبة الأجهزة التي تحوي عيباً في الإنتاج تساوي ١٠٪. إذا تم عشوائياً سحب ١٥ وحدة من إنتاج المصنع، فأوجد التوقع والتبالين للأجهزة الصالحة للاستعمال.

## تمارين موضوعية

في التمارين (١١-١)، عبارات، ظلل (١) إذا كانت العبارة صحيحة، (ب) إذا كانت العبارة خاطئة.

- (١) التوقع هو القيمة التي تقيس تشتت قيم المتغير العشوائي المتقطع عن قيمته المتوسطة.
- (٢) التباين هو القيمة التي تجمع حولها القيم الممكنة للمتغير العشوائي المتقطع.
- (٣) دالة التوزيع التراكمي  $F(x)$  للمتغير العشوائي المتقطع عند القيمة  $x$  هي احتمال وقوع المتغير العشوائي  $X$  بحيث يكون سه أصغر من أو يساوي  $x$
- (٤) التوزيع التالي يمثل دالة التوزيع الاحتمالي  $F(x)$  للمتغير سه:

٣	٢	١	٠	س
٠,٤	٠,٤	٠,٥	٠,١	د(س)


- (٥) قيمة  $k$  التي تجعل التوقع  $E(X)$  للمتغير العشوائي سه يساوي ١ للدالة التوزيع الاحتمالي  $F(x)$ :

هي صفر.

صفر	١	٢	س	د(س)
$k$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	د(س)	

- (٦) لدالة توزيع تراكمي  $F(x)$  للمتغير العشوائي سه يكون:

- $L(M > S \geq B) = T(B) - T(M)$
- (٧) لدالة توزيع تراكمي  $F(x)$  للمتغير العشوائي سه يكون:
- $L(S > M) = 1 - T(M)$



(٨) بيان دالة التوزيع الاحتمالي  $F(x)$  للمتغير العشوائي سه حيث

٣	٢	١	٠	س
$\frac{2}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{1}{8}$	د(س)

هو:

- (٩) مدرسة فيها عدد الطلبة ٣٠٠ طالب فإذا كانت نسبة النجاح ٦٠ فإن التوقع لعدد الطلبة الناجحين هو ١٥٠ طالب.

- (١٠) عند إلقاء قطعة نقود متباينة ثلاثة مرات على التوالي فإن  $P(F) = 6$

- (١١) من تجربة إلقاء حجري نرد متباينين معاً مرة واحدة فإن احتمال ظهور عددين مجموعهما ٨ هو  $\frac{1}{12}$ .

في التمارين (١٢-٣٤)، لكل ترين أربعة اختيارات، واحد فقط منها صحيح. ظلل رمز الدائرة الدال على الاختيار الصحيح.

(١٢) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي دللمتغير العشوائي سـ هي:

٢	١	٠	-١	سـ
٠,٢	٠,٤	كـ	٠,٢	د(سـ)

فإن قيمة كـ هي:

٠,٢ (د)

جـ صفر

٠,٤ (بـ)

٠,٣ (أـ)

(١٣) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي دللمتغير العشوائي سـ هي:

٣	٢	١	سـ
كـ٢	كـ٢	كـ	د(سـ)

فإن قيمة كـ تساوي:

٠,٤ (د)

جـ ١

٠,٢ (بـ)

٠,٥ (أـ)

في التمارين (١٤-١٦)، استخدم الجدول التالي:

٣	٢	١	٠	سـ
٠,٣	٠,١	٠,٤	٠,٢	د(سـ)

حيث دـ هي دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي المتقطع سـ هي:

(١٤) ت(١-)

دـ صفر

جـ ٠,٤

٠,٦ (بـ)

٠,٢ (أـ)

(١٥) ت(١,٥)

٠,٦ (دـ)

جـ صفر

٠,٢ (بـ)

٠,٤ (أـ)

(١٦) ت(٤)

١ (دـ)

جـ ٠,٤

٠,١ (بـ)

٠,٢ (أـ)

(١٧) إذا كان سـ متغيراً عشوائياً متقطعاً دالة توزيع الاحتمالي د هي:

فإن التوقع له يساوي:

٢	١	٠	سـ
٠,٢٥	٠,٥٠	٠,٢٥	د(سـ)

٠,٥ د

١,٥ جـ

١,٢٥ بـ

١ أـ

(١٨) إذا كان سـ متغيراً عشوائياً متقطعاً لدالة التوزيع الاحتمالي د  
وكان التوقع  $= ٥,٥, \sqrt{s^2 + d} = ٤,٢٥$ ، فإن الانحراف المعياري هو:

١ دـ

٣,٧٥ جـ

٢ بـ

٤ أـ

(١٩) إذا كانت بعض قيم دالة التوزيع التراكمي تـ للمتغير العشوائي سـ معطاة في الجدول التالي:

فإن قيمة كـ تساوي:

٤	٣	٢	سـ
كـ	٠,٣	٠,١	تـ(سـ)

٠,٦ دـ

٠,٤ جـ

١ بـ

٠,٥ أـ

(٢٠) إذا كانت بعض قيم دالة التوزيع التراكمي تـ للمتغير العشوائي سـ معطاة في الجدول التالي:

فإن دـ(٢) =

٣	٢	١	٠	سـ
١	٠,٧	٠,٣	٠,١	تـ(سـ)

١ دـ

٠,٤ جـ

٠,٣ بـ

٠,٧ أـ

(٢١) ثلاث بطاقات متماثلة مرقمة ١، ٢، ٣ سحبـت عشوائياً ببطاقـتان الواحدة تلو الأخرى مع الإرجـاع وـكان المتغير العشوائي سـ هو «مجموع العـدين على البطاقـتين» فإن مدى سـ هو:

بـ {١، ٢، ٣، ٤}

أـ {٢، ١، ٣}

دـ {٢، ٣، ٤، ٥}

جـ {٢، ٣، ٤، ٥}

١ دـ

٣ جـ

١/٢ بـ

١/٤ أـ

(٢٢) في تجربـة رمي قطـعة نـقود منـتظـمة مـرتـين متـالـيتـين، احـتمـال ظـهـور صـورـة وـاحـدة عـلـى الأـقل هـو:

٢٣) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي دللمتغير العشوائي المتقطع سه هي:

فإن التوقع لم للمتغير العشوائي س يساوي:

۲	۱	۰	س
$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{1}{3}$	د(س)

- ١ أ ( )  $\frac{2}{3}$  ب ( )  $\frac{7}{9}$  ج ( )  $\frac{1}{2}$  د صفر ( )

(٢٤) عند القاء قطعة نقود منتظمة أربع مرات متتالية فإن التباين  $S^2$  للمتغير العشوائي س «ظهور صورة» يساوي:

- ٤ د ٥ ج ٦ ب ٧ أ

(٢٥) إذا كان س متغيراً عشوائياً متقطعاً يأخذ القيم -١، ١، ٥، ١ وkan ل ( $s = 1 - 6, 0$ )  
 $L(s = 1) = 3, 0$  فإن  $L(s < 0)$

- ۰,۷ د ۰,۴ ج ۰,۹ ب ۰,۶ أ

٢٦) إذا كان س متغيراً عشوائياً يأخذ القيم ٢، ٣، ٤ وكان ل(س = ٢) = ٢٠، ل(س = ٣) = ٧، فـإن ل(س = ٤) = ...

- أ ٠,٣ ب ٠,٢ ج ٠,٧ د ليس آيامًا سبق

في التمارين (٢٧، ٢٨)، أسرة تضم ٨ أطفال، إذا كان احتمال أن يكون أي طفل ذكر هو ٥، فإن:

(٢٧) احتمال أن يكون بينهم ٣ ذكور فقط هو:

- ۰,۲۱۹ د ۰,۳۶۳ ج ۰,۲۷۳ ب ۰,۲۱۳ أ

(٢٨) احتمال أن يكون عدد الإناث يساوي عدد الذكور هو:

- ۰,۲۱۹ د ۰,۳۶۳ ج ۰,۲۷۳ ب ۰,۲۱۳ أ

# يُنتج مصنع سيارات ٢٠٠ سيارة في الشهر

(٢٩) ينتج مصنع سيارات ٢٠٠ سيارة في الشهر. إذا كانت نسبة السيارات المعيبة ٢٠، فإن التوقع لعدد السيارات المعيبة المنتجة في الشهر يساوي:

- ٤٠ د ٢٠ ج ٤ ب ٢ أ

(٣٠) التوزيع الذي يمثل «توزيع احتمالي لمتغير عشوائي س» هو:

٣	١	٠	س
٠,٣	٠,٣٢	٠,١١	د(س)

(أ)

٨	٦	٤	٢	س
٠,٠١	٠,١	٠,٥	٠,٤	د(س)

(ب)

٣	٢	١	س
٠,١	٠,٥	٠,٤	د(س)

(ج)

٣	٢	١	س
٠,٢	٠,٥	٠,٤	د(س)

(د)

(٤-١) المتغيرات العشوائية المتصلة (المستمرة)

Continuous Random Variables

المجموعة ١ تمارين أساسية

(١) حدد ما إذا كانت المتغيرات العشوائية التالية متصلة أو متقطعة.

(أ) الزمن (بالثواني) الذي يتطلبه حاسوب ليفتح ملف ما.

(ب) المعدل السنوي للأمطار في بلد معين.

(ج) الزمن المستغرق لرحلة طائرة من بلد معين إلى بلد آخر.

(د) سعر صفيحة الوقود.

(هـ) عدد الأحرف في أي كلمة.

(٢) إذا كان سـ متغيراً عشوائياً متصلةً ودالة كثافة الاحتمال له هي:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & : 2 \leq x \leq 4 \\ 0 & : \text{فيما عدا ذلك} \end{cases}$$

فأوجد:

(أ)  $L(2 \leq x \leq 4)$ .

(٣) إذا كان سـ متغيراً عشوائياً متصلةً ودالة كثافة الاحتمال له هي:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} & : 0 \leq x \leq 5 \\ 0 & : \text{فيما عدا ذلك} \end{cases}$$

فأوجد:

(أ)  $L(0 \leq x \leq 5)$ .

(ج)  $L(x \geq 2)$ .

(٤) لتكن الدالة د:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6} & : 1 \leq x \leq 5 \\ 0 & : \text{فيما عدا ذلك} \end{cases}$$

(أ) أثبت أن الدالة د هي دالة كثافة احتمال.

(ب) أثبت أن الدالة د تتبع التوزيع الاحتمالي المنتظم.

(ج) أوجد  $L(x > 3)$ .

(د) أوجد التوقع والتباين للدالة د.

(٥) لتكن الدالة د:

$$D(s) = \begin{cases} \frac{1}{3} & : s \geq 2 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

(أ) أثبت أن الدالة د هي دالة كثافة احتمال.

(ب) أثبت أن الدالة د تتبع التوزيع الاحتمالي المنتظم.

(ج) أوجد  $D(s \geq 4)$ .

(د) أوجد  $D(s \geq 3)$ .

(هـ) أوجد التوقع والتباین للدالة د.

(٦) لتكن الدالة د:

$$D(s) = \begin{cases} \frac{1}{8} & : 4 \leq s \leq 4 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

(أ) أثبت أن الدالة د هي دالة كثافة احتمال.

(ب) أوجد  $D(1 \leq s \leq 5)$ .

(ج) أوجد التوقع والتباین للدالة د.

(٧) الدالة د تتبع التوزيع الاحتمالي المنتظم وهي معرفة كما يلي:

$$D(s) = \begin{cases} \frac{1}{7} & : 0 \leq s \leq 7 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

(أ) أثبت أن الدالة د هي دالة كثافة احتمال.

(ب) أوجد  $D(0 \leq s \leq \frac{7}{8})$ .

(ج) أوجد التوقع والتباین للدالة د.

(٨) إذا كان سه متغيراً عشوائياً متصلًا ودالة كثافة الاحتمال له هي:

$$D(s) = \begin{cases} \frac{2}{9}s & : 0 \leq s \leq 3 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

فأوجد:

(ج)  $L(s \leq 1)$

(ب)  $L(s > 1)$

(أ)  $L(0 \leq s \leq 3)$



(٩) إذا كان سـ متغيراً عشوائياً متصلـاً ودالة كثافة الاحتمال له هي:

$$D(s) = \begin{cases} s^8 & : s \geq 0 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

فأوجد:

(أ)  $L(s \geq 0 > \frac{1}{2})$       (ب)  $L(s < \frac{1}{4})$       (ج)  $L(s \leq \frac{1}{3})$

(١٠) إذا كان  $\tau$  يتبع التوزيع الطبيعي المعياري للمتغير العشوائي سـ فأوجد:

(أ)  $L(\tau \geq 4, 5 \geq \tau \geq 2, 16)$       (ب)  $L(5 \leq \tau \leq 1, 5)$       (ج)  $L(4, 2 \geq \tau \geq 2, 51)$

(١١) إذا كان  $\tau$  يتبع التوزيع الطبيعي المعياري فأوجد:

(أ)  $L(\tau \geq 68, 0 \geq \tau \geq 64)$       (ب)  $L(1, 7 \geq \tau \geq 2, 58)$       (ج)  $L(-2, 0 \geq \tau \geq -1, 23)$

(١٢) يمثل المتغير العشوائي سـ درجات الطلاب في إحدى المواد الدراسية، إذا كان توزيع درجاته يتبع التوزيع الطبيعي الذي وسطه  $\mu = 50$  وانحرافه المعياري  $\sigma = 10$

فأوجد:

(أ)  $L(40 < s < 76)$       (ب)  $L(s \geq 55)$

(١٣) متغير عشوائي متصل سـ يتبع توزيعاً طبيعياً، التوقع  $\mu = 37$ ، وتباينه  $\sigma^2 = 16$ ، أوجد:

(أ)  $L(30 < s < 35)$

(ب)  $L(35 < s < 40)$

(ج)  $L(s < 30)$

## المجموعة ب تمارين تعزيزية

(١) إذا كان سـ متغيراً عشوائياً متصلـاً ودالة كثافة الاحتمال له هي:

$$D(s) = \begin{cases} 3 & : s \geq 0 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

فأوجد:

(أ)  $L(s \geq \frac{1}{3})$       (ب)  $L(s \leq \frac{1}{4})$       (ج)  $L(s < \frac{1}{4})$

$$D(s) = \begin{cases} 2 & : s \geq 0 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

(أ) ارسم الدالة  $D$ .

(ب) أثبت أن  $D$  هي دالة كثافة احتمال.

(ج) أثبت أن  $D$  تتبع التوزيع الاحتمالي المنتظم.

(د) أوجد:  $L(s \leq \frac{1}{8})$ ,  $L(s \leq \frac{1}{2})$ .

(هـ) احسب توقع والتباين المناسبين بعد تحديد التوزيع الذي تتبعه هذه الدالة.

(٣) متغير عشوائي سـ يتبع توزيعاً طبيعياً حيث إن التوقع  $\mu = 88$  والتباين  $\sigma^2 = 25$ ، فأجد:

(أ)  $L(s \geq 83)$       (ب)  $L(s \leq 87)$       (ج)  $L(80 \leq s \leq 90)$

(٤) يمثل المتغير سـ الزمن الذي يستغرقه أحد الطلاب للوصول إلى المدرسة وهو متغير عشوائي يتبع التوزيع الطبيعي توقعه  $\mu = 15$  والتباين  $\sigma^2 = 9$ . احسب احتمال وصوله بـ:

(أ) أقل من 18 دقيقة      (ب) أكثر من 12 دقيقة وأقل من 15 دقيقة.

## تمارين موضوعية

في التمارين (٦-١)، عبارات، ظلل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة، (ب) إذا كانت العبارة خاطئة.

(أ) (ب)

(١) نسبة الرطوبة خلال شهر هو متغير عشوائي متصل.

(٢) إذا كانت الدالة  $D$  معرفة كالتالي:

$$D(s) = \begin{cases} \frac{1}{2} & : s \geq 0 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

(أ) (ب)

فإن الدالة  $D$  هي دالة كثافة احتمال.

(٣) إذا كان سه متغيراً عشوائياً متصلةً ودالة كثافة الاحتمال له هي:

$$D(s) = \begin{cases} \frac{1}{2} & : s \geq 0 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

(أ) (ب)

فإن  $L(s) = 2$ .

(٤) إذا كانت الدالة  $D$  هي دالة كثافة احتمال تتبع التوزيع الاحتمالي المنتظم معرفة كما يلي:

$$D(s) = \begin{cases} \frac{1}{3} & : s \geq 0 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

(أ) (ب)

فإن التباين للدالة  $D$  هو  $\frac{3}{4}$ .

(أ) (ب)

(٥) من خواص التوزيع الطبيعي أنه متباين حول  $s = \mu$

(أ) (ب)

(٦) المساحة تحت منحنى التوزيع الطبيعي تساوي الواحد.

في التمارين (٧-٩)، لكل ترين أربعة اختيارات، واحد فقط منها صحيح. ظلل رمز الدائرة الدال على الاختيار الصحيح.

(٧) إذا كان سه متغيراً عشوائياً متصلةً، دالة كثافة الاحتمال له هي:

$$D(s) = \begin{cases} \frac{1}{2}s & : s \geq 0 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

فإن  $L(s) = 1$ .

(أ) (ب) (ج) (د)

(أ)  $\frac{1}{2}$  (ب) صفر (ج) ليس آلياً مما سبق (د)

(٨) إذا كان سـ متغيراً عشوائياً متصلـاً، دالة كثافة الاحتمال له هي:

$$D(s) = \begin{cases} \frac{1}{5} & : 2 \leq s \leq 3 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

$$\text{فإن } L(s) = (2, 5]$$

د  $\frac{1}{10}$

ج  $\frac{1}{5}$

ب ١

أ صفر

(٩) إذا كان سـ متغيراً عشوائياً متصلـاً، دالة كثافة الاحتمال له هي:

$$D(s) = \begin{cases} 2s & : 0 \leq s \leq 1 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

$$\text{فإن } L(s) = \left( \frac{1}{2}, 1 \right)$$

د  $\frac{1}{2}$

ج  $\frac{1}{4}$

ب  $\frac{3}{4}$

أ ١

في التمارين (١٠-١٦)، أجب عن الأسئلة من خلال الرسم البياني في الشكل المقابل:


(١٠) الدالة التي تعبر عن الرسم البياني التالي هي:

$$D(s) = \begin{cases} \frac{3}{4} & : 0 < s < \frac{3}{4} \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

$$D(s) = \begin{cases} \frac{3}{4} & : 0 < s < \frac{3}{4} \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

$$D(s) = \begin{cases} \frac{4}{3} & : 0 < s < \frac{4}{3} \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

$$D(s) = \begin{cases} \frac{3}{4} & : 0 < s < \frac{3}{4} \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$



(١١) الدالة د تتبع التوزيع الاحتمالي:

د المنتظم

ج الطبيعي المعياري

ب ذات الحدين

أ الطبيعي

(١٢) التوقع هو:

د  $\frac{3}{4}$

ج  $\frac{4}{3}$

ب  $\frac{2}{3}$

أ  $\frac{4}{5}$



(١٣) التباین هو:

$\frac{108}{16}$  د

$\frac{16}{108}$  ج

$\frac{16}{9}$  ب

$\frac{4}{27}$  أ

(١٤) ل( $\frac{4}{6} < س$ )

$\frac{1}{2}$  د

$\frac{1}{6}$  ج

$\frac{1}{4}$  ب

$\frac{1}{3}$  أ

(١٥) ل( $\frac{4}{12} < س$ )

١ د

$\frac{3}{4}$  ج

$\frac{6}{2}$  ب

$\frac{2}{6}$  أ

(١٦) ل( $0 < س < 1$ )

$\frac{3}{4}$  د

١ ج

$\frac{1}{3}$  ب

$\frac{4}{5}$  أ

(١٧) المساحة المحصورة بين منحنى الدالة د، والمحور السيني تساوي:

٢ د

٣ ج

$\frac{4}{3}$  ب

١ أ

(١٨) إذا كان  $t$  يتبع التوزيع الطبيعي فإن ل( $0 \leq t \leq 25, 35 =$ )

٠, ٢١٨ د

٠, ٤٩٠٦ ج

٠, ٥ ب

٠, ٩٩٠٦ أ

(١٩) إذا كان  $t$  متغيراً عشوائياً يتبع التوزيع الطبيعي المعياري فإن ل( $t > 2$ ) لا يساوي:

١ - ل( $t > 2$ ) ب

أ ل( $t \leq 2$ )

١ - ل( $t \geq 2$ ) د

ج ل( $t \geq 2$ )

## تمارين إثرائية

(١) متغير عشوائي س يتبع توزيعاً طبيعياً توقعه  $\mu = 25$  وتبينه  $\sigma^2 = 55$ ، أوجد:

(أ)  $L(s < 55)$

(ب)  $L(s > 50)$

(ج)  $L(30 < s < 40)$

(٢) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي  $D$  للمتغير العشوائي  $s$  هي:

١٢	١٠	٨	٦	٤	٢	$s$
$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$k$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$D(s)$

(أ) أوجد  $k$ .

(ب) ارسم دالة التوزيع الاحتمالي  $D$ .

(ج) أوجد دالة التوزيع التراكمي  $T$ .

(د) ارسم دالة التوزيع التراكمي  $T$ .

(٣) مدفع يتبع مداه توزيعاً طبيعياً توقعه ١٤ كم وتبينه ١ كم.

(أ) ما احتمال أن تصلك القذيفة إلى مسافة أبعد من ١٥ كم؟

(ب) ما احتمال أن تصلك القذيفة فقط إلى مسافة أقل من ١١ كم؟

(ج) ما احتمال أن تصلك القذيفة إلى مسافة بين ١٣ و١٥ كم؟

## اختبار الوحدة الرابعة

### أسئلة مقالية

(١) إذا كان سه متغيراً عشوائياً متقطعاً مداه هو {٢، ٣، ٤، ٥} وكان  $D(2) = 3, D(3) = 2, D(4) = 0$ .

فأوجد  $D(5)$ ، ثم اكتب دالة التوزيع الاحتمالي دللمتغير العشوائي سه.

(٢) يحتوي صندوق على ٨ كرات متماثلة منها: ٥ كرات حمراء و٣ كرات صفراء سحبت ٤ كرات عشوائياً معًا من الصندوق. إذا كان المتغير العشوائي سه يمثل عدد الكرات الصفراء، فأوجد ما يلي:

(أ) عدد عناصر فضاء العينة ن(ف).

(ب) مدى المتغير العشوائي سه.

(ج) احتمال كل عنصر من عناصر مدى المتغير العشوائي سه.

(د) دالة التوزيع الاحتمالي دللمتغير العشوائي سه.

(٣) يبيّن الجدول التالي دالة التوزيع الاحتمالي لمتغير عشوائي متقطع سه.

٦	٥	٤	٣	س
$\frac{1}{11}$	$\frac{3}{11}$	$\frac{5}{11}$	$\frac{2}{11}$	ل(س)

أوجد:

(أ) التوقع ( $\mu$ ). (ب) التباين ( $\sigma^2$ ). (ج) الانحراف المعياري  $S$ .

(٤) يبيّن الجدول التالي دالة التوزيع الاحتمالي دللمتغير العشوائي المتقطع سه.

٦	٥	٤	٣	٢	س
٠,٢	٠,١٥	٠,٣٥	٠,١٦	٠,١٤	د(س)

أوجد:

ت(١)، ت(٢)، ت(٣)، ت(٤)، ت(٥)، ت(٦)، ت(٧).

(٥) ينتج مصنع أجبان ١٢٥٠ علبة يومياً، إذا كانت نسبة إنتاج العلب الفاسدة ٤٠٪، فأوجد ما يلي لمعرفة عدد العلب الفاسدة في أحد الأيام:

(أ) التوقع ( $\mu$ ). (ب) التباين ( $\sigma^2$ ). (ج) الانحراف المعياري  $S$ .

(٦) إذا كان سه متغيراً عشوائياً متصلةً ودالة كثافة الاحتمال له هي:

$$D(s) = \begin{cases} \frac{1}{5} & : 2 \leq s \leq 3 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

فأوجد:

(أ)  $L(0 \leq s \leq 3)$

(ب)  $L(2 \leq s \leq 1)$

(ج)  $L(s=2)$

(٧) إذا كان سه متغيراً عشوائياً متصلةً. دالة كثافة الاحتمال له هي:

$$D(s) = \begin{cases} \frac{9}{2} s & : 0 \leq s \leq \frac{2}{3} \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

فأوجد:

(أ)  $L(0 \leq s \leq \frac{1}{3})$

(ب)  $L(s \leq \frac{1}{3})$

(ج) الدالة  $D$  تتبع التوزيع الاحتمالي المتظم وهي معروفة كما يلي:

$$D(s) = \begin{cases} \frac{1}{8} & : 3 \leq s \leq 5 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

(أ) أثبت أن  $D$  هي دالة كثافة احتمال.

(ب) أوجد  $L(1 \leq s \leq 3)$

(ج) أوجد التوقع والتبالين للدالة  $D$ .

(٩) إذا كان  $\sigma$  يتبع التوزيع الطبيعي المعياري للمتغير العشوائي سه، فأوجد:

(أ)  $L(\sigma \geq 3, 24)$

(ب)  $L(\sigma \leq 1, 52)$

(ج)  $L(1, 4 \leq \sigma \leq 2, 6)$

(١٠) يمثل المتغير سه درجات الطلاب في مادة الرياضيات. إذا كان توزيع هذه الدرجات يتبع التوزيع الطبيعي الذي وسطه  $\mu = 40$  وانحرافه المعياري  $\sigma = 8$  فأوجد:

(أ)  $L(30 < s < 65)$

(ب)  $L(s \geq 45)$

## تمارين موضوعية

في التمارين (٤-١)، لكل تمرين أربعة اختيارات، واحد فقط منها صحيح. ظلل رمز الدائرة الدال على الاختيار الصحيح.

(١) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي دللمتغير العشوائي سه هي:

۲	۱	۰	۱-	۲-	س
۰, ۲	۰, ۱۵	ک	۰, ۲۴	۰, ۱۶	د(س)

= فان قيمة ك

٦

٢٥

٣

٦٢

في التمارين (٢، ٣)، استخدم الجدول التالي:

۵	۴	۳	۲	۱	س
۰,۰۵	۰,۱۵	۰,۲۶	۰,۳	۰,۲۴	د(س)

حيث د هي دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي المتقطع س:

فان:

= (۲) ت (۲)

٢٦

٣٠

٥٤ ب

٢٤

$$= (4, 5) \text{ ت } (3)$$

٩٥

ج

٢٦

١٥

(٤) ينتج مصنع سيارات ١٥٠ سيارة في الشهر، إذا كانت نسبة السيارات المعيبة ٢٠٪، فإن التوقع لعدد السيارات المعيبة المنتجة في شهر واحد هو:

٦٠ د

۲

۳۰

۲۱

## المتباينات Inequalities

### المجموعة ١ تمارين أساسية

في التمارين (١-٣)، أوجد مجموعة حل المتباينات التالية ومثلّ مجموعه الحل على خط الأعداد الحقيقية:

$$(1) 3 + س \leq 7 \quad (2) 11 - 3 س > 4 \quad (3) 13 - 5 س > 8$$

(٤) بين أيّاً من النقاط التالية: (١، ٢)، ب (٧، ٠)، ج (-١، ٢). تحقق المتباينة:  $3 س + 5 ص \geq 12$ .

في التمارين (٥-٦)، ارسم خط الحدود لكلّ متباينة:

$$(5) (أ) ص + س < 5 \quad (ب) 3 س + 2 ص \geq 18 \quad (ج) ص \leq 3 - 2 س \quad (د) س - ص - 2 > 0$$

$$(6) (أ) س \leq -3 - 2 ص \quad (ب) ص > 2 \quad (ج) س - 5 < 0 \quad (د) 2 ص \geq 8$$

في التمارين (٧-١٠)، مثلّ بيانياً منطقة الحل لكلّ متباينة:

$$(7) س + ص < 3 \quad (8) س - 3 ص > 6 \quad (9) 2 س - 3 ص \geq 0 \quad (10) 2 س + 4 ص \leq 12$$

(١١) مثلّ بيانياً منطقة الحل المشترك للمتباينتين:

$$س + ص > 3 , \quad 5 س + 2 ص \leq 10$$

في التمارين (١٢-١٧)، مثلّ بيانياً منطقة الحل المشترك للمتباينتين:

$$(12) س + 2 ص \leq 4 , \quad ص \geq -س - 1$$

$$(13) ص < س + 2 , \quad ص \geq -س + 1$$

$$(14) ص \geq س + 3 , \quad ص \leq س + 2$$

$$(15) س - 2 ص > 3 , \quad 2 س + ص < 8$$

$$(16) ص < س - 3 , \quad ص \leq س - 4$$

$$(17) -2 س + ص < 1 , \quad ص < س$$

(١٨) يحتاج مسؤول المخيم إلى ٣٠ شخصاً كحد أقصى لتنظيم رحلة تخفيض، ويحتاج من بينهم إلى ١٠ على الأقل لإعداد الخيم وإلى ٥ آخرين على الأقل لجمع الخطب

(أ) اكتب نظام متباينات لتمثيل المسألة.  
(ب) مثلّ بيانياً النظام وحلّه.

في التمارين (١٩-٢١)، مثلّ بيانياً منطقة الحل المشترك للمتباينات التالية:

$$(19) س + ص \geq 2 ; س - ص < 1 ; 2 س + 3 ص > 6$$

$$(20) س \leq ص ; 2 س + ص \geq 2 ; ص + 1 > 3$$

$$(21) س + ص \leq 3 ; س - ص \geq 4 ; ص \geq 0$$

## المجموعة ب تمارين تعزيزية

في التمارين (٦-١)، أوجد مجموعة حل المتباينات التالية ومثلّ مجموعة الحل على خط الأعداد الحقيقة:

$$13 > 3 + 2 \geq 4 \quad (٢)$$

$$3 - 4 < 5 \quad (١)$$

$$5 \geq 3 - 4 > 1 \quad (٤)$$

$$7 \leq 2 - 3 \quad (٣)$$

$$3 \geq 1 + \frac{1}{2}s \quad (٦)$$

$$8 > 2 - 5s \quad (٥)$$

(٧) بين أيّاً من النقاط التالية: (٠،٠)، (٢،٨)، (٣،٢)، (٤،١)، (٥،٣).

تحقق المتباينة:  $2s + 3c \leq 10$ .

في التمارين (٨-١١)، مثلّ بيانياً منطقة الحل المشترك للمتباينتين:

$$\begin{cases} s + c > 5 \\ s + c \leq -1 \end{cases} \quad (٩)$$

$$\begin{cases} s + c < 2 \\ s + c \geq -3 \end{cases} \quad (٨)$$

$$\begin{cases} s + 2c < 4 \\ 2s - c < 6 \end{cases} \quad (١١)$$

$$\begin{cases} s - c < 2 \\ 2s + c \geq 15 \end{cases} \quad (١٠)$$

(١٢) لنفرض أنك تريد شراء نوعين من كتب المطالعة. سعر الكتاب باللغة العربية دينارين وسعر الكتاب باللغة الأجنبية ٥ دنانير. يجب أن تشتري ٦ كتب على الأقل ويجب ألا يتخطى سعر الكتب المشتراة ٢٠ ديناً.

(أ) اكتب نظام متباينات لتمثيل المسألة.

(ب) مثلّ بيانياً النظام وحلّه.

في التمارين (١٣-١٥)، مثلّ بيانياً منطقة الحل المشترك للمتباينات التالية:

$$\begin{cases} c < -2 \\ c > s \\ c + s > 0 \end{cases} \quad (١٥)$$

$$\begin{cases} 2s + c > 4 \\ 2s - c \geq 2 \\ s - 1 \leq 0 \end{cases} \quad (١٤)$$

$$\begin{cases} c - s < 1 \\ s + 2c \geq 12 \\ c \leq 3 \end{cases} \quad (١٣)$$

## البرمجة الخطية

### Linear Programming

#### المجموعة ١ تمارين أساسية

(١) أوجد بيانيًّا مجموعة حل المتباينات التالية:

$$s \leq 0, c \leq 0, s + c \geq 5, s + 2c \geq 8$$

ثم أوجد من مجموعة الحل قيم  $(s, c)$  التي تجعل دالة الهدف  $h$  أكبر ما يمكن، حيث  $h = s + 3c$ .



(٢) أوجد بيانيًّا مجموعة حل المتباينات التالية:

$$s \leq 0, c \leq 0, 3s + 2c \geq 6, 2s + 3c \geq 6$$

ثم أوجد من مجموعة الحل قيم  $(s, c)$  التي تجعل دالة الهدف  $h$  أصغر ما يمكن ، حيث  $h = 3s + 4c$ .

في التمارين (٣-٤)، أوجد قيم  $(s, c)$  التي تجعل دالة الهدف  $h$  قيمة عظمى أو قيمة صغرى حيث:

$$(٤) \text{ دالة الهدف } h = 4s + c \quad (٣) \text{ دالة الهدف } h = 6s + 2c$$





## المجموعة ب تمارين تعزيزية

(١) أوجد بيانياً مجموعة حل المتباينات التالية:  
 $s \leq 0, c \leq 0, 4s + 2c \geq 4, 2s + 4c \geq 4$   
 ثم أوجد من مجموعة الحل قيم  $(s, c)$  التي تجعل دالة الهدف  $h$  أكبر ما يمكن، حيث  $h = 3s + c$ .

(٢) أوجد بيانياً مجموعة حل المتباينات التالية:  
 $s \leq 0, c \leq 0, s + c \geq 5, 4s + c \geq 8$   
 ثم أوجد من مجموعة الحل قيم  $(s, c)$  التي تجعل دالة الهدف  $h$  أصغر ما يمكن حيث  $h = s + 3c$ .

في التمرينين (٣-٤)، أوجد قيم  $(s, c)$  التي تجعل دالة الهدف  $h$  قيمة عظمى أو قيمة صغرى حيث:

$$(٤) \text{ دالة الهدف } h = s + 9c \quad (٣) \text{ دالة الهدف } h = s + c$$



## تمارين إثرائية

في التمارين (١ ، ٢)، ظلّل المنطقة التي يحددها كل نظام مما يلي:

$$\left\{ \begin{array}{l} s + c \geq 1 \\ s \leq 0 , c \leq 0 \\ s > 3 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} s - c \geq 2 \\ c + s \geq 3 \\ c < -4 \\ s < -1 \end{array} \right.$$

(٣) يحضر بائع يوميًّا نوعين من الكعك المحلي. لتحضير كعكة من النوع الأول يلزمها ٤ أكواب من الحليب، و٣ أكواب من الطحين ولتحضير كعكة من النوع الثاني يلزمها كوبين من الحليب و٣ أكواب من الطحين. إذا كان لديه ١٦ كوبًا من الحليب و١٢ كوبًا من الطحين ويربح ٣ دنانير من مبيع كعكة من النوع الأول ودينارين من مبيع كعكة من النوع الثاني. فاكتتب نظام متباينات وحله لمعرفة عدد الكعكات التي عليه تحضيرها من كل نوع لتحقيق ربح أقصى. وما هو هذا الربح؟

## اختبار الوحدة الخامسة

### أسئلة مقالية

(١) أوجد حل المتباينتين ثم مثل مجموعه الحل على خط الأعداد الحقيقية.

$$(أ) 3 - س \leq 7$$

$$(ب) 10 - 3س > 2 + 5$$

(٢) بين أيّاً من النقاط التالية: ١(٢،١)، ب(١٣،٠)، ج(٤،٣) تحقق المتباينة: س - ٢ ص ≤ ١٣.

(٣) مثل بيانياً منطقة الحل للمتباينة: س + ٥ ص > ٠

(٤) مثل بيانياً منطقة الحل المشترك للمتباينتين:

$$س + ص < 4 , 3س - ص \geq 9$$

(٥) مثل بيانياً منطقة الحل المشترك للمتباينات التالية:

$$\left. \begin{array}{l} س \leq ص \\ س + 3ص \geq 9 \\ س - 1 > 2 \end{array} \right\}$$

(٦) أوجد بيانياً مجموعه حل المتباينات التالية:

$$س \leq 0 , ص \leq 0 , 4س + ص \geq 10 , 2س + ص \geq 8$$

ثم أوجد من مجموعه حل قيم (س، ص) التي تجعل دالة الهدف هـ أصغر ما يمكن وأكبر ما يمكن، حيث هـ = س + ٣ ص.

(٧) أوجد بيانياً مجموعه حل المتباينات التالية:

$$س \leq 0 , ص \leq 0 , 4س + 3ص \leq 30 , س + 3ص \leq 21$$


ثم أوجد من مجموعه حل قيم (س، ص) التي تجعل دالة الهدف هـ أصغر ما يمكن، حيث هـ = س + ٨ ص.

## تمارين موضوعية

في التمارين (١-٥)، عبارات ظلل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة، (ب) إذا كانت العبارة خاطئة.

(ب)

(أ)




(١) المنطقة المظللة في الشكل تمثل الحل

المشترك للمتباينتين:

$$\left. \begin{array}{l} 2s + c < 2 \\ s - c < 3 \end{array} \right\}$$

(ب)

(أ)




(٢) المنطقة المظللة في الشكل تمثل الحل

المشترك للمتباينات:

$$\left. \begin{array}{l} c < s \\ c > s + 2 \\ c \leq 0 \end{array} \right\}$$

(ب)

(أ)




(٣) المنطقة المظللة في الشكل تمثل الحل

المشترك للمتباينتين:

$$\left. \begin{array}{l} c \leq 2 \\ c \leq s \end{array} \right\}$$

(ب)

(أ)




(٤) قيم س، ص التي تجعل دالة الهدف  $h = 5s + 10c$

أصغر ما يمكن هي (٣، ٢)

(ب)

(أ)




(٥) المنطقة المظللة في الشكل تمثل الحل

المشترك للمتباينات:

$$\left. \begin{array}{l} 2s + c \leq 40 \\ s + 2c \leq 50 \\ s \leq 0, c \leq 0 \end{array} \right\}$$

في التمارين (٦-١١)، لكل تمرن أربعة اختيارات، واحد فقط منها صحيح. ظلل رمز الدائرة الدال على الاختيار الصحيح.

(٦) المنطقة المظللة من الشكل تمثل الحل المشترك للمتباينتين




(ب)  $\left. \begin{array}{l} c \leq -2s + 2 \\ c \geq s - 4 \end{array} \right\}$

(أ)  $\left. \begin{array}{l} c > -2s + 2 \\ c \leq s - 4 \end{array} \right\}$


(د)  $\left. \begin{array}{l} c \geq -2s + 2 \\ c < s - 4 \end{array} \right\}$

(ج)  $\left. \begin{array}{l} c \leq -2s + 2 \\ c > s - 4 \end{array} \right\}$


(٧) الرسم البياني الذي يمثل نظام المتباينات  $\left\{ \begin{array}{l} x \leq -2s + 2 \\ x \geq 3s \end{array} \right.$  هو:




ب



أ



د



ج

(٨) أي زوج من النقاط التالية هو ضمن مجموعة حل النظام التالي:

$$\left\{ \begin{array}{l} x > 5 - s \\ x \leq 7 - 3s \end{array} \right.$$

د (٦،١)

ج (٤،٤)

ب (٣،٢)

أ (١،٥)

(٩) إذا كانت رؤوس منطقة الحل هي (٠،٠)، (٣،٠)، ( $\frac{7}{2}$ ،  $\frac{3}{2}$ )، ( $\frac{7}{2}$ ، ٣)، (٠،٣)، (٠،٠) لدالة الهدف  $h = 6s + 8x$

فإن القيمة العظمى لها هي:

ب ٢٤

أ ٣٧

د ٣٠

ج ٤٧

(١٠) في نظام المتبادرات تكون دالة الهدف  $h = 2s + c$  أصغر ما يمكن عند:

$$\left\{ \begin{array}{l} s + c \geq 8 \\ s + 2c \geq 14 \\ s \leq 0, c \leq 0 \end{array} \right.$$

أ (٠,٠)       ب (٧,٠)

ج (٦,٢)       د (٠,٨)

(١١) نظام المتبادرات الذي له الرؤوس التالية: (٥,٠), (٤,١), (٣,٠), (٠,٥) هو:

$$\left\{ \begin{array}{l} s + c \geq 5 \\ s + 2c \geq 6 \\ s \leq 0, c \leq 0 \end{array} \right. \quad \text{ب}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} s + c \leq 5 \\ 2s + c \leq 6 \\ s \leq 0, c \leq 0 \end{array} \right. \quad \text{أ}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} s + c \geq 5 \\ 2s + c \geq 6 \\ s \leq 0, c \leq 0 \end{array} \right. \quad \text{د}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} s + c \geq 5 \\ 2s + c \geq 6 \\ s \leq 0, c \leq 0 \end{array} \right. \quad \text{ج}$$

معلّمات  
Kuwaitteacher.Com

معلّمات  
Kuwaitteacher.Com

معلّمات  
Kuwaitteacher.Com