



@MOH82FALAH

أ / محمد نوري الفلاح

٢٠٢٣ - ٢٠٢٢

الفصل الدراسي الثاني

امتحانات سابقة

الفترة الثانية

الصف الثاني عشر أدبي

معلمة
صفوة
KuwaitTeacher.Com

القسم الأول – أسئلة المقال

أجب عن الاسئلة التالية موضحاً خطوات الحل في كل منها

السؤال الأول : (٦ درجات)

الجدول التالي يبين دالة التوزيع الاحتمالي لمتغير عشوائي متقطع س

س	١	٢	٣	٤
د(س)	٠,١	٠,٦	٠,٢	٠,١

أوجد : (أ) التوقع (μ)(ب) التباين (σ^2)(ج) الانحراف المعياري (σ)

السؤال الثاني: (٦ درجات)

الجدول التالي يبين دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي المتقطع س

س	-١	٠	١	٢
د(س)	٠,١	٠,٢	٠,٤	٠,٣

أوجد :


ت (-١) ، ت (١) ، ت (١,٥) ، حيث ت دالة التوزيع التراكمي للمتغير العشوائي س

السؤال الثالث: (٩ درجات)

مثل بيانياً منطقة الحل المشترك للمتباينتين:

$$س + ص \geq ٤$$

$$٣س + ص \leq ٦$$



القسم الثاني : البنود الموضوعية

أولاً: في البنود من (١) إلى (٣) عبارات ظلل في ورقة الإجابة ① إذا كانت العبارة صحيحة
② إذا كانت العبارة خاطئة

(١) من تجربة إلقاء حجر نرد متمايزين معاً مرة واحدة فإن احتمال ظهور عددين مجموعهما ٨ هو $\frac{1}{12}$

(٢) إذا كانت s ، v ، e أعداد حقيقية ، $e > 0$ وكان $s > v$ فإن $s < v$

(٣) مجموعة حل المتباينة: $2 + 7 \leq s \leq 4$ هي $[\frac{2}{7}, \infty)$

ثانياً : في البنود من (٤) إلى (٧) لكل بند أربع اختيارات واحدة فقط صحيحة ظلل في ورقة الإجابة الرمز الدال على الإجابة الصحيحة

(٤) النقطة التي لا تحقق المتباينة $2s - 3v \geq 1$ هي

① (٠، ٠) ② (١، ١) ③ (١، ١-) ④ (١، ١-)

(٥) ينتج مصنع سيارات ٢٠٠ سيارة في الشهر ، إذا كانت نسبة إنتاج السيارات المعيبة ٠,٢ ،

فإن التوقع لعدد السيارات المعيبة المنتجة في الشهر يساوي


① ٤ ② ٢٠ ③ ٤٠ ④ ٢

(٦) المتباينة التي خط حدودها متقطع هي

① $s + v < 0$ ② $s + 2v \leq 0$

③ $s - v \geq 0$ ④ $3s + 5v \geq 3$

(٧) المنطقة المظللة من الشكل تمثل الحل المشترك للمتباينتين:



$$\left. \begin{array}{l} \text{ب} \\ \text{ص} - 2 \leq \text{ص} + 2 \\ \text{ص} \geq \text{ص} - 4 \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{أ} \\ \text{ص} - 2 > \text{ص} + 2 \\ \text{ص} \leq \text{ص} - 4 \end{array} \right\}$$


$$\left. \begin{array}{l} \text{د} \\ \text{ص} - 2 \geq \text{ص} + 2 \\ \text{ص} < \text{ص} - 4 \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{ج} \\ \text{ص} - 2 \leq \text{ص} + 2 \\ \text{ص} > \text{ص} - 4 \end{array} \right\}$$

"انتهت الأسئلة"

ورقة إجابة البنود الموضوعية

الإجابة				رقم السؤال
				(١)
				(٢)
د	ج	ب	أ	(٣)
د	ج	ب	أ	(٤)
د	ج	ب	أ	(٥)
د	ج	ب	أ	(٦)
د	ج	ب	أ	(٧)



لكل بند درجة واحدة فقط

القسم الأول – أسئلة المقالاجب عن جميع أسئلة المقال موضحا خطوات في كل منهاالسؤال الأول : (١٤ درجة)

(أ) يبين الجدول التالي دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير

(٧ درجات)

العشوائي المتقطع س.

س	١	٢	٣	٤	٥
د (س)	٠,٢	٠,١	٠,٣	٠,١	٠,٣

أوجد : (١) التوقع (μ)(٢) التباين σ^2 (٣) الانحراف المعياري (σ)الحل:

تابع السؤال الأول :

(ب) الجدول التالي يبين دالة التوزيع الاحتمالي د للمتغير العشوائي المتقطع س (٧ درجات)

س	٣	٤	٥
د (س)	٠,٥	٠,٣	٠,٢

أوجد : ت (٣) ، ت (٤,٥) ، ت (٥)
حيث ت دالة التوزيع التراكمي للمتغير العشوائي س

الحل:

السؤال الثاني: (١٤ درجة)

(٧ درجات)

(أ) ينتج مصنع سيارات ٢٠٠ سيارة يوميا ، إذا كانت نسبة إنتاج السيارات المعيبة ٠,٠١ ، فأوجد التوقع و التباين و الانحراف المعياري لعدد السيارات المعيبة في يوم واحد .

الحل:

تابع السؤال الثاني:

(٧ درجات)

(ب) لتكن الدالة د :



$$\left. \begin{array}{l} \text{عندما } 2 \leq s \leq 2 \\ \text{في ما عدا ذلك} \end{array} \right\} d(s) = \frac{1}{4}$$

(١) اثبت أن الدالة هي دالة كثافة احتمال

(٢) أوجد ل (١- > س ≥ ٢)

(٣) أوجد التوقع و التباين للدالة د

الحل:



السؤال الثالث: (١٤ درجة)


(۱۱ درجات)

(أ) مثل بيانيا منطقة الحل المشترك للمتباينتين :

$$ص \geq ۲ - س + ۲$$

ص < س - ۴

الحل:



تابع السؤال الثالث:

(٣ درجات)

(ب) في تجربة إلقاء قطعة نقود متماثلة مرتين متتاليتين ،
ليكن المتغير العشوائي س_١ يعبر عن " عدد الكتابات "

فأوجد ما يلي :

(١) فضاء العينة

(٢) مدى المتغير العشوائي س_١

القسم الثاني : البنود الموضوعية

أولاً: في البنود من (١) إلى (٢) عبارات ظل في ورقة الإجابة ① إذا كانت العبارة صحيحة
② إذا كانت العبارة خاطئة .

(١) دالة التوزيع التراكمي $F(x)$ للمتغير العشوائي المتقطع عند القيمة x هي احتمال وقوع المتغير العشوائي S بحيث يكون $S \leq x$

(٢) من خواص التوزيع الطبيعي أنه متماثل حول μ

ثانياً: في البنود من (٣) إلى (٧) لكل بند أربع اختيارات واحدة فقط صحيحة ظلل في ورقة الإجابة الرمز الدال على الإجابة الصحيحة .

(٣) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي $P(S)$ للمتغير العشوائي S هي :

س	-١	٠	١	٢
$P(S)$	٠,٢	ك	٠,٤	٠,٢

فإن قيمة K تساوي :

① ٠,٣ ② ٠,٢ ③ صفر ④ ٠,٤

(٤) إذا كانت S متغيراً عشوائياً يأخذ القيم ٢، ٣، ٤ وكان $P(S=2) = 0,2$

، $P(S=3) = 0,7$ فإن $P(S=4)$ يساوي :

① ٠,٣ ② ٠,٢ ③ ٠,٧ ④ ليس أي مما سبق

(٥) المتباينة التي خط حدودها متقطع هي :

- ① س - ٣ ص $\geq$ ٢
 ② س + ٣ ص $\geq$ ٠
 ③ س - ٣ ص $<$ ٢
 ④ س - ٣ ص $\leq$ ٢


(٦) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي د للمتغير العشوائي س هي :

س	١	٢	٣	٤	٥
د (س)	٠,٢٤	٠,٣	٠,٢٦	٠,١٥	٠,٠٥

فإن ت (٢) =

- ① ٠,٢٤ ② ٠,٥٤ ③ ٠,٣ ④ ٠,٢٦

(٧) المنطقة المظلة في الشكل المقابل تمثل منطقة الحل المتباينة :



① ٣ س + ص $\leq$ ٦

② ٣ س + ص $<$ ٦

③ ٣ س + ص $\geq$ ٦

④ ٣ س + ص $>$ ٦

"انتهت الأسئلة"

القسم الأول : الأسئلة المقالية (أجب عن الأسئلة التالية موضحا خطوات الحل في كل منها)

السؤال الأول : (١٤ درجة)

(أ) الجدول التالي يبين دالة التوزيع الاحتمالي د للمتغير العشوائي المتقطع سـ:

س	١	٢	٣	٤	٥
د(س)	٠,٥	٠,١	٠,٢	٠,١٥	٠,٠٥

أوجد :

(١) التوقع (μ)

(٢) التباين (σ^2)

(٣) الانحراف المعياري (σ)

الحل :

امتحان (الرياضيات) الفترة الدراسية الثانية للصف الثاني عشر أدبي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ م
تابع السؤال الأول :

(ب) الجدول التالي يبين بعض قيم دالة التوزيع التراكمي T للمتغير العشوائي المنقطع X :

س	١ -	٣	٥	٧
$T(X)$	٠,١	٠,٤٥	٠,٧	١

أوجد :

(١) $P(3 < X \leq 7)$

(٢) $P(X < 5)$

الحل :

_____ امتحان (الرياضيات) الفترة الدراسية الثانية للصف الثاني عشر أدبي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ م _____

السؤال الثاني : (١٤ درجة)

(أ) ينتج مصنع الألبان ٢٥٠٠ علبة يوميا فإذا كانت نسبة انتاج العلب الفاسدة ٠,٠٥ أوجد التوقع والانحراف المعياري لعدد العلب الفاسدة في أحد الايام.

الحل:

امتحان (الرياضيات) الفترة الدراسية الثانية للصف الثاني عشر أدبي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ م

تابع السؤال الثاني :

(ب) اذا كان s متغيرا عشوائيا متصلا ودالة كثافة الاحتمال له هي :

$$D(s) = \begin{cases} \frac{1}{3} & : 2 \leq s \leq 5 \\ 0 & : \text{فيما عدا ذلك} \end{cases}$$

فاوجد :

$$(1) \text{ ل } (s \geq 4)$$

$$(2) \text{ ل } (3 \leq s \leq 4)$$

الحل :

_____ امتحان (الرياضيات) الفترة الدراسية الثانية للصف الثاني عشر أدبي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ م _____
السؤال الثالث : (١٤ درجة)

(أ) يمثل المتغير العشوائي X الزمن الذي يستغرقه أحد الطلاب للوصول الى المدرسة ويتبع التوزيع الطبيعي توقعه $\mu = 15$ وتباينه $\sigma^2 = 9$
فأوجد : ل ($12 < X < 15$) .

الحل:

_____ امتحان (الرياضيات) الفترة الدراسية الثانية للصف الثاني عشر أدبي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ م _____


تابع السؤال الثالث :

(ب) مثل بيانيا منطقة الحل المشترك للمتباينتين :

$$\left. \begin{array}{l} 2س + ص > ٢ \\ ص - س \leq -٤ \end{array} \right\}$$

الحل :

امتحان (الرياضيات) الفترة الدراسية الثانية للصف الثاني عشر أدبي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ م



امتحان (الرياضيات) الفترة الدراسية الثانية للصف الثاني عشر أدبي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ م

القسم الثاني: البنود الموضوعية : (١٤ درجة)

أولاً : في البنود (١ - ٢) عبارات لكل بند ظلل في ورقة الإجابة
(أ) إذا كانت العبارة صحيحة ، (ب) إذا كانت العبارة خاطئة

(١) التوزيع التالي يمثل دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي سـ

س	١	٢	٣
د(س)	٠,٤	٠,٥	٠,١

(٢) عند القاء قطعة نقود متماثلة ثلاث مرات على التوالي فإن $n(F) = 12$.

ثانياً: في البنود (٣ - ٧) لكل بند أربعة اختيارات واحد فقط منها صحيح - اختر الإجابة الصحيحة ثم ظلل في ورقة الإجابة دائرة الرمز الدال عليها .

(٣) إذا كان التوزيع التالي يمثل دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي المتقطع سـ:

س	٠	١	٢	٣
د(س)	٠,١	٠,٢	٠,٣	٠,٤

فان $t(2,5) =$

- ☐ أ ٠,٥
 ☐ ب ٠,٣
 ☐ ج ٠,٦
 ☐ د ١

(٤) إذا كانت الدالة د هي دالة كثافة احتمال تتبع التوزيع الاحتمالي المنتظم معرفة كالتالي :

$$D(s) = \begin{cases} \frac{1}{4} : 2- \leq s \leq 2 \\ \text{صفر} : \text{فيما عدا ذلك} \end{cases}$$

فان التوقع $\mu =$

- ☐ أ $1\frac{1}{3}$
 ☐ ب صفر
 ☐ ج $\frac{1}{4}$
 ☐ د ١

(٥) إذا كانت رؤوس منطقة الحل هي $(0,2)$ ، $(1,3)$ ، $(4,0)$ ، $(0,0)$ لدالة الهدف

هـ = ٥ س + ٣ ص فان القيمة العظمى لها هي :

- ☐ أ ١٠
 ☐ ب ١٢
 ☐ ج ١٤
 ☐ د صفر


امتحان (الرياضيات) الفترة الدراسية الثانية للصف الثاني عشر أدبي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ م

(٦) اي زوج من النقاط التالية هو ضمن مجموعة حل النظام التالي :

$$\begin{cases} \text{ص} \geq ٥ - \text{س} \\ \text{ص} \leq ٧ - ٣\text{س} \end{cases}$$

- (١) (١، ٥-) (ب) (٤، ٤) (ج) (١، ١-) (د) (٠، ٢)

(٧) المنطقة المظللة في الشكل تمثل الحل المشترك للمتباينات:




- (١) $\begin{cases} \text{ص} < \text{س} \\ \text{ص} < \text{س} + ٢ \\ \text{ص} \leq ٠ \end{cases}$ (ب) $\begin{cases} \text{ص} \leq \text{س} \\ \text{ص} > \text{س} + ٢ \\ \text{ص} \leq ٠ \end{cases}$ (د) $\begin{cases} \text{ص} < \text{س} \\ \text{ص} > \text{س} + ٢ \\ \text{ص} \leq ٠ \end{cases}$ (ج) $\begin{cases} \text{ص} \leq \text{س} \\ \text{ص} \geq \text{س} + ٢ \\ \text{ص} \leq ٠ \end{cases}$

انتهت الأسئلة

جدول إجابة البنود الموضوعية

١	(أ)	(ب)	(ج)	(د)
٢	(أ)	(ب)	(ج)	(د)
٣	(أ)	(ب)	(ج)	(د)
٤	(أ)	(ب)	(ج)	(د)
٥	(أ)	(ب)	(ج)	(د)
٦	(أ)	(ب)	(ج)	(د)
٧	(أ)	(ب)	(ج)	(د)



المصحح:

المراجع:

المجال الدراسي : الرياضيات
الزمن : ساعتان وربع
عدد الصفحات (٩)

امتحان الدور الثاني (الفترة الدراسية الثانية)
للفيف الثاني عشر أدبي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ م

دولة الكويت
وزارة التربية
التوجيه الفني للرياضيات

القسم الأول : الأسئلة المقالية (أجب عن الأسئلة التالية موضحا خطوات الحل في كل منها)

السؤال الأول : (١٤ درجة)

(أ) عند القاء قطعة نقود متماثلة مرتين متتاليتين ، اذا كان المتغير العشوائي S يعبر عن " عدد الكتابات " فأوجد :

- (١) فضاء العينة (ف).
- (٢) مدى المتغير العشوائي S .
- (٣) دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي المتقطع S .
- (٤) التوقع μ للمتغير العشوائي S .

الحل :

تابع السؤال الأول :

(ب) الجدول التالي يبين بعض قيم دالة التوزيع التراكمي ت للمتغير العشوائي المتقطع سـ:

س	٢ -	٠	٢	٤
ت(س)	٠,١٥	٠,٣٠	٠,٧٥	١

أوجد :

(١) ل (٠ < س ≤ ٤)

(٢) ل (س < ٢)

الحل :

السؤال الثاني : (١٤ درجة)

(أ) عند القاء حجر نرد منتظم ٨ مرات متتالية.
أوجد احتمال ظهور العدد ٢ خمس مرات.

الحل:

تابع السؤال الثاني :

(ب) يمثل المتغير العشوائي X درجات الطلاب في مادة الرياضيات ، فإذا كان توزيع هذه الدرجات يتبع التوزيع الطبيعي الذي توقعه $\mu = 40$ وانحرافه المعياري $\sigma = 8$ فأوجد:
 $P(30 < X < 60)$

الحل :

السؤال الثالث : (١٤ درجة)

(أ) اذا كانت د تتبع التوزيع الاحتمالي المنتظم حيث

$$\left. \begin{array}{l} 0 \leq s \leq 3 \\ \frac{1}{3} : \end{array} \right\} = \text{د(س)}$$

صفر : فيما عدا ذلك

(١) أثبت ان الدالة د هي دالة كثافة احتمال.

(٢) اوجد ل (١ ≤ س ≤ ٢) .

(٣) اوجد التوقع والتباين.


الحل:

تابع السؤال الثالث :

(ب) مثل بيانيا منطقة الحل المشترك للمتباينتين :

$$\left. \begin{array}{l} \text{س} - 2\text{ص} < 2 \\ 2\text{س} + 3\text{ص} \geq 6 \end{array} \right\}$$

الحل :



القسم الثاني: البنود الموضوعية : (١٤ درجة)

أولاً : في البنود (١ - ٢) عبارات لكل بند ظلل في ورقة الإجابة (أ) إذا كانت العبارة صحيحة ، (ب) إذا كانت العبارة خاطئة

(١) في احد مصانع الإطارات نسبة الإطارات الغير صالحة للاستخدام ٠,٠٥ فإذا تم سحب ١٠٠ اطار عشوائيا فان التوقع لعدد الإطارات الغير صالحة للاستخدام هو ٥

(٢) نسبة الرطوبة خلال شهر هو متغير عشوائي متصل.

ثانياً: في البنود (٣ - ٧) لكل بند أربعة اختيارات واحد فقط منها صحيح - اختر الإجابة الصحيحة ثم ظلل في ورقة الإجابة دائرة الرمز الدال عليها .

(٣) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي S هي:

٣	٢	١	٠	S
٠,١	٠,٤	٠,٣	٠,٢	$D(S)$

فان $P(S=2)$ =

- (أ) ٠,٤ (ب) ٠,٥ (ج) ٠,٩ (د) ٠,٧

(٤) إذا كانت بعض قيم دالة التوزيع التراكمي للمتغير العشوائي S

٣	٢	١	٠	S
١	٠,٧	٠,٣	٠,١	$F(S)$

معطاة في الجدول المقابل:

فان $P(S=1)$ =

- (أ) ٠,١ (ب) ٠,٢ (ج) ٠,٤ (د) ١

(٥) أي من النقاط التالية تحقق المتباينة $S - 2 \leq 13$


- (أ) (٢, ١) (ب) (١٢, ٠) (ج) (٣, -٣) (د) (١٣, ٠٠)

(٦) في نظام المتباينات
$$\left. \begin{aligned} S + V &\geq 8 \\ S + 2V &\geq 14 \\ S &\leq 0, V < 0 \end{aligned} \right\}$$

الزوج المرتب الذي يجعل دالة الهدف $Z = 2S + V$ اصغر ما يمكن هو :

- (أ) (٧, ٠) (ب) (٠, ٨) (ج) (٠, ٠) (د) (٦, ٢)

(٧) المنطقة المظللة في الشكل تمثل الحل المشترك للمتباينتين:




- ١ $\left. \begin{array}{l} س + ص > ٢ \\ س - ص < ٣ \end{array} \right\}$
- ٢ $\left. \begin{array}{l} س + ص > ٢ \\ س - ص > ٣ \end{array} \right\}$
- ٣ $\left. \begin{array}{l} س + ص \geq ٢ \\ س - ص \geq ٣ \end{array} \right\}$
- ٤ $\left. \begin{array}{l} س + ص > ٢ \\ س - ص \geq ٣ \end{array} \right\}$

انتهت الأسئلة

١	(أ)	(ب)	(ج)	(د)
٢	(أ)	(ب)	(ج)	(د)
٣	(أ)	(ب)	(ج)	(د)
٤	(أ)	(ب)	(ج)	(د)
٥	(أ)	(ب)	(ج)	(د)
٦	(أ)	(ب)	(ج)	(د)
٧	(أ)	(ب)	(ج)	(د)

المصحح:

المراجع:



دولة الكويت


وزارة التربية

امتحان الفترة الدراسية الثانية للصف الثاني عشر ٢٠١٧ / ٢٠١٨ م

المجال : الرياضيات – القسم الأدبي

الزمن : ساعتان وخمسة عشرة دقيقة

عدد الصفحات : ٨



أولاً : (أسئلة المقال)
(أجب عن الأسئلة التالية موضحاً خطوات الحل في كل منها) :

السؤال الأول:-

- (أ) عند إلقاء قطعة نقود متماثلة مرتين متتاليتين، وبفرض أن المتغير العشوائي S يعبر عن «عدد الكتابات مطروحا منه عدد الصور» . أوجد :
- (١) فضاء العينة (ف)
- (٢) مدى المتغير العشوائي S .
- (٣) احتمال وقوع كل عنصر من عناصر مدى المتغير العشوائي S .
- (٤) دالة التوزيع الاحتمالي D للمتغير العشوائي S

الاجابة

امتحان الفترة الدراسية الثانية للصف الثاني عشر أدبي (الرياضيات) ٢٠١٧ / ٢٠١٨ م

تابع :السؤال الأول:-

(ب) يبين الجدول التالي دالة التوزيع الإحتمالي للمتغير العشوائي المتقطع س.

س	٢	٣	٤	٥
د(س)	٠,١	٠,٣	٠,٥	٠,١


أوجد : ١ (التوقع (μ)).

٢ (التباين (σ^2)).

٣ (الانحراف المعياري (σ)).

الاجابة

السؤال الثاني:-



(أ) يبين الجدول التالي بعض قيم دالة التوزيع التراكمي ت للمتغير العشوائي المتقطع سـ

س	١	٢	٣	٥
ت(س)	٠,١٥	٠,٢	٠,٦	١

أوجد : (١) ل $(٢ > س \geq ٥)$

(٢) ل $(س < ٣)$

الإجابة


امتحان الفترة الدراسية الثانية للصف الثاني عشر أدبي (الرياضيات) ٢٠١٧ / ٢٠١٨ م

تابع : السؤال الثاني:-

(ب) في تجربة إلقاء قطعة نقود متماثلة ١٠ مرات متتالية ، احسب احتمال ظهور صورة ٥ مرات .

الإجابة

السؤال الثالث:-



(أ) إذا كان s متغيراً عشوائياً متصلًا ودالة كثافة الاحتمال له هي:

$$\left. \begin{array}{l} \frac{1}{8} s : \text{عندما } 0 \leq s \leq 4 \\ \text{صفر} : \text{فيما عدا ذلك} \end{array} \right\} = (s)$$

أوجد:

(١) $P(0 \leq s \leq 4)$

(٢) $P(s > 2)$

(٣) $P(s = 1)$


الإجابة

امتحان الفترة الدراسية الثانية للصف الثاني عشر أدبي (الرياضيات) ٢٠١٧ / ٢٠١٨ م
تابع : السؤال الثالث :-

(ب) مثل بيانيا منطقة الحل المشترك للمتباينتين

$$3x + 2y \geq 6, \quad 2x - y \leq 3$$

الإجابة



امتحان الفترة الدراسية الثانية للصف الثاني عشر أدبي (الرياضيات) ٢٠١٧ / ٢٠١٨ م

ثانياً : (بنود الموضوعي)

أولاً : في البنود (١ - ٢) عبارات لكل بند ظلل في جدول الإجابة (أ) إذا كانت العبارة صحيحة،
(ب) إذا كانت العبارة خاطئة.

(١) التوقع (الوسط) لمتغير عشوائي يتبع التوزيع الاحتمالي المنتظم على [أ ، ب]
هو $\mu = \frac{أ + ب}{٢}$.

(٢) لدالة التوزيع التراكمي ت للمتغير العشوائي س يكون ت (أ) = ل (س ≥ أ)

ثانياً : في البنود (٣ - ٧) لكل بند أربعة اختيارات واحد فقط منها صحيح . اختر الإجابة الصحيحة
ثم ظلل في جدول الإجابة دائرة الرمز الدال عليها

س	٢-	١-	٠	١	٢
د(س)	٠,١٦	٠,٢٤	ك	٠,١٥	٠,٢

(٣) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي د للمتغير العشوائي س
معطاة في الجدول المقابل فإن قيمة ك =

أ) ٠,١٥ ب) ٠,٢٥ ج) ٠,٣٥ د) ٠,٥


(٤) إذا كان ق متغيراً عشوائياً يتبع التوزيع الطبيعي المعياري فإن ل (ق < أ) لا يساوي :

أ) ل (ق ≤ أ) ب) ١ - ل (ق > أ) ج) ل (ق ≥ أ) د) ١ - ل (ق ≥ أ)

(٥) أي زوج من النقاط التالية هو ضمن مجموعة حل النظام التالي

$$\begin{cases} ٢س - ص ≤ ٣ \\ ٢ص - س < ١ \end{cases}$$

أ) (١ - ، ١) ب) (٣ ، ٠) ج) (-٣ ، -٣) د) (٠ ، ١)



(٦) المنطقة المظللة من الشكل تمثل الحل المشترك للمتباينتين

أ) $\begin{cases} س + ص > ١ \\ س ≤ ٣ \end{cases}$ ب) $\begin{cases} س + ص ≤ ١ \\ س > ٣ \end{cases}$ ج) $\begin{cases} س + ص ≥ ١ \\ س < ٣ \end{cases}$ د) $\begin{cases} س + ص < ١ \\ س ≥ ٣ \end{cases}$

(٧) إذا كانت رؤوس منطقة الحل هي (٠ ، ٠) ، (٠ ، ٢) ، (٤ ، ٠) ، (٣ ، ١)
لدالة الهدف $ه = ٥س + ٣ص$ فإن القيمة العظمى لها مما يلي هي:

أ) صفر ب) ١٠ ج) ١٢ د) ١٤

انتهت الأسئلة

دولة الكويت


وزارة التربية

امتحان الدور الثاني (الفترة الدراسية الثانية) - الصف الثاني عشر ٢٠١٧/٢٠١٨ م

المجال : الرياضيات - القسم الأدبي

الزمن : ساعتان وخمسة عشرة دقيقة

عدد الصفحات : ٩



أولاً : (أسئلة المقال)

(أجب عن الأسئلة التالية موضحاً خطوات الحل في كل منها) :
السؤال الأول :-

(أ) الجدول التالي يبين دالة التوزيع الإحتمالي د لمتغير عشوائي متقطع سـ

س	١	٢	٣	٤	٥
د (س)	٠,٢	٠,١	٠,٣	٠,١	٠,٣

أوجد : (١) التوقع (μ)

(٢) التباين (σ^2)

(٣) الانحراف المعياري (σ)

الاجابة

(ب) في تجربة القاء قطعة نقود متماثلة خمس مرات متتالية ، إذا كان S متغير عشوائي يعبر عن عدد الصور.
أوجد:-

- (١) احتمال ظهور الصورة مرتين
- (٢) التوقع للمتغير العشوائي S
- (٣) التباين للمتغير العشوائي S

الإجابة

السؤال الثاني:-

(أ) الجدول التالي يبين بعض قيم دالة التوزيع التراكمي T للمتغير العشوائي المتقطع X

س	١	٢	٣	٤
ت (س)	٠,٢٥	٠,٤٠	٠,٦٥	١

أوجد : (١) $P(1 < X \leq 3)$

(٢) $P(X < 2)$

الإجابة


(ب) يمثل المتغير العشوائي x درجات الطلاب في أحد المواد الدراسية ، إذا كان توزيع الدرجات

يتبع التوزيع الطبيعي الذي وسطه $\mu = 50$ وانحرافه المعياري $\sigma = 10$

أوجد :

ل ($40 < x < 76$)

الإجابة



$$\left. \begin{array}{l} \text{(أ) لتكن الدالة د :} \\ \frac{1}{4} : 1 \leq s \leq 5 \\ \text{د(س) = } \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{صفر} : \text{فيما عدا ذلك} \end{array}$$

تتبع التوزيع الاحتمالي المنتظم

أوجد : (١) ل (٢) > س ≥ ٥

(٢) التباين

الاجابة

(ب) مثل بيانيا منطقة الحل المشترك للمتباينتين

ص ≥ س + ۱

[illegible]

أولاً : في البنود (١ - ٢) عبارات. لكل بند ظلل في جدول الاجابة

(أ) إذا كانت العبارة صحيحة ، (ب) إذا كانت العبارة خطأ

(١) لدالة التوزيع التراكمي T للمتغير العشوائي X يكون

$$T(p) = 1 - (1 - p)^n$$

(٢) عند القاء قطعة نقود متماثلة ثلاث مرات متتالية فإن $P(X=3) = \frac{1}{8}$

ثانياً : في البنود (٣ - ٧) لكل بند أربعة اختيارات واحد فقط منها صحيح . اختر الإجابة الصحيحة ثم ظلل في

جدول الإجابة دائرة الرمز الدال عليها

(٣) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي المتقطع X هي :

س	١	٢	٣	٤
د (س)	٠,١	٠,٤	ك	٠,٢

فإن ك =

- أ) ٠,٣ ب) ٠,٤ ج) ٠,١ د) ٠,٢

(٤) إذا كانت D هي دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي المتقطع X هي :

س	١	٢	٣	٤
د (س)	٠,٣	٠,٢	٠,٢	٠,٣


فإن $T(3) =$

- أ) ٠,٢ ب) ٠,٣ ج) ٠,٧ د) ٠,٤

(٥) في نظام المتباينات
$$\begin{cases} 0 \leq x, 0 \leq y \\ x + 2y \geq 14 \\ x + y \geq 8 \end{cases}$$

الزوج المرتب الذي يجعل دالة الهدف $Z = 2x + y$ أصغر ما يمكن مما يلي هو:

- أ) (٧, ٠) ب) (٠, ٠) ج) (٠, ٨) د) (٦, ٢)



(٦) المنطقة المظللة في الشكل
تمثل الحل المشترك للمتباينتين

- أ. $\begin{cases} ص \leq ٢ \\ ص > س \end{cases}$ ب. $\begin{cases} ص > ٢ \\ ص \geq س \end{cases}$ ج. $\begin{cases} ص \geq ٢ \\ ص \leq س \end{cases}$ د. $\begin{cases} ص \leq ٢ \\ ص \geq س \end{cases}$

(٧) أي زوج من النقاط التالية هو ضمن مجموعة حل النظام $\begin{cases} ص \geq س \\ ص - ٢ \geq س \end{cases}$

- أ. (١، ٢) ب. (٢، ١) ج. (١، -٢) د. (-٢، ١)

تمت الأسئلة

دولة الكويت


وزارة التربية

امتحان نهاية الفترة الدراسية الثانية للصف الثاني عشر ٢٠١٦/٢٠١٧ م

المجال : الرياضيات – القسم الأدبي

الزمن : ساعتان وخمسة عشرة دقيقة

عدد الصفحات : ٩



أولاً : (أسئلة المقال)

(أجب عن الأسئلة التالية موضحاً خطوات الحل في كل منها) :
السؤال الأول :-

(أ) الجدول التالي يبين دالة التوزيع الإحتمالي لمتغير عشوائي متقطع سـ

س	٢	٣	٤	٥
د (س)	٠,١	٠,٣	٠,٥	٠,١

أوجد : (١) التوقع (μ)

(٢) التباين (σ^2)

(٣) الانحراف المعياري (σ)

الاجابة

امتحان نهاية الفترة الدراسية الثانية للصف الثاني عشر أدبي (الرياضيات) ٢٠١٦ / ٢٠١٧ م

تابع :السؤال الأول:-

(ب) في تجربة القاء قطعة نقود متماثلة خمس مرات متتالية ،

أوجد احتمال ظهور صورة ثلاث مرات

الإجابة

(أ) الجدول التالي يبين بعض قيم دالة التوزيع التراكمي T للمتغير العشوائي المتقطع X

س	١	٢	٣	٥
ت (س)	٠,١٥	٠,٢	٠,٦	١

أوجد : (١) $P(2 < X \leq 3)$

(٢) $P(X < 3)$

الإجابة

امتحان نهاية الفترة الدراسية الثانية للصف الثاني عشر أدبي (الرياضيات) ٢٠١٦ / ٢٠١٧ م
تابع : السؤال الثاني:-

(ب) يمثل المتغير العشوائي S الزمن (بالدقائق) الذي يستغرقه أحد الطلاب للوصول إلى المدرسة ،
وهو متغير يتبع توزيع طبيعي توقعه ١٦ وتباينه ٤
احسب

ل (١٢ $\geq S \geq ٢٠$)

الإجابة

(أ) لتكن الدالة د :

$$\left. \begin{array}{l} \frac{1}{4} \\ \text{صفر} \end{array} \right\} = (س) = \begin{array}{l} ٢- \geq س \geq ٢ : \\ \text{فيما عدا ذلك} \end{array}$$

تتبع التوزيع الاحتمالي المنتظم

أوجد : (١) ل (١- > س ≥ ٢)

(٢) التوقع

الاجابة


امتحان نهاية الفترة الدراسية الثانية للصف الثاني عشر أدبي (الرياضيات) ٢٠١٦ / ٢٠١٧ م
تابع : السؤال الثالث:-

(ب) مثل بيانيا منطقة الحل المشترك للمتباينتين

$$س - ص \leq ٣$$

$$ص \leq - س + ١$$

الاجابة



امتحان نهاية الفترة الدراسية الثانية للصف الثاني عشر أدبي (الرياضيات) ٢٠١٦ / ٢٠١٧ م
ثانيا : (بنود الموضوعي)

أولاً : في البنود (١ - ٢) عبارات . لكل بند ظلل في جدول الاجابة

(أ) إذا كانت العبارة صحيحة ، (ب) إذا كانت العبارة خطأ

(١) لدالة التوزيع التراكمي T للمتغير العشوائي X يكون

$$T(p) = 1 - T(p) \quad (٢)$$

(٢) عند القاء قطعة نقود متماثلة ثلاث مرات متتالية فإن $P(X=3) = 3/8$

ثانيا : في البنود (٣ - ٧) لكل بند أربعة اختيارات واحد فقط منها صحيح . اختر الإجابة الصحيحة ثم ظلل في

جدول الإجابة دائرة الرمز الدال عليها

(٣) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي المتقطع X هي :

س	١-	٠	١	٢
د (س)	٠,٢	ك	٠,٤	٠,٢

فإن $P(X=0) =$

أ (٠,٣) ب (٠,٤) ج (صفر) د (٠,٢)

(٤) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي المتقطع X هي :

س	٠	١	٢	٣
د (س)	٠,٢	٠,٤	٠,١	٠,٣


فإن $P(X=2) =$

أ (٠,٢) ب (٠,٣) ج (٠,٧) د (٠,٤)

(٥) في نظام المتباينات
$$\begin{cases} 0 \leq x, 0 \leq y \\ x+2y \geq 4 \\ x+y \geq 3 \end{cases}$$

الزوج المرتب الذي يجعل دالة الهدف $Z = 5x + 4y$ أصغر ما يمكن مما يلي هو :

أ (٠,٠) ب (٣,٠) ج (٠,٤) د (١,٢)



(٧) أي زوج من النقاط التالية هو ضمن مجموعة حل النظام $\begin{cases} ص \leq س \\ ص \geq س + ٢ \end{cases}$


- أ (١، ٢) ب (٢، ١) ج (١، ٢-) د (٢، ١-)

تمت الأسئلة

دولة الكويت
وزارة التربية
امتحان الدور الثاني (الفترة الدراسية الثانية) للصف الثاني عشر ٢٠١٧/٢٠١٦ م
المجال : الرياضيات – القسم الأدبي

الزمن : ساعتان وخمسة عشرة دقيقة

عدد الصفحات : ٩



أولاً : (أسئلة المقال)

(أجب عن الأسئلة التالية موضحاً خطوات الحل في كل منها) :
السؤال الأول:-

(أ) عند إلقاء قطعة نقود متماثلة مرتين متتاليتين، إذا كان المتغير العشوائي سـ

يعبر عن " عدد الصور مطروحة منه عدد الكتابات " فأوجد ما يلي :

(أ) فضاء العينة ف

(ب) مدى المتغير العشوائي سـ

٧ درجات

(ج) احتمال كل عنصر من عناصر مدى المتغير العشوائي سـ

(د) دالة التوزيع الاحتمالي د للمتغير العشوائي سـ

الإجابة

(ب) الجدول التالي يبين دالة التوزيع الاحتمالي لمتغير عشوائي متقطع سـ

س	١	٢	٣	٤
د (س)	٠,١	٠,٦	٠,٢	٠,١

أوجد :


(أ) التوقع (μ)

(ب) التباين (σ^2)

(جـ) الانحراف المعياري (σ)

٧ درجات

الإجابة



(أ) في تجربة القاء قطعة نقود متماثلة ١٠ مرات

احسب احتمال ظهور كتابة ٤ مرات .

٧ درجات

الإجابة

تابع امتحان الرياضيات - الصف الثاني عشر الأدبي (الدور الثاني - الفترة الدراسية الثانية) 2016 / 2017

تابع : السؤال الثاني:-

(ب) إذا كان s متغيراً عشوائياً متصلاً ، دالة كثافة الاحتمال له هي


$$\frac{1}{4} : 0 \leq s \leq 4$$

د (س) = } صفر : فيما عدا ذلك

أوجد :

(أ) ل (س ≥ 1) (ب) ل ($2 \leq s \leq 4$) (ج) ل (س = 2)

الإجابة



(أ) يمثل المتغير العشوائي X درجات الطلاب في إحدى المواد الدراسية إذا كان توزيع درجاته يتبع التوزيع الطبيعي الذي وسطه $\mu = 50$ وانحرافه المعياري $\sigma = 10$

فأوجد :

٧ درجات

ل ($40 < X < 70$)

الإجابة

تابع امتحان الرياضيات - الصف الثاني عشر الأدبي (الدور الثاني - الفترة الدراسية الثانية) 2016 / 2017
تابع : السؤال الثالث :-


(ب) مثل بيانيا منطقة الحل المشترك للمتباينتين

٧ درجات

ص - س < ٢

س + ص ≥ ١

الإجابة



أولاً : في البنود (١ - ٢) عبارات. لكل بند ظلل في جدول الإجابة

(أ) إذا كانت العبارة صحيحة ، (ب) إذا كانت العبارة خطأ

(١) لدالة توزيع تراكمي ت للمتغير العشوائي س يكون :

$$ل (أ > س \geq ب) = ت (ب) - ت (أ)$$

(٢) نسبة الرطوبة خلال شهر هو متغير عشوائي متصل .

ثانيا : في البنود (٣ - ٧) لكل بند أربعة اختيارات واحد فقط منها صحيح . اختر الإجابة

الصحيحة ثم ظلل في جدول الإجابة دائرة الرمز الدال عليها

(٣) إذا كانت دالة التوزيع الإحتمالي د للمتغير العشوائي س هي :

فإن قيمة ك هي :

س	٢-	١	٢	٣
ص	٠,٣	٠,١	ك	٠,٢

(أ) صفر (ب) ٠,٢ (ج) ٠,٣ (د) ٠,٤

(٤) ينتج مصنع سيارات ١٠٠ سيارة في الشهر . إذا كانت نسبة السيارات المعيبة ٠,٠٢ فإن التوقع


لعدد السيارات المعيبة المنتجة في الشهر يساوي :

(أ) ٤ (ب) ٢٠ (ج) ٢ (د) ٤٠

(٥) أي زوج من النقاط التالية هو ضمن حل النظام التالي :

$$\begin{cases} س + ٢ص \geq ٤ \\ س + ص \leq ١- \end{cases}$$

(أ) (١ ، ٥-) (ب) (٣ ، ٠) (ج) (١ ، ١) (د) (٠ ، ٣-)



(٦) المنطقة المظللة من الشكل تمثل الحل المشترك للمتباينتين :

$$\left. \begin{array}{l} \text{ص} \geq 2 - \text{س} \\ \text{ص} < 4 - \text{س} \end{array} \right\} \text{ (ب)}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{ص} > 2 - \text{س} \\ \text{ص} \leq 4 - \text{س} \end{array} \right\} \text{ (أ)}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{ص} \leq 2 - \text{س} \\ \text{ص} \geq 4 - \text{س} \end{array} \right\} \text{ (د)}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{ص} \leq 2 - \text{س} \\ \text{ص} > 4 - \text{س} \end{array} \right\} \text{ (ج)}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{س} + \text{ص} \geq 8 \\ \text{س} + 2\text{ص} \geq 14 \\ \text{س} \leq 0, \text{ص} \leq 0 \end{array} \right\} \text{ (٧) في نظام المتباينات}$$

الزوج المرتب الذي يجعل دالة الهدف $z = 2\text{س} + \text{ص}$ أصغر ما يمكن مما يلي عند :

(أ) (٠، ٠) (ب) (٧، ٠) (ج) (٦، ٢) (د) (٠، ٨)

انتهت الأسئلة


دولة الكويت

وزارة التربية

امتحان نهاية الفترة الدراسية الرابعة للصف الثاني عشر ٢٠١٥ / ٢٠١٦ م

المجال الدراسي : الرياضيات - القسم الأدبي

عدد الصفحات : ٩ الزمن : ساعتان وخمسة عشرة دقيقة



القسم الأول : أسئلة المقال أجب عن الأسئلة التالية (موضحاً خطوات الحل في كل منها)

السؤال الأول :

١) الجدول التالي يبين دالة التوزيع الاحتمالي لمتغير عشوائي متقطع س

س	٠	١	٢
د(س)	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

٥ درجات

أوجد : (١) التوقع (μ)

(٢) التباين (σ^2)


الحل :

تابع : السؤال الأول :

- (ب) في تجربة إلقاء قطعة نقود معدنية متماثلة مرتين متتاليتين وملاحظة الوجه العلوي، إذا كان المتغير العشوائي S الذي يمثل عدد مرات ظهور الصورة (ص).
أوجد: (١) فضاء العينة (ف)
(٢) مدى المتغير العشوائي S
(٣) احتمال وقوع كل عنصر من عناصر فضاء العينة (ف)
(٤) دالة التوزيع الاحتمالي D للمتغير العشوائي S

٧ درجات

الحل :



السؤال الثاني :

أ) الجدول التالي يبين بعض قيم دالة التوزيع التراكمي T للمتغير العشوائي

المتقطع s

s	$1-$	3	5	7
$T(s)$	$0,1$	$0,45$	$0,7$	1

أوجد :

أ) ل $(1- > s \geq 0)$

ب) ل $(s < 3)$

٥ درجات

الحل :

تابع : السؤال الثاني :

(ب) يمثل المتغير العشوائي S درجات الطلاب في إحدى المواد الدراسية، إذا


كان توزيع درجاته يتبع التوزيع الطبيعي الذي وسطه $\mu = 50$ و تباينه $\sigma^2 = 100$

أوجد ل (٤٠ > S > ٦٠)

الحل :

٥ درجات

السؤال الثالث :




أ إذا كان s متغيراً عشوائياً متصلاً ودالة كثافة الاحتمال له هي:

$$d(s) = \left. \begin{array}{l} \frac{1}{2} \\ \text{صفر} \end{array} \right\} : \begin{array}{l} 2 \leq s \leq 4 \\ \text{في ما عدا ذلك.} \end{array}$$

٣ درجات

أوجد ل ($2 \leq s \leq 4$)

الحل :




تابع : السؤال الثالث :

٧ درجات

ب) مثل بيانياً منطقة الحل المشترك للمتباينتين:

$$ص < س + ٢ , ص \geq -١ - س$$

الحل:



٨ درجات

القسم الثاني البنود الموضوعية (لكل بند درجة واحدة)

في البنود من (١ - ٣) عبارات لكل بند في ورقة الإجابة ظلل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة وظلل (ب) إذا كانت العبارة خاطئة

(١) دالة التوزيع التراكمي للمتغير العشوائي المتقطع عند القيمة أ هي احتمال وقوع المتغير العشوائي س بحيث يكون س أصغر من أو يساوي أ

(٢) المساحة تحت منحنى التوزيع الطبيعي تساوي الواحد

(٣) إذا كانت رؤوس منطقة الحل هي (٠، ٠)، (٠، ٣)، (٣، ٠)، (٣، ٠) لدالة الهدف $ه = ٦س + ٨ص$ فإن القيمة العظمى لها هي ٣٠

في البنود من (٤ - ٨) لكل بند أربعة اختيارات واحد فقط منها صحيح - اختر الإجابة الصحيحة ثم ظلل في ورقة الإجابة دائرة الرمز الدال عليها

(٤) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي س هي :

س	١ -	٠	١
د(س)	٠,٢	٠,٦	ك

فإن قيمة ك تساوي :

- (أ) ٠,٣ (ب) ٠,٤ (ج) صفر (د) ٠,٢

(٥) في تجربة رمي قطعة نقود منتظمة مرتين متتاليتين ، احتمال ظهور كتابة واحدة على الأقل هو :

- (أ) $\frac{1}{4}$ (ب) $\frac{1}{2}$ (ج) $\frac{3}{4}$ (د) ١

(٦) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي س هي

س	٠	١	٢	٣
د(س)	٠,٢	٠,٤	٠,١	٠,٣

فإن ت (١,٥) =

- (أ) ٠,٤ (ب) ٠,٢ (ج) صفر (د) ٠,٦

(٧) إذا كانت D هي دالة تتبع التوزيع الاحتمالي المنتظم حيث $D(s) = \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{4} : 1 \leq s \leq 5 \\ \text{صفر : فيما عدا ذلك} \end{array} \right.$

فإن التوقع يساوي:

د (١) صفر

ح (٢) ١

ب (٣) ٢

أ (٤) ٣

(٨) أي زوج من النقاط التالية هو ضمن مجموعة حل النظام التالي $\left\{ \begin{array}{l} 1 - s < v \\ 3 - v \leq s \end{array} \right.$

د (١، ٦)

ح (٤، ٤)

ب (٢، ٣)

أ (٥، ١)

انتهت الاسئلة ،،،

قوانين الاحصاء

التوقع $(\mu) = \sum s_r d(s_r)$

أي ان $\mu = s_1 d(s_1) + s_2 d(s_2) + s_3 d(s_3) + \dots$

التباين $(\sigma^2) = \sum s_r^2 d(s_r) - \mu^2$

الانحراف المعياري $(\sigma) = \sqrt{\text{التباين}}$

ت $(p) = L (s \geq p)$

ل $(s > p \geq b) = \text{ت}(b) - \text{ت}(p)$

ل $(s < p) = 1 - L (s \geq p)$

$1 - \text{ت}(p) =$

توزيع ذات الحدين:

ل $(s = s) = d(s) = {}^n C_s s^s (1-s)^{n-s}$ ، $n \geq s$

التوقع $\mu = n s$

التباين $\sigma^2 = n s (1-s)$

الانحراف المعياري $\sigma = \sqrt{n s (1-s)}$

$u = \frac{s - \mu}{\sigma}$ ، ل $(p > s \geq b) = L (u > u_1 \geq u_2)$

التوقع (الوسط) للتوزيع الاحتمالي المنتظم هو $\mu = \frac{a+b}{2}$

التباين للتوزيع الاحتمالي المنتظم هو $\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$

الاحتمالات في توزيع ذات الحدين: د(س)

ل												ن	س
٠,٩٥	٠,٩	٠,٨	٠,٧	٠,٦	٠,٥	٠,٤	٠,٣	٠,٢	٠,١	٠,٠٥	٠,٠	٠	١
٠,٠٠٢	٠,٠١٠	٠,٠٤٠	٠,٠٩٠	٠,١٦٠	٠,٢٥٠	٠,٣٦٠	٠,٤٩٠	٠,٦٤٠	٠,٨١٠	٠,٩٠٢	٠	٢	٠
٠,٠٩٥	٠,١٨٠	٠,٣٢٠	٠,٤٢٠	٠,٤٨٠	٠,٥٠٠	٠,٤٨٠	٠,٤٢٠	٠,٣٢٠	٠,١٨٠	٠,٠٩٥	٠	١	١
٠,٠٩٠٢	٠,٠٨١٠	٠,٠٦٤٠	٠,٠٤٩٠	٠,٠٣٦٠	٠,٠٢٥٠	٠,٠١٦٠	٠,٠٠٩٠	٠,٠٠٤٠	٠,٠٠١٠	٠,٠٠٠٢	٠	٢	٢
	٠,٠٠١	٠,٠٠٨	٠,٠٠٢٧	٠,٠٠٦٤	٠,٠٠١٢٥	٠,٠٠٢١٦	٠,٠٠٣٤٣	٠,٠٠٥١٢	٠,٠٠٧٢٩	٠,٠٠٨٥٧	٠	٣	٠
٠,٠٠٧	٠,٠٢٧	٠,٠٩٦	٠,٠١٨٩	٠,٠٢٨٨	٠,٠٣٧٥	٠,٠٤٣٢	٠,٠٤٤١	٠,٠٣٨٤	٠,٠٢٤٣	٠,٠١٣٥	٠	١	١
٠,١٣٥	٠,٢٤٣	٠,٣٨٤	٠,٤٤١	٠,٤٣٢	٠,٣٧٥	٠,٢٨٨	٠,١٨٩	٠,٠٩٦	٠,٠٢٧	٠,٠٠٧	٠	٢	٢
٠,٨٥٧	٠,٧٢٩	٠,٥١٢	٠,٣٤٣	٠,٢١٦	٠,١٢٥	٠,٠٦٤	٠,٠٢٧	٠,٠٠٨	٠,٠٠١		٠	٣	٣
		٠,٠٠٢	٠,٠٠٨	٠,٠٢٦	٠,٠٦٢	٠,١٣٠	٠,٢٤٠	٠,٤١٠	٠,٦٥٦	٠,٨١٥	٠	٤	٠
	٠,٠٠٤	٠,٠٢٦	٠,٠٧٦	٠,١٥٤	٠,٢٥٠	٠,٣٤٦	٠,٤١٢	٠,٤١٠	٠,٢٩٢	٠,١٧١	٠	١	١
٠,٠١٤	٠,٠٤٩	٠,١٥٤	٠,٢٦٥	٠,٣٤٦	٠,٣٧٥	٠,٣٤٦	٠,٢٦٥	٠,١٥٤	٠,٠٤٩	٠,٠١٤	٠	٢	٢
٠,١٧١	٠,٢٩٢	٠,٤١٠	٠,٤١٢	٠,٣٤٦	٠,٢٥٠	٠,١٥٤	٠,٠٧٦	٠,٠٢٦	٠,٠٠٤		٠	٣	٣
٠,٨١٥	٠,٦٥٦	٠,٤١٠	٠,٢٤٠	٠,١٣٠	٠,٠٦٢	٠,٠٢٦	٠,٠٠٨	٠,٠٠٢			٠	٤	٤
			٠,٠٠٢	٠,٠١٠	٠,٠٣١	٠,٠٧٨	٠,١٦٨	٠,٣٢٨	٠,٥٩٠	٠,٧٧٤	٠	٥	٠
		٠,٠٠٦	٠,٠٢٨	٠,٠٧٧	٠,١٥٦	٠,٢٥٩	٠,٣٦٠	٠,٤١٠	٠,٣٢٨	٠,٢٠٤	٠	١	١
٠,٠٠١	٠,٠٠٨	٠,٠٥١	٠,١٣٢	٠,٢٣٠	٠,٣١٢	٠,٣٤٦	٠,٣٠٩	٠,٢٠٥	٠,٠٧٣	٠,٠٢١	٠	٢	٢
٠,٠٢١	٠,٠٧٣	٠,٢٠٥	٠,٣٠٩	٠,٣٤٦	٠,٣١٢	٠,٢٣٠	٠,١٣٢	٠,٠٥١	٠,٠٠٨	٠,٠٠١	٠	٣	٣
٠,٢٠٤	٠,٣٢٨	٠,٤١٠	٠,٣٦٠	٠,٢٥٩	٠,١٥٦	٠,٠٧٧	٠,٠٢٨	٠,٠٠٦			٠	٤	٤
٠,٧٧٤	٠,٥٩٠	٠,٣٢٨	٠,١٦٨	٠,٠٧٨	٠,٠٣١	٠,٠١٠	٠,٠٠٢				٠	٥	٥
			٠,٠٠١	٠,٠٠٤	٠,٠١٦	٠,٠٤٧	٠,١١٨	٠,٢٦٢	٠,٥٣١	٠,٧٣٥	٠	٦	٠
		٠,٠٠٢	٠,٠١٠	٠,٠٣٧	٠,٠٩٤	٠,١٨٧	٠,٣٠٣	٠,٣٩٣	٠,٣٥٤	٠,٢٣٢	٠	١	١
	٠,٠٠١	٠,٠١٥	٠,٠٦٠	٠,١٣٨	٠,٢٣٤	٠,٣١١	٠,٣٢٤	٠,٢٤٦	٠,٠٩٨	٠,٠٣١	٠	٢	٢
٠,٠٠٢	٠,٠١٥	٠,٠٨٢	٠,١٨٥	٠,٢٧٦	٠,٣١٢	٠,٢٧٦	٠,١٨٥	٠,٠٨٢	٠,٠١٥	٠,٠٠٢	٠	٣	٣
٠,٠٣١	٠,٠٩٨	٠,٢٤٦	٠,٣٢٤	٠,٣١١	٠,٢٣٤	٠,١٣٨	٠,٠٦٠	٠,٠١٥	٠,٠٠١		٠	٤	٤
٠,٢٣٢	٠,٣٥٤	٠,٣٩٣	٠,٣٠٣	٠,١٨٧	٠,٠٩٤	٠,٠٣٧	٠,٠١٠	٠,٠٠٢			٠	٥	٥
٠,٧٣٥	٠,٥٣١	٠,٢٦٢	٠,١١٨	٠,٠٤٧	٠,٠١٦	٠,٠٠٤	٠,٠٠١				٠	٦	٦
				٠,٠٠٢	٠,٠٠٨	٠,٠٢٨	٠,٠٨٢	٠,٢١٠	٠,٤٧٨	٠,٦٩٨	٠	٧	٠
			٠,٠٠٤	٠,٠١٧	٠,٠٥٥	٠,١٣١	٠,٢٤٧	٠,٣٦٧	٠,٣٧٢	٠,٢٥٧	٠	١	١
		٠,٠٠٤	٠,٠٢٥	٠,٠٧٧	٠,١٦٤	٠,٢٦١	٠,٣١٨	٠,٢٧٥	٠,١٢٤	٠,٠٤١	٠	٢	٢
	٠,٠٠٣	٠,٠٢٩	٠,٠٩٧	٠,١٩٤	٠,٢٧٣	٠,٢٩٠	٠,٢٢٧	٠,١١٥	٠,٠٢٣	٠,٠٠٤	٠	٣	٣
٠,٠٠٤	٠,٠٢٣	٠,١١٥	٠,٢٢٧	٠,٢٩٠	٠,٢٧٣	٠,١٩٤	٠,٠٩٧	٠,٠٢٩	٠,٠٠٣		٠	٤	٤
٠,٠٤١	٠,١٢٤	٠,٢٧٥	٠,٣١٨	٠,٢٦١	٠,١٦٤	٠,٠٧٧	٠,٠٢٥	٠,٠٠٤			٠	٥	٥
٠,٢٥٧	٠,٣٧٢	٠,٣٦٧	٠,٢٤٧	٠,١٣١	٠,٠٥٥	٠,٠١٧	٠,٠٠٤				٠	٦	٦
٠,٦٩٨	٠,٤٧٨	٠,٢١٠	٠,٠٨٢	٠,٠٢٨	٠,٠٠٨	٠,٠٠٢					٠	٧	٧

جدول (١)

الاحتمالات في توزيع ذات الحدين: د(س)

ل												ن	س
٠,٩٥	٠,٩	٠,٨	٠,٧	٠,٦	٠,٥	٠,٤	٠,٣	٠,٢	٠,١	٠,٠٥	٠,٠٠١	٨	٠
				٠,٠٠١	٠,٠٠٤	٠,٠١٧	٠,٠٥٨	٠,١٦٨	٠,٤٣٠	٠,٦٦٣	٠,٠٠٠	٨	٠
			٠,٠٠١	٠,٠٠٨	٠,٠٣١	٠,٠٩٠	٠,١٩٨	٠,٣٣٦	٠,٣٨٣	٠,٢٧٩	٠,٠٠٠	٨	١
		٠,٠٠١	٠,٠١٠	٠,٠٤١	٠,١٠٩	٠,٢٠٩	٠,٢٩٦	٠,٢٩٤	٠,١٤٩	٠,٠٥١	٠,٠٠٠	٨	٢
		٠,٠٠٩	٠,٠٤٧	٠,١٢٤	٠,٢١٩	٠,٢٧٩	٠,٢٥٤	٠,١٤٧	٠,٠٣٣	٠,٠٠٥	٠,٠٠٠	٨	٣
	٠,٠٠٥	٠,٠٤٦	٠,١٣٦	٠,٢٣٢	٠,٢٧٣	٠,٢٣٢	٠,١٣٦	٠,٠٤٦	٠,٠٠٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨	٤
٠,٠٠٥	٠,٠٣٣	٠,١٤٧	٠,٢٥٤	٠,٢٧٩	٠,٢١٩	٠,١٢٤	٠,٠٤٧	٠,٠٠٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨	٥
٠,٠٥١	٠,١٤٩	٠,٢٩٤	٠,٢٩٦	٠,٢٠٩	٠,١٠٩	٠,٠٤١	٠,٠١٠	٠,٠٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨	٦
٠,٢٧٩	٠,٣٨٣	٠,٣٣٦	٠,١٩٨	٠,٠٩٠	٠,٠٣١	٠,٠٠٨	٠,٠٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨	٧
٠,٦٦٣	٠,٤٣٠	٠,١٦٨	٠,٠٥٨	٠,٠١٧	٠,٠٠٤	٠,٠٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨	٨
					٠,٠٠٢	٠,٠١٠	٠,٠٤٠	٠,١٣٤	٠,٣٨٧	٠,٦٣٠	٠,٠٠٠	٩	٠
				٠,٠٠٤	٠,٠١٨	٠,٠٦٠	٠,١٥٦	٠,٣٠٢	٠,٣٨٧	٠,٢٩٩	٠,٠٠٠	٩	١
		٠,٠٠٤	٠,٠٢١	٠,٠٧٠	٠,١٦١	٠,٢٦٧	٠,٣٠٢	٠,١٧٢	٠,٠٦٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩	٢
	٠,٠٠٣	٠,٠٢١	٠,٠٧٤	٠,١٦٤	٠,٢٥١	٠,٢٦٧	٠,١٧٦	٠,٠٤٥	٠,٠٠٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩	٣
	٠,٠٠١	٠,٠١٧	٠,٠٧٤	٠,١٦٧	٠,٢٤٦	٠,٢٥١	٠,١٧٢	٠,٠٦٥	٠,٠٠٧	٠,٠٠١	٠,٠٠٠	٩	٤
٠,٠٠١	٠,٠٠٧	٠,٠٦٦	٠,١٧٢	٠,٢٥١	٠,٢٤٦	٠,١٦٧	٠,٠٧٤	٠,٠١٧	٠,٠٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩	٥
٠,٠٠٨	٠,٠٤٥	٠,١٧٦	٠,٢٦٧	٠,٢٥١	٠,١٦٤	٠,٠٧٤	٠,٠٢١	٠,٠٠٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩	٦
٠,٠٦٣	٠,١٧٢	٠,٣٠٢	٠,٢٦٧	٠,١٦١	٠,٠٧٠	٠,٠٢١	٠,٠٠٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩	٧
٠,٢٩٩	٠,٣٨٧	٠,٣٠٢	٠,١٥٦	٠,٠٦٠	٠,٠١٨	٠,٠٠٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩	٨
٠,٦٣٠	٠,٣٨٧	٠,١٣٤	٠,٠٤٠	٠,٠١٠	٠,٠٠٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩	٩
					٠,٠٠١	٠,٠٠٦	٠,٠٢٨	٠,١٠٧	٠,٣٤٩	٠,٥٩٩	٠,٠٠٠	١٠	٠
				٠,٠٠٢	٠,٠١٠	٠,٠٤٠	٠,١٢١	٠,٢٦٨	٠,٣٨٧	٠,٣١٥	٠,٠٠٠	١٠	١
		٠,٠٠١	٠,٠١١	٠,٠٤٤	٠,١٢١	٠,٢٣٣	٠,٣٠٢	٠,١٩٤	٠,٠٧٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠	٢
	٠,٠٠١	٠,٠٠٩	٠,٠٤٢	٠,١١٧	٠,٢١٥	٠,٢٦٧	٠,٢٠١	٠,٠٥٧	٠,٠١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠	٣
	٠,٠٠٦	٠,٠٣٧	٠,١١١	٠,٢٠٥	٠,٢٥١	٠,٢٠٠	٠,٠٨٨	٠,٠١١	٠,٠٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠	٤
	٠,٠٠١	٠,٠٢٦	٠,١٠٣	٠,٢٠١	٠,٢٤٦	٠,٢٠١	٠,١٠٣	٠,٠٢٦	٠,٠٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠	٥
٠,٠٠١	٠,٠١١	٠,٠٨٨	٠,٢٠٠	٠,٢٥١	٠,٢٠٥	٠,١١١	٠,٠٣٧	٠,٠٠٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠	٦
٠,٠١٠	٠,٠٥٧	٠,٢٠١	٠,٢٦٧	٠,٢١٥	٠,١١٧	٠,٠٤٢	٠,٠٠٩	٠,٠٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠	٧
٠,٠٧٥	٠,١٩٤	٠,٣٠٢	٠,٢٣٣	٠,١٢١	٠,٠٤٤	٠,٠١١	٠,٠٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠	٨
٠,٣١٥	٠,٣٨٧	٠,٢٦٨	٠,١٢١	٠,٠٤٠	٠,٠١٠	٠,٠٠٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠	٩
٠,٥٩٩	٠,٣٤٩	٠,١٠٧	٠,٠٢٨	٠,٠٠٦	٠,٠٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠	١٠

جدول (٢)

الاحتمالات في توزيع ذات الحدين: د(س)

ل												ن	س
٠,٩٥	٠,٩	٠,٨	٠,٧	٠,٦	٠,٥	٠,٤	٠,٣	٠,٢	٠,١	٠,٠٥			
						٠,٠٠٤	٠,٠٢٠	٠,٠٨٦	٠,٣١٤	٠,٥٦٩		١١	٠
				٠,٠٠١	٠,٠٠٥	٠,٠٢٧	٠,٠٩٣	٠,٢٣٦	٠,٣٨٤	٠,٣٢٩		١	١
			٠,٠٠١	٠,٠٠٥	٠,٠٢٧	٠,٠٨٩	٠,٢٠٠	٠,٢٩٥	٠,٢١٣	٠,٠٨٧		٢	٢
			٠,٠٠٤	٠,٠٢٣	٠,٠٨١	٠,١٧٧	٠,٢٥٧	٠,٢٢١	٠,٠٧١	٠,٠١٤		٣	٣
		٠,٠٠٢	٠,٠١٧	٠,٠٧٠	٠,١٦١	٠,٢٣٦	٠,٢٢٠	٠,١١١	٠,٠١٦	٠,٠٠١		٤	٤
		٠,٠١٠	٠,٠٥٧	٠,١٤٧	٠,٢٢٦	٠,٢٢١	٠,١٣٢	٠,٠٣٩	٠,٠٠٢			٥	٥
	٠,٠٠٢	٠,٠٣٩	٠,١٣٢	٠,٢٢١	٠,٢٢٦	٠,١٤٧	٠,٠٥٧	٠,٠١٠				٦	٦
٠,٠٠١	٠,٠١٦	٠,١١١	٠,٢٢٠	٠,٢٣٦	٠,١٦١	٠,٠٧٠	٠,٠١٧	٠,٠٠٢				٧	٧
٠,٠١٤	٠,٠٧١	٠,٢٢١	٠,٢٥٧	٠,١٧٧	٠,٠٨١	٠,٠٢٣	٠,٠٠٤					٨	٨
٠,٠٨٧	٠,٢١٣	٠,٢٩٥	٠,٢٠٠	٠,٠٨٩	٠,٠٢٧	٠,٠٠٥	٠,٠٠١					٩	٩
٠,٣٢٩	٠,٣٨٤	٠,٢٣٦	٠,٠٩٣	٠,٠٢٧	٠,٠٠٥	٠,٠٠١						١٠	١٠
٠,٥٦٩	٠,٣١٤	٠,٠٨٦	٠,٠٢٠	٠,٠٠٤								١١	١١
						٠,٠٠٢	٠,٠١٤	٠,٠٦٩	٠,٢٨٢	٠,٥٤٠		١٢	٠
					٠,٠٠٣	٠,٠١٧	٠,٠٧١	٠,٢٠٦	٠,٣٧٧	٠,٣٤١		١	١
				٠,٠٠٢	٠,٠١٦	٠,٠٦٤	٠,١٦٨	٠,٢٨٣	٠,٢٣٠	٠,٠٩٩		٢	٢
			٠,٠٠١	٠,٠١٢	٠,٠٥٤	٠,١٤٢	٠,٢٤٠	٠,٢٣٦	٠,٠٨٥	٠,٠١٧		٣	٣
		٠,٠٠١	٠,٠٠٨	٠,٠٤٢	٠,١٢١	٠,٢١٣	٠,٢٣١	٠,١٣٣	٠,٠٢١	٠,٠٠٢		٤	٤
		٠,٠٠٣	٠,٠٢٩	٠,١٠١	٠,١٩٣	٠,٢٢٧	٠,١٥٨	٠,٠٥٣	٠,٠٠٤			٥	٥
		٠,٠١٦	٠,٠٧٩	٠,١٧٧	٠,٢٢٦	٠,١٧٧	٠,٠٧٩	٠,٠١٦				٦	٦
	٠,٠٠٤	٠,٠٥٣	٠,١٥٨	٠,٢٢٧	٠,١٩٣	٠,١٠١	٠,٠٢٩	٠,٠٠٣				٧	٧
٠,٠٠٢	٠,٠٢١	٠,١٣٣	٠,٢٣١	٠,٢١٣	٠,١٢١	٠,٠٤٢	٠,٠٠٨	٠,٠٠١				٨	٨
٠,٠١٧	٠,٠٨٥	٠,٢٣٦	٠,٢٤٠	٠,١٤٢	٠,٠٥٤	٠,٠١٢	٠,٠٠١					٩	٩
٠,٠٩٩	٠,٢٣٠	٠,٢٨٣	٠,١٦٨	٠,٠٦٤	٠,٠١٠	٠,٠٠٢						١٠	١٠
٠,٣٤١	٠,٣٧٧	٠,٢٠٦	٠,٠٧١	٠,٠١٧	٠,٠٠٣							١١	١١
٠,٥٤٠	٠,٢٨٢	٠,٠٦٩	٠,٠١٤	٠,٠٠٢								١٢	١٢

جدول (٣)

الاحتمالات في توزيع ذات الحدين: د(س)

ل


ن	س	٠,٠٥	٠,١	٠,٢	٠,٣	٠,٤	٠,٥	٠,٦	٠,٧	٠,٨	٠,٩	٠,٩٥
١٣	٠	٠,٥١٣	٠,٢٥٤	٠,٠٥٥	٠,٠١٠	٠,٠٠١						
	١	٠,٣٥١	٠,٣٦٧	٠,١٧٩	٠,٠٥٤	٠,٠١١	٠,٠٠٢					
	٢	٠,١١١	٠,٢٤٥	٠,٢٦٨	٠,١٣٩	٠,٠٤٥	٠,٠١٠	٠,٠٠١				
	٣	٠,٠٢١	٠,١٠٠	٠,٢٤٦	٠,٢١٨	٠,١١١	٠,٠٣٥	٠,٠٠٥	٠,٠٠١			
	٤	٠,٠٠٣	٠,٠٢٨	٠,١٥٤	٠,٢٣٤	٠,١٨٤	٠,٠٨٧	٠,٠٢٤	٠,٠٠٣			
	٥		٠,٠٠٦	٠,٠٦٩	٠,١٨٠	٠,٢٢١	٠,١٥٧	٠,٠٦٦	٠,٠١٤	٠,٠٠١		
	٦		٠,٠٠١	٠,٠٢٣	٠,١٠٣	٠,١٩٧	٠,٢٠٩	٠,١٣١	٠,٠٤٤	٠,٠٠٦	٠,٠٠١	
	٧			٠,٠٠٦	٠,٠٤٤	٠,١٣١	٠,٢٠٩	٠,١٩٧	٠,١٠٣	٠,٠٢٣	٠,٠٠١	
	٨			٠,٠٠١	٠,٠١٤	٠,٠٦٦	٠,١٥٧	٠,٢٢١	٠,١٨٠	٠,٠٦٩	٠,٠٠٦	٠,٠٠١
	٩				٠,٠٠٣	٠,٠٢٤	٠,٠٨٧	٠,١٨٤	٠,٢٣٤	٠,١٥٤	٠,٠٢٨	٠,٠٠٣
	١٠				٠,٠٠١	٠,٠٠٦	٠,٠٣٥	٠,١١١	٠,٢١٨	٠,٢٤٦	٠,١٠٠	٠,٠٢١
	١١				٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠١٠	٠,٠٤٥	٠,١٣٩	٠,٢٦٨	٠,٢٤٥	٠,١١١
	١٢					٠,٠٠٢	٠,٠١١	٠,٠٥٤	٠,١٧٩	٠,٣٦٧	٠,٣٥١	٠,١٥٣
	١٣						٠,٠٠١	٠,٠١٠	٠,٠٥٥	٠,٢٥٤	٠,١٥٣	٠,٠٥١
١٤	٠	٠,٤٨٨	٠,٢٢٩	٠,٠٤٤	٠,٠٠٧	٠,٠٠١						
	١	٠,٣٥٩	٠,٣٥٦	٠,١٥٤	٠,٠٤١	٠,٠٠٧	٠,٠٠١					
	٢	٠,١٢٣	٠,٢٥٧	٠,٢٥٠	٠,١١٣	٠,٠٣٢	٠,٠٠٦	٠,٠٠١				
	٣	٠,٠٢٦	٠,١١٤	٠,٢٥٠	٠,١٩٤	٠,٠٨٥	٠,٠٢٢	٠,٠٠٣	٠,٠٠١			
	٤	٠,٠٠٤	٠,٠٣٥	٠,١٧٢	٠,٢٢٩	٠,١٥٥	٠,٠٦١	٠,٠١٤	٠,٠٠١			
	٥		٠,٠٠٨	٠,٠٨٦	٠,١٩٦	٠,١٢٢	٠,٠٤١	٠,٠١٤	٠,٠٠١			
	٦		٠,٠٠١	٠,٠٣٢	٠,١٢٦	٠,٠٨٣	٠,٠٢٧	٠,٠١٢	٠,٠٠٢	٠,٠٠١		
	٧			٠,٠٠٩	٠,٠٦٢	٠,١٥٧	٠,٠٢٩	٠,١٥٧	٠,٠٦٢	٠,٠٠٩	٠,٠٠١	
	٨				٠,٠٠٢	٠,٠٢٣	٠,٠٩٢	٠,١٢٦	٠,٠٨٣	٠,٠٢٧	٠,٠١٢	٠,٠٠١
	٩				٠,٠٠٧	٠,٠٤١	٠,٠١٢	٠,٠٢٧	٠,٠٨٣	٠,٠٢٧	٠,٠١٢	٠,٠٠١
	١٠				٠,٠٠١	٠,٠٠٣	٠,٠٠٦	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠١
	١١					٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠١
	١٢						٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠١
	١٣							٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠١
	١٤								٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠١

تابع - جدول (٣)

الاحتمالات في توزيع ذات الحدين: د(س)

ل												ن	س
٠,٩٥	٠,٩	٠,٨	٠,٧	٠,٦	٠,٥	٠,٤	٠,٣	٠,٢	٠,١	٠,٠٥		١٥	٠
							٠,٠٠٥	٠,٠٣٥	٠,٢٠٦	٠,٤٦٣		١	١
					٠,٠٠٣	٠,٠٢٢	٠,٠٩٢	٠,٢٣١	٠,٢٦٧	٠,١٣٥	٠,٣٦٦	٢	٢
				٠,٠٠٢	٠,٠١٤	٠,٠٦٣	٠,١٧٠	٠,٢٥٠	٠,١٢٩	٠,٠٣١	٠,٠٠٥	٣	٣
			٠,٠٠١	٠,٠٠٧	٠,٠٤٢	٠,١٢٧	٠,٢١٩	٠,١٨٨	٠,٠٤٣	٠,٠٠٥		٤	٤
			٠,٠٠٣	٠,٠٢٤	٠,٠٩٢	٠,١٨٦	٠,٢٠٦	٠,١٠٣	٠,٠١٠	٠,٠٠١		٥	٥
		٠,٠٠١	٠,٠١٢	٠,٠٦١	٠,١٥٣	٠,٢٠٧	٠,١٤٧	٠,٠٤٣	٠,٠٠٢			٦	٦
		٠,٠٠٣	٠,٠٣٥	٠,١١٨	٠,١٩٦	٠,١٧٧	٠,٠٨١	٠,٠١٤				٧	٧
		٠,٠١٤	٠,٠٨١	٠,١٧٧	٠,١٩٦	٠,١١٨	٠,٠٣٥	٠,٠٠٣				٨	٨
	٠,٠٠٢	٠,٠٤٣	٠,١٤٧	٠,٢٠٧	٠,١٥٣	٠,٠٦١	٠,٠١٢	٠,٠٠١				٩	٩
٠,٠٠١	٠,٠١٠	٠,١٠٣	٠,٢٠٦	٠,١٨٦	٠,٠٩٢	٠,٠٢٤	٠,٠٠٣					١٠	١٠
٠,٠٠٥	٠,٠٤٣	٠,١٨٨	٠,٢١٠	٠,١٢٧	٠,٠٤٢	٠,٠٠٧	٠,٠٠١					١١	١١
٠,٠٣١	٠,١٢٩	٠,٢٥٠	٠,١٧٠	٠,٠٦٣	٠,٠١٤	٠,٠٠٢						١٢	١٢
٠,١٣٥	٠,٢٦٧	٠,٢٣١	٠,٠٩٢	٠,٠٢٢	٠,٠٠٣							١٣	١٣
٠,٣٦٦	٠,٣٤٣	٠,١٣٢	٠,٠٣١	٠,٠٠٥								١٤	١٤
٠,٤٦٣	٠,٢٠٦	٠,٠٣٥	٠,٠٠٥									١٥	١٥


تابع - جدول (٣)



جدول التوزيع الطبيعي المعياري (ن) لحساب قيم المساحات من اليسار

0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	ن
0.53586	0.53188	0.52790	0.52392	0.51994	0.51596	0.51197	0.50798	0.50399	0.50000	0.0
0.57030	0.56742	0.56454	0.56166	0.55878	0.55589	0.55301	0.54976	0.54651	0.54326	0.1
0.61409	0.61026	0.60642	0.60258	0.59874	0.59489	0.59105	0.58721	0.58337	0.57953	0.2
0.65173	0.64789	0.64405	0.64021	0.63637	0.63253	0.62869	0.62485	0.62101	0.61717	0.3
0.68793	0.68409	0.68025	0.67641	0.67257	0.66873	0.66489	0.66105	0.65721	0.65337	0.4
0.72240	0.71856	0.71472	0.71088	0.70704	0.70320	0.69936	0.69552	0.69168	0.68784	0.5
0.75490	0.75106	0.74722	0.74338	0.73954	0.73570	0.73186	0.72802	0.72418	0.72034	0.6
0.78524	0.78140	0.77756	0.77372	0.76988	0.76604	0.76220	0.75836	0.75452	0.75068	0.7
0.81327	0.80943	0.80559	0.80175	0.79791	0.79407	0.79023	0.78639	0.78255	0.77871	0.8
0.83891	0.83507	0.83123	0.82739	0.82355	0.81971	0.81587	0.81203	0.80819	0.80435	0.9
0.86214	0.85830	0.85446	0.85062	0.84678	0.84294	0.83910	0.83526	0.83142	0.82758	1.0
0.88298	0.87914	0.87530	0.87146	0.86762	0.86378	0.85994	0.85610	0.85226	0.84842	1.1
0.90147	0.89763	0.89379	0.88995	0.88611	0.88227	0.87843	0.87459	0.87075	0.86691	1.2
0.91774	0.91390	0.91006	0.90622	0.90238	0.89854	0.89470	0.89086	0.88702	0.88318	1.3
0.93189	0.92805	0.92421	0.92037	0.91653	0.91269	0.90885	0.90501	0.90117	0.89733	1.4
0.94408	0.94024	0.93640	0.93256	0.92872	0.92488	0.92104	0.91720	0.91336	0.90952	1.5
0.95549	0.95165	0.94781	0.94397	0.94013	0.93629	0.93245	0.92861	0.92477	0.92093	1.6
0.96627	0.96243	0.95859	0.95475	0.95091	0.94707	0.94323	0.93939	0.93555	0.93171	1.7
0.97672	0.97288	0.96904	0.96520	0.96136	0.95752	0.95368	0.94984	0.94600	0.94216	1.8
0.98670	0.98286	0.97902	0.97518	0.97134	0.96750	0.96366	0.95982	0.95598	0.95214	1.9
0.99169	0.98785	0.98401	0.98017	0.97633	0.97249	0.96865	0.96481	0.96097	0.95713	2.0
0.99574	0.99190	0.98806	0.98422	0.98038	0.97654	0.97270	0.96886	0.96502	0.96118	2.1
0.99899	0.99515	0.99131	0.98747	0.98363	0.97979	0.97595	0.97211	0.96827	0.96443	2.2
0.99958	0.99574	0.99190	0.98806	0.98422	0.98038	0.97654	0.97270	0.96886	0.96502	2.3
0.99971	0.99587	0.99203	0.98819	0.98435	0.98051	0.97667	0.97283	0.96899	0.96515	2.4
0.99982	0.99598	0.99214	0.98830	0.98446	0.98062	0.97678	0.97294	0.96910	0.96526	2.5
0.99990	0.99606	0.99222	0.98838	0.98454	0.98070	0.97686	0.97302	0.96918	0.96534	2.6
0.99995	0.99611	0.99227	0.98843	0.98459	0.98075	0.97691	0.97307	0.96923	0.96539	2.7
0.99997	0.99613	0.99229	0.98845	0.98461	0.98077	0.97693	0.97309	0.96925	0.96541	2.8
0.99998	0.99614	0.99230	0.98846	0.98462	0.98078	0.97694	0.97310	0.96926	0.96542	2.9
0.99999	0.99615	0.99231	0.98847	0.98463	0.98079	0.97695	0.97311	0.96927	0.96543	3.0
0.99999	0.99615	0.99231	0.98847	0.98463	0.98079	0.97695	0.97311	0.96927	0.96543	3.1
0.99999	0.99615	0.99231	0.98847	0.98463	0.98079	0.97695	0.97311	0.96927	0.96543	3.2
0.99999	0.99615	0.99231	0.98847	0.98463	0.98079	0.97695	0.97311	0.96927	0.96543	3.3
0.99999	0.99615	0.99231	0.98847	0.98463	0.98079	0.97695	0.97311	0.96927	0.96543	3.4
0.99999	0.99615	0.99231	0.98847	0.98463	0.98079	0.97695	0.97311	0.96927	0.96543	3.5
0.99999	0.99615	0.99231	0.98847	0.98463	0.98079	0.97695	0.97311	0.96927	0.96543	3.6
0.99999	0.99615	0.99231	0.98847	0.98463	0.98079	0.97695	0.97311	0.96927	0.96543	3.7
0.99999	0.99615	0.99231	0.98847	0.98463	0.98079	0.97695	0.97311	0.96927	0.96543	3.8
0.99999	0.99615	0.99231	0.98847	0.98463	0.98079	0.97695	0.97311	0.96927	0.96543	3.9

جدول (4)



جدول التوزيع الطبيعي المعياري (U) لحساب قيم المساحات من اليسار

U	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
3,9-	0,00005	0,00005	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00003	0,00003
3,8-	0,00007	0,00007	0,00007	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00005	0,00005	0,00005
3,7-	0,00011	0,00010	0,00010	0,00010	0,00009	0,00009	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008
3,6-	0,00016	0,00015	0,00015	0,00014	0,00014	0,00013	0,00013	0,00012	0,00012	0,00011
3,5-	0,00023	0,00022	0,00022	0,00021	0,00020	0,00019	0,00019	0,00018	0,00017	0,00017
3,4-	0,00034	0,00032	0,00031	0,00030	0,00029	0,00028	0,00027	0,00026	0,00025	0,00024
3,3-	0,00048	0,00047	0,00045	0,00043	0,00042	0,00040	0,00039	0,00038	0,00036	0,00035
3,2-	0,00069	0,00066	0,00064	0,00062	0,00060	0,00058	0,00056	0,00054	0,00052	0,00050
3,1-	0,00097	0,00094	0,00090	0,00087	0,00084	0,00082	0,00079	0,00076	0,00074	0,00071
3,0-	0,00135	0,00131	0,00126	0,00122	0,00118	0,00114	0,00111	0,00107	0,00104	0,00100
2,9-	0,00187	0,00181	0,00175	0,00169	0,00164	0,00159	0,00154	0,00149	0,00144	0,00139
2,8-	0,00256	0,00248	0,00240	0,00233	0,00226	0,00219	0,00212	0,00205	0,00199	0,00193
2,7-	0,00347	0,00336	0,00326	0,00317	0,00307	0,00298	0,00289	0,00280	0,00272	0,00264
2,6-	0,00466	0,00453	0,00440	0,00427	0,00415	0,00402	0,00391	0,00379	0,00368	0,00357
2,5-	0,00621	0,00604	0,00587	0,00570	0,00554	0,00539	0,00523	0,00508	0,00493	0,00480
2,4-	0,00820	0,00798	0,00776	0,00755	0,00734	0,00714	0,00695	0,00676	0,00657	0,00639
2,3-	0,01072	0,01044	0,01017	0,00990	0,00964	0,00939	0,00914	0,00889	0,00866	0,00842
2,2-	0,01390	0,01350	0,01321	0,01287	0,01255	0,01222	0,01191	0,01160	0,01130	0,01101
2,1-	0,01787	0,01743	0,01700	0,01659	0,01618	0,01578	0,01539	0,01500	0,01463	0,01427
2,0-	0,02275	0,02222	0,02169	0,02118	0,02068	0,02018	0,01969	0,01923	0,01876	0,01831
1,9-	0,02872	0,02807	0,02743	0,02680	0,02619	0,02559	0,02500	0,02442	0,02385	0,02330
1,8-	0,03593	0,03515	0,03438	0,03362	0,03288	0,03216	0,03144	0,03074	0,03005	0,02938
1,7-	0,04450	0,04363	0,04272	0,04182	0,04093	0,04006	0,03920	0,03836	0,03754	0,03673
1,6-	0,05480	0,05370	0,05262	0,05155	0,05050	0,04947	0,04846	0,04746	0,04648	0,04551
1,5-	0,06711	0,06582	0,06456	0,06331	0,06208	0,06087	0,05968	0,05850	0,05734	0,05619
1,4-	0,08176	0,07999	0,07825	0,07653	0,07483	0,07314	0,07147	0,06981	0,06817	0,06654
1,3-	0,09900	0,09699	0,09500	0,09303	0,09108	0,08914	0,08722	0,08531	0,08342	0,08154
1,2-	0,11974	0,11754	0,11536	0,11320	0,11107	0,10896	0,10687	0,10480	0,10275	0,10071
1,1-	0,14431	0,14181	0,13933	0,13687	0,13443	0,13201	0,12961	0,12722	0,12485	0,12250
1,0-	0,17361	0,17085	0,16811	0,16539	0,16269	0,15999	0,15731	0,15465	0,15201	0,14938
0,9-	0,20711	0,20398	0,20086	0,19776	0,19467	0,19160	0,18854	0,18550	0,18248	0,17947
0,8-	0,24433	0,24083	0,23734	0,23386	0,23040	0,22695	0,22352	0,22010	0,21670	0,21331
0,7-	0,28539	0,28159	0,27780	0,27402	0,27026	0,26651	0,26278	0,25906	0,25536	0,25167
0,6-	0,33047	0,32638	0,32230	0,31824	0,31420	0,31018	0,30618	0,30219	0,29821	0,29425
0,5-	0,38035	0,37597	0,37160	0,36725	0,36291	0,35859	0,35428	0,34999	0,34571	0,34145
0,4-	0,43529	0,43062	0,42596	0,42132	0,41669	0,41208	0,40748	0,40289	0,39831	0,39375
0,3-	0,49535	0,49038	0,48542	0,48048	0,47555	0,47063	0,46572	0,46082	0,45593	0,45105
0,2-	0,56215	0,55688	0,55162	0,54638	0,54115	0,53593	0,53072	0,52552	0,52033	0,51515
0,1-	0,63559	0,62999	0,62440	0,61882	0,61325	0,60769	0,60214	0,59660	0,59107	0,58555
0,0-	0,70540	0,70000	0,69460	0,68921	0,68383	0,67846	0,67310	0,66775	0,66241	0,65708

جدول (5)