

# مذكرة مادة الفيزياء

الصف الثاني عشر ( 12 )

## الفصل الدراسي الأول

العام الدراسي : 2023 / 2024 م

أ/ يوسف بدر عزمي

صفوة معلم الكويت

**الوحدة الأولى : الحركة**

**الفصل الأول : الطاقة**



**صفوة معلم الكويت**

## الدرس ( 1-1 ) : الشغل

مقدمة هامة :

2- الضرب الاتجاهي ( التقاطعي ) أو ( الخارجي )	1- الضرب العددي ( القياسي ) أو ( النقطي ) أو ( الداخلي )	ضرب المتجهات
$\vec{A} \times \vec{B} = AB \sin \theta$	$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$	العلاقة الرياضية
		نتج الضرب
		تتعدم قيمة الناتج
		أكبر قيمة للناتج
		مثال

\*\* ملاحظة هامة : مفهوم الشغل الفيزيائي يختلف تماماً عن الجهد الجسدي.

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d} = Fd \cos \theta$$

عملية تقوم فيها قوة مؤثرة بإزاحة جسم في اتجاهها  
أو كمية عددية تساوي حاصل الضرب العددي لمتجهي القوة والإزاحة

الشغل






الشغل الذي تبذله قوة (1N) تحرك الجسم في اتجاهها إزاحة (1m)

الجول

\*\* يقاس الشغل بوحدة ..... بحسب النظام الدولي للوحدات والتي تكافئ .....

ما المقصود الشغل المبذول على جسم ما = 10 جول .

ما المقصود

$\theta = 180$	$90 < \theta < 180$	$\theta = 90$	$0 < \theta < 90$	$\theta = 0$	قيمة ( $\theta$ )
					رسم متجهي القوة والإزاحة
					قيمة ( $\cos \theta$ )
					مقدار الشغل
					نوع الشغل

نقص سرعة الجسم	ثبوت سرعة الجسم	زيادة سرعة الجسم	وجه المقارنة
			نوع العجلة
			نوع الشغل الناتج

### الشغل كمية موجبة (+)

منتج للحركة زيادة سرعة الجسم

1- القوة لها مركبة في اتجاه الإزاحة.

$$0^\circ \leq \theta < 90^\circ$$

$$1 \geq \cos \theta > 0$$


2- الإزاحة باتجاه القوة.

$$\theta = 0^\circ$$

$$\cos \theta = 1$$

ملاحظة مهمة:

أكبر قيمة للشغل المنتج عندما تكون الزاوية ( $0^\circ$ ).



### الشغل كمية سالبة (-)

مقاوم للحركة يقلل من سرعة الجسم

1- القوة لها مركبة عكس اتجاه الإزاحة.

$$90^\circ < \theta \leq 180^\circ$$

$$\cos \theta < 0$$


2- اتجاه القوة معاكساً تماماً لاتجاه الإزاحة.

$$\theta = 180^\circ$$

$$\cos \theta = -1$$

ملاحظة مهمة:

أكبر قيمة للشغل المقاوم بالقيمة المطلقة عندما تكون الزاوية ( $180^\circ$ )



$$\vec{d} = 0$$


مثال 1: إذا أثرت قوة على

جسم ولم تسبب له إزاحة.

مثال 2: إذا تحرك الجسم في

مسار مغلق عدد صحيح

من الدورات.



$$\Sigma \vec{F} = 0$$

مثال 1: محصلة القوى المؤثرة على

الجسم = صفر

مثال 2: جسم يتحرك

بسرعة ثابتة.



متى

ينعدم الشغل؟

$$W=0$$

$$\cos 90^\circ = 0$$

إذا كانت القوة عمودية على اتجاه الحركة

مثال 1: عندما يتحرك شخص يحمل حقيبة

باتجاه أفقي عمودي على اتجاه القوة فإن

الشغل الناتج عن وزن الحقيبة = صفر.

مثال 2: الشغل المبذول من قوة الجاذبية الأرضية


على قمر صناعي يدور حول الأرض.



مثال 1: قوتان تعملان على صندوق خشبي وضع فوق سطح أفقي أملس لينزلق مسافة (2.5 m) بالاتجاه الموجب


للمحور الأفقي قوة منتظمة ( $F_1$ ) مقدارها (10 N) وتصنع زاوية ( $30^\circ$ ) مع المحور الأفقي وقوة منتظمة ( $F_2$ )

مقدارها (7 N) وتصنع زاوية ( $150^\circ$ ) مع المحور الأفقي. احسب مقدار الشغل الناتج من هذه القوي وحدد نوعه :



## تابع الشغل

\*\* نشاط : المكعب بالشكل موضوع على سطح أفقي خشن وتؤثر عليه قوة منتظمة ( F ) بحيث تصنع زاوية (  $\theta$  ) :



( أ ) حدد مقدار مركبة القوة ( F ) التي تبذل شغلاً على الجسم :

( ب ) أكتب المعادلة العامة لحساب الشغل بدلالة المركبة السابقة والإزاحة :

( ج ) هل توجد للقوة ( F ) مركبة أخرى ؟ وهل تبذل هذه المركبة شغلاً على الجسم ؟ علل لإجابتك :

( د ) توجد قوتي أخرى تؤثر على المكعب . حدد هذه القوي وحدد اتجاهها :

علل لما يأتي :

1- الشغل كمية عددية .

2- شغل قوة الاحتكاك يكون دائماً سالب .

3- ينعدم الشغل المبذول ( الشغل يساوي صفر ) على جسم في مسار دائري مغلق يساوي عدد صحيح من الدورات.  
أو لا تبذل شغلاً عند ضربك للحائط بقوة كبيرة.

4- ينعدم الشغل المبذول ( الشغل يساوي صفر ) عند تحريك جسم بسرعة منتظمة .

5- لا تبذل شغلاً إذا وقفت حاملاً حقيبتك الثقيلة على جانب الطريق .


6- شغل وزن الحقيبة الذي يبذله حمال المطار والذي يحمل حقيبة على كتفه وينقلها مسافة أفقية يساوي الصفر .  
أو شغل وزن الحقيبة عندما ترفع حقيبتك بقوة إلى أعلى وتتحرك باتجاه أفقي عمودي على اتجاه القوة يساوي صفر.  
أو ينعدم الشغل المبذول من وزن السيارة عندما تتحرك على طريق أفقي .  
أو قوة جذب الأرض للقمر الصناعي لا تبذل شغلاً في تحريكه أثناء دورانه حول الأرض .

7- الشغل الذي تبذله قوة منتظمة تصنع زاوية مع اتجاه الحركة يكون نتيجة لمركبة القوة الموازية لاتجاه الحركة فقط



## الشغل المبذول من وزن الجسم

\*\* أستنتج أن الشغل الناتج عن وزن الجسم لا يرتبط بشكل المسار بين النقطتين، ولكن يتوقف على الإزاحة الرأسية .



.....


.....

.....

.....

.....

إلى نقطة أعلى عكس اتجاه قوة الجاذبية	إلى نقطة على نفس مستوي موقعه الابتدائي	إلى نقطة أدنى مع اتجاه قوة الجاذبية	حركة الجسم
			نوع الشغل الناتج عن الوزن
			قانون الشغل الناتج عن الوزن



\*\* ملاحظات هامة : في الشكل المقابل :

أ) المسافة (  $h_i = 5 \text{ m}$  ) من الأرض إلى A تمثل الارتفاع الرأسي الابتدائي

ب) المسافة (  $d = \Delta h = 2 \text{ m}$  ) من A إلى B تمثل الإزاحة الرأسية

ويحسب منها شغل الوزن من A إلى B من العلاقة  $W_w = mg \Delta h$


والعوامل التي يتوقف عليها وزن الجسم - الإزاحة الرأسية

ج) المسافة (  $h_f = 3 \text{ m}$  ) من الأرض إلى B تمثل الارتفاع الرأسي النهائي

ويحسب منها طاقة الوضع التثاقلية عند النقطة B من العلاقة  $PE_g = mgh$

والعوامل التي يتوقف عليها وزن الجسم - الارتفاع الرأسي

ويتم دراسة طاقة الوضع التثاقلية في الدرس القادم



\*\* في الشكل المقابل :


أ) الشغل الناتج عن الوزن عندما يتحرك من موضعه إلى سطح الأرض

على المسار (b) ..... إذا تحرك من نفس الموضع على المسار (a).

ب) بم تفسر :

**نشاط :** المكعب الموضح بالشكل موضوع على سطح مائل بزاوية ( $\theta$ ) مع المستوى الأفقي الأملس تماماً والمطلوب :

أ ) أكتب معادلة لحساب الإزاحة الرأسية :



ب) أكتب معادلة لحساب الشغل الناتج عن وزن الجسم :

ج) هل توجد مركبة أخرى تبذل شغلاً على الجسم ؟ علل لإجابتك :

علل لما يأتي :

1- إذا قذف جسم بزاوية مع الأفقي ووصل إلى هدفه عند مستوى القذف فإن الشغل الذي تقوم به قوة الجاذبية صفر

**مثال 1 :** يحمل رجل حقيبة وزنها ( $400 \text{ N}$ ) ويتحرك بها أفقياً ( $10 \text{ m}$ ) . احسب الشغل الناتج من وزن الحقيبة ؟


**مثال 2 :** يحمل ولد كرة كتلتها ( $2 \text{ kg}$ ) أعلى مبني ارتفاعه ( $10 \text{ m}$ ) ثم أفلت الولد الكرة لتسقط .

أ ) ما هو مقدار الشغل المبذول على الكرة نتيجة قوة إمساك الولد لها :

ب) احسب مقدار الشغل الناتج عن قوة الجاذبية الأرضية إذا تحركت الكرة مسافة ( $3 \text{ m}$ ) :

ج) احسب مقدار الشغل الناتج عن قوة الاحتكاك مع الهواء خلال سقوط الكرة مسافة ( $3 \text{ m}$ ) وقوة الاحتكاك ( $1 \text{ N}$ ) :

د) احسب مقدار الشغل الكلي المبذول على الكرة نتيجة القوي المؤثرة فيها :



**مثال 3 :** كرة كتلتها ( $200 \text{ gm}$ ) سقطت سقوطاً حراً من ارتفاع ( $10 \text{ m}$ )

عن الأرض ونفذت في باطن الأرض مسافة ( $0.5 \text{ m}$ ) بإهمال مقاومة الهواء


أ ) الشغل المبذول بفعل الجاذبية على الكرة من سقوطها حتى ملامسة الأرض :

ب) الشغل المبذول على الكرة نتيجة اختراقها سطح الأرض :

ج) ما التغير المتوقع حدوثه في سرعة الكرة أثناء سقوطها بالهواء

وأثناء اختراقها الأرض :

## الشغل المبذول من النابض




\*\* يحسب الشغل من المساحة تحت المنحنى :

أ ( الشغل  $(W_1)$  يساوي .....  
والتي تساوي .....

ب ( الشغل  $(W_2)$  يساوي .....  
والتي تساوي .....


مثال 1 : احسب الشغل الكلي الناتج في الشكل المقابل :



.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

قوة متغيرة	قوة منتظمة	وجه المقارنة
قوة يتغير مقدارها أو اتجاهها أو كلاهما	قوة ثابتة المقدار والاتجاه	التعريف
قوة الشد على النابض	قوة الجاذبية الأرضية	أمثلة
$\vec{F} = k \Delta \vec{x}$	$\vec{F} = m \vec{a}$	حساب القوة
$W = \frac{1}{2} k \Delta x^2$	$W = Fd \cos \theta$	حساب الشغل الناتج

\*\* أستنتج أن الشغل المبذول على نابض مرن يحسب من :  $W = \frac{1}{2} k \cdot \Delta x^2$









ماذا يحدث

1- لمقدار الشغل المبذول لاستطالة زنبرك ثابت مرونته (K) عند زيادة الاستطالة إلى مثلي ما كانت عليه .

2- لمقدار الشغل المبذول لاستطالة زنبرك ثابت مرونته (K) عندما تقل الاستطالة إلى نصف ما كانت عليه .




**\*\* أرسم المنحنيات أو الخطوط البيانية الدالة على المطلوب بين العلاقات التالية :**



**\*\* أذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من :**

- 1- الشغل الذي تبذله قوة في إزاحة جسم أفقياً :
- 2- الشغل الناتج عن وزن جسم عند إزاحته رأسياً :
- 3- الشغل الناتج عن وزن كتلة معلقة في نابض مرن :



**مثال 2 :** من الشكل المقابل . احسب :


أ ) ثابت القوة للزنبرك :

ب) الشغل المبذول على الزنبرك لإحداث استطالة مقدارها (4 cm) :

**مثال 3 :** ضغط زنبرك (2 cm) عن طوله الأصلي في مرحلة أولى ومن ثم ضغط (6 cm) إضافية في مرحلة ثانية .

ما مقدار الشغل الإضافي المبذول في خلال عملية الضغط الثانية مقارنة بالعملية الأولى . علماً بأن (K = 100 N/m)

## تطبيقات على الشغل




مثال 1 : الشكل المقابل يمثل نابض مرن ثابت القوة له (  $K = 1000 \text{ N/m}$  ) علقت به كتلة (  $m$  )

فاستطال النابض بتأثيرها مسافة (  $\Delta X$  ) مقدارها  $5 \text{ cm}$  فإن :

أ ) مقدار القوة المحدثة للاستطالة بوحدة (  $\text{N}$  ) تساوي :

ب ) مقدار الكتلة المعلقة في النابض بوحدة (  $\text{kg}$  ) تساوي :

ج ) الشغل المبذول من الكتلة على النابض لإحداث الاستطالة السابقة بوحدة (  $\text{J}$  ) يساوي :



مثال 2 : تم رفع جسم كتلته  $6 \text{ kg}$  من أسفل سطح مستوى مائل خشن بفعل قوة

موازية للمستوى المائل مقدارها  $80 \text{ N}$  ليصل لقمة المستوى بعد قطع

مسافة  $18 \text{ m}$  فإذا علمت أن قوة الاحتكاك بين الجسم و سطح المستوى

المائل تعادل ثلث وزنه، اوجد :

أ ) الشغل الذي بذلته تلك القوة :

ب ) الشغل الناتج عن وزن الجسم :

ج ) الشغل الناتج عن قوة الاحتكاك :

د ) الشغل الكلي المبذول :

## الدرس ( 1-2 ) : الشغل والطاقة

الطاقة

المقدرة على إنجاز شغل

- \*\* عند دفعك صندوق ما فإن جزءاً من طاقتك ..... التي اكتسبتها من الطعام تتحول إلى طاقة .....
- \*\* يتوقف مقدار الشغل المنجز على مقدار ..... التي يصرفها الجسم
- \*\* تقاس الطاقة بوحدة .....

الطاقة الحركية

الشغل الذي ينجزه الجسم بسبب حركته

$$KE = \frac{1}{2}mv^2$$

- \*\* كلما تحرك الجسم بسرعة أكبر فإنه يمتلك طاقة حركية .....
- \*\* تتوقف الطاقة الحركية لجسم يتحرك على مسار مستقيم على .....
- \*\* الطاقة الحركية لجسم متحرك تتناسب طردياً مع كل من .....
- \*\* الطاقة الحركية كمية عددية دائماً ..... بينما التغير في الطاقة الحركية قد يكون .....
- \*\* عند ثبوت سرعة الجسم فإن التغير في الطاقة الحركية تساوي .....
- \*\* عندما تقل سرعة الجسم للنصف فإن الطاقة الحركية تقل .....
- \*\* عندما تزيد سرعة الجسم للمثلي فإن الطاقة الحركية تزداد .....
- \*\* لحساب سرعة الجسم بدلالة طاقته الحركية نستخدم العلاقة : .....

$$\Delta KE = W$$

العلاقة بين الطاقة الحركية والشغل :



قانون الطاقة الحركية الشغل الناتج عن محصلة القوة الخارجية المؤثرة في الجسم يساوي التغير في الطاقة الحركية

\*\* استنتج أن الشغل الناتج عن محصلة القوة الخارجية المؤثرة في الجسم يساوي التغير في طاقته الحركية :

علل لما يأتي :

- 1- الكرة المقذوفة بسرعة أفقية كبيرة على مستوي أفقي تستطيع أن تقطع مسافة أكبر قبل أن تتوقف من كرة مماثلة لها قذفت على نفس المستوي بسرعة أقل قبل أن تتوقف .

**مثال 1 :** في الشكل المقابل يمثل تغير الطاقة الحركية لجسم متحرك بتغير سرعته الخطية . احسب كتلة هذا الجسم :



**مثال 2 :** انزلق جسم كتلته (1 kg) من سكون من نقطة (A) على

مستوي مائل أملس يميل بزاوية (30°) مع المستوي الأفقي ليصل

إلى النقطة (B) حيث (AB = 4 m) . احسب :

أ ( الشغل الناتج عن وزن الصندوق :

ب) سرعة الجسم عند النقطة (B) مستخدماً قانون الطاقة الحركية :

**مثال 3 :** قذف جسم كتلته (200 g) من نقطة (A) رأسياً إلى أعلى بسرعة ابتدائية (20 m/s) ليصل في غياب

الاحتكاك إلى أقصى ارتفاع عند النقطة (B) . احسب :

أ ( الطاقة الحركية للجسم عند الانطلاق عند (A) :

ب) المسافة التي قطعها الجسم :

**مثال 4 :** دراجة كتلتها وكتلة سائقها معاً (100 kg) تتحرك على طريق أفقية بسرعة (2 m/s) فإذا قلت سرعتها

وأصبحت (1 m/s) بعد أن قطعت مسافة (20 m) . احسب :

أ ( الشغل المبذول على الدراجة :

ب) محصلة القوة الخارجية المؤثرة على الدراجة والتي سببت تناقص سرعتها :

ج) الشغل المبذول من وزن الدراجة :

## الطاقة الكامنة

طاقة يخزنها الجسم وتسمح له بإنجاز شغل للتخلص منها

الطاقة الكامنة


وجه المقارنة	الطاقة الكامنة الثقالية	الطاقة الكامنة المرنة
التعريف	الشغل المبذول على الجسم عند رفعه لنقطة ما	الشغل المبذول لتغيير وضع الجسم المرن من وضع مستقر إلى وضع الاستطالة أو الانكماش أو اللي
القانون	$PE_g = mgh$	$PE_e = \frac{1}{2} C \Delta\theta^2$ أو $PE_e = \frac{1}{2} K \Delta X^2$
العوامل		

وجه المقارنة	الطاقة الكامنة المرنة في النابض	الطاقة الكامنة المرنة في الخيط المطاطي
القانون	$PE_e = \frac{1}{2} K \cdot \Delta X^2$	$PE_e = \frac{1}{2} C \cdot \Delta\theta^2$
العوامل		

\*\* العوامل التي يتوقف عليها ثابت المرونة ( C ) :

\*\* يقاس ثابت مرونة الجسم المرن بحسب النظام الدولي للوحدات بوحدة

مثال : خيط مطاطي ثابت مرونته  $(100 \text{ N.m/rad}^2)$  عند لي الخيط صنع إزاحة زاوية  $(30^\circ)$ .  
احسب الطاقة الكامنة المرنة عند لي الخيط .




علل لما يأتي :

1- إذا أسقطت مطرقة على مسمار من مكان مرتفع ينغرز المسمار مسافة أكبر مقارنة بإسقاطها من مكان أقل ارتفاعا

2- يعود الزنبرك إلى وضعه الأصلي عند إفلاته

3- لكي ينطلق الحجر الموضح بالشكل لمسافة بعيدة يجب شد الخيط المطاطي بقوة كبيرة للخلف.



\*\* من أمثلة الطاقة الكامنة داخل المركبات الكيميائية

\*\* من أمثلة الطاقة الكامنة الثقالية


\*\* سطح الأرض يسمى ..... والطاقة الكامنة الثقالية عنده تساوي ..... لأن

\*\* تحت المستوي المرجعي الطاقة الكامنة الثقالية تساوي مقدار ..... بينما فوق المستوي المرجعي مقدار .....


المستوي المرجعي الذي نبدأ منه قياس الطاقة الكامنة الثقالية وتساوي عنده صفر




**\*\* في الشكل التالي يتم رفع حجر وزنه (100 N) إلى الأعلى على ارتفاع (2 m) في الحالات الآتية :**



رفع الحجر مرة واحدة



رفع الحجر على سطح مائل



رفع الحجر على سلم مدرج


أ) ماذا تلاحظ :

ب) ماذا تستنتج :


$$\Delta PE_g = -W_w$$

التغير في طاقة الوضع الثقالية والشغل :

**\*\* أستنتج أن التغير في طاقة الوضع الثقالية يساوي معكوس الشغل المبذول من وزن الجسم :**




وجه المقارنة	تحرك الجسم رأسياً إلى أعلى	تحرك الجسم رأسياً إلى أسفل
مقدار ( $h_f - h_i$ )		
مقدار ( $\Delta PE_g$ )		
مقدار الشغل ( $W$ )		



**مثال 1 :** الشكل المقابل يمثل التغير في الطاقة الكامنة الثقالية لجسم بتغير ارتفاعه عن سطح الأرض (المستوي المرجعي) . احسب وزن الجسم :

**مثال 2 :** في الشكل المقابل كرة كتلتها (1 kg) موضوعة عند المستوي المرجعي عند النقطة (B) . احسب الطاقة الكامنة الثقالية في الحالات الآتية :



أ) عند المستوي الأفقي المار بالنقطة (A) :

ب) عند المستوي الأفقي المار بالنقطة (B) :

ج) عند المستوي الأفقي المار بالنقطة (C) :

## الطاقة الميكانيكية

الطاقة الميكانيكية

$$ME = KE + PE$$









مجموع الطاقة الحركية والطاقة الكامنة

\*\* الطاقة الميكانيكية للجسم تظل ..... مهما أختلف الارتفاع بإهمال الاحتكاك مع الهواء

\*\* عند أقصى ارتفاع تكون الطاقة الكامنة التثاقلية للجسم ..... بينما تكون الطاقة الحركية

\*\* عند المستوي المرجعي تكون الطاقة الكامنة التثاقلية للجسم ..... بينما تكون الطاقة الحركية

\*\* أرسم المنحنيات أو الخطوط البيانية الدالة على المطلوب بين العلاقات التالية بفرض إهمال الاحتكاك مع الهواء :

			
الطاقة الحركية ومربع سرعة	الطاقة الحركية والارتفاع لجسم يقذف لأعلى	طاقة الوضع التثاقلية والارتفاع لجسم يقذف لأعلى	الطاقة الميكانيكية والارتفاع لجسم يقذف لأعلى
			
الطاقة الحركية وكتلة الجسم	الطاقة الحركية والمسافة لجسم يسقط لأسفل من موضع السقوط	طاقة الوضع التثاقلية والمسافة لجسم يسقط لأسفل من موضع السقوط	الطاقة الميكانيكية والمسافة لجسم يسقط لأسفل من موضع السقوط

**مثال 1 :** سقطت تفاحة كتلتها (0.15 kg) من ارتفاع (3 m) إلى أسفل ليصل في غياب الاحتكاك إلى الأرض .احسب

أ ) طاقة الوضع التثاقلية عند أقصى ارتفاع :

ب) سرعة التفاحة بعد سقوطها مسافة (2 m) من موضعها :

ج) الطاقة الميكانيكية للتفاحة عند وجودها على بعد (2 m) أسفل موضعها الابتدائي :

د) الطاقة الحركية للتفاحة عند اصطدامها بالأرض :

هـ) سرعة التفاحة لحظة اصطدامها بالأرض :

## الدرس ( 1-3 ) : حفظ ( بقاء ) الطاقة

الأجسام الميكروسكوبية	الأجسام الماكروسكوبية	وجه المقارنة
أجسام دقيقة ولا ترى بالعين المجردة	أجسام تمتلك أبعاداً يمكن رؤيتها بالعين المجردة	التعريف
الطاقة الميكانيكية الميكروسكوبية ( الطاقة الداخلية U )	الطاقة الميكانيكية الماكروسكوبية ( ME )	وجه المقارنة
مجموع طاقة الوضع وطاقة الحركة لجسيمات النظام	مجموع طاقة الوضع وطاقة الحركة للجسم	التعريف
$U = KE_{\text{micro}} + PE_{\text{micro}}$	$ME = KE_{\text{macro}} + PE_{\text{macro}}$	العلاقة الرياضية
		العوامل

الطاقة الكامنة الميكروسكوبية طاقة يتبادلها جسيمات النظام وتؤدي إلى تغير حالته بتغير طاقة الربط بين أجزائه

\*\* الطاقة الكامنة الميكروسكوبية (  $PE_{\text{micro}}$  ) تتغير .....

\*\* الطاقة الحركية الميكروسكوبية (  $KE_{\text{micro}}$  ) تتغير .....

الطاقة الكلية مجموع الطاقة الداخلية و الطاقة الميكانيكية  $E = ME + U$

قانون بقاء الطاقة الطاقة لا تبنى ولا تستحدث من العدم وتحول من شكل إلى آخر والطاقة الكلية للنظام ثابتة


\*\* لحساب التغير في الطاقة الكلية نستخدم العلاقة : .....

\*\* أكتب معادلة تعبر عن التغير في الطاقة الكلية للنظام في الحالتين التاليتين :

أ ) طاقة داخلية ثابتة وطاقة ميكانيكية متغيرة :

ب ) طاقة داخلية متغيرة وطاقة ميكانيكية ثابتة :

النظام المعزول نظام لا تتبادل فيه الطاقة مع الوسط المحيط و تكون الطاقة الكلية محفوظة



## أولاً : حفظ الطاقة الميكانيكية في نظام معزول ( بدون الاحتكاك )


\*\* بإهمال قوي الاحتكاك : أ ) الطاقة الميكانيكية تظل .....

..... ب ) الطاقة الداخلية تظل .....

..... ج ) الطاقة الكلية تظل .....

\*\* أستنتج أن في الأنظمة المعزولة يكون التغير في الطاقة الكامنة يساوى معكوس التغير في الطاقة الحركية

بإهمال قوي الاحتكاك مع الهواء .




.....

.....

.....

.....

.....




\*\* جسم طاقة وضعه (100 J) عندما يكون على ارتفاع (h) من الأرض فإذا ترك ليسقط سقوط حر

فإن طاقة حركته تصبح (25 J) عندما يكون على ارتفاع من الأرض يساوي .....

..... ويكون هبط مسافة قدرها .....

## البندول البسيط

**\*\* أستنتج أن بإهمال الاحتكاك الطاقة الميكانيكية أثناء حركة البندول البسيط :  $ME = \frac{1}{2}mv^2 + mgL(1 - \cos\theta)$**



.....

.....

.....


.....

.....


عند موضع الاستقرار	عند أقصى ارتفاع	وجه المقارنة
		الطاقة الميكانيكية
		الطاقة الحركية
		طاقة الوضع الثقالية

عند موضع الاستقرار ( النقطة $G_0$ )	بين نقطة الإفلات وموضع الاستقرار	عند أقصى ارتفاع ( نقطة الإفلات )	وجه المقارنة
			حساب الطاقة الميكانيكية


**\*\* أرسم المنحنيات أو الخطوط البيانية الدالة على المطلوب بين العلاقات التالية :**




طاقة الحركة وزاوية البندول





طاقة الوضع وزاوية البندول



الطاقة الميكانيكية وزاوية البندول



طاقة الوضع وطاقة الحركة للبندول




**\*\* المنحني البياني في الشكل يمثل تبادل الطاقة الحركية وطاقة الوضع الثقالية**

**بدلالة تغير الزاوية لبندول بسيط متحرك كنظام معزول احسب الطاقة الميكانيكية :**

.....





**مثال 1 :** بندول بسيط مؤلف من كتلة نقطية مقدارها (0.2 Kg) معلقة بخيط غير قابل للتمدد طوله (1 m) ثم أزيحت الكتلة من موضع الاستقرار مع إبقاء الخيط مشدودا بزاوية (60°) وأفلتت من السكون وبإهمال الاحتكاك .  
 أ ) حدد أي نوع من الطاقة يمثلها كل من الرسوم البيانية الثلاثة :

ب) احسب مقدار الطاقة الميكانيكية للنظام :

ج) احسب سرعة الكتلة عند مرورها المستوي المرجعي :

د) احسب مقدار الزاوية التي تتساوي عندها طاقة الوضع التثاقلية والطاقة الحركية :

هـ) احسب مقدار السرعة التي تتساوي عندها طاقة الوضع التثاقلية والطاقة الحركية :

### ثانياً : عدم حفظ الطاقة الميكانيكية في نظام معزول ( في وجود الاحتكاك )

\*\* عند حفظ الطاقة الكلية للنظام المعزول (  $\Delta E = 0$  ) فإن التغير في الطاقة الميكانيكية يساوى .....

التغير في الطاقة الداخلية وتصبح المعادلة بالشكل .....


\*\* الشغل الناتج عن قوى الاحتكاك المؤثرة على النظام يتحول إلى ..... وتصبح المعادلة

\*\* الشغل الناتج عن قوى الاحتكاك المؤثرة على أجزاء النظام يؤدي إلى تغيير ..... بالتتابع

\*\* أستنتج أن التغير في الطاقة الميكانيكية في نظام معزول يساوى الشغل الناتج عن قوة الاحتكاك :

## تابع حفظ ( بقاء ) الطاقة

علل لما يأتي :



1- تزيد الطاقة الحركية الميكروسكوبية لجسيمات النظام برفع درجة حرارته .


2- في الأنظمة المعزولة المغلقة تكون الطاقة الكلية محفوظة .

3- في الشكل المقابل الطاقة الكلية للنظام المعزول المؤلف من الأرض والسيارة الصغيرة والهواء المحيط لم تتغير .

4- الطاقة الميكانيكية للنظام المعزول المكون من ( الصندوق - المستوى المائل الخشن ) تكون غير محفوظة .

5- تكون درجة حرارة المياه عند قاعدة مسقط شلال مائي أعلى منها عند قمة المسقط نفسه .

6- المياه الساقطة من الشلالات يمكنها إدارة التوربينات التي تولد الطاقة الكهربائية .




\*\* نشاط : في الشكل المقابل هبوط المظلة باستخدام مظلي في الهواء المحيط .

ماذا تلاحظ :

ماذا تستنتج :

وجود الاحتكاك ( سطح مائل خشن )	غياب الاحتكاك ( سطح مائل أملس )	وجه المقارنة
محفوظة	محفوظة	الطاقة الكلية (E)
$\Delta E = 0$	$\Delta E = 0$	التغير في الطاقة الكلية ( $\Delta E$ )
غير محفوظة	محفوظة	الطاقة الميكانيكية (ME)
$ME_i \neq ME_f$	$ME_i = ME_f$	العلاقة بين $ME_i$ و $ME_f$
$\Delta ME \neq 0$ $\Delta ME = + W_f$ $ME_f - ME_i = f d \cos 180$ $(KE_f + PE_f) - (KE_i + PE_i) = - f d$	$\Delta ME = 0$ $ME_i = ME_f$ $KE_i + PE_i = KE_f + PE_f$	التغير في الطاقة الميكانيكية ( $\Delta ME$ )
$W_w = \pm m g h$ $W_f = - f d$ $W_T = W_w + W_f$	$W_w = \pm m g h$ $W_f = 0$ $W_T = W_w$	حساب الشغل الكلي ( $W_T$ )




**مثال 1 :** الشكل المقابل يوضح مستوي أملس ( A,B,C ) ضغط النابض الموجود عند الطرف (A) لمسافة (0.2m) ثم وضع أمامه الجسم (m) الذي كتلته تساوي (0.25Kg) فإذا أفلت النابض .احسب :

(أ) سرعة الجسم عند النقطة (B) :

(ب) سرعة الجسم عند النقطة (C) :

(ج) أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم عن المستوي المرجعي عند النقطة (D) :



**مثال 2 :** أفلت الجسم (S) الموضح في الشكل المقابل وكتلته (100 g) من النقطة (A) على المسار ABC و AB مستوى مائل أملس يصنع زاوية (30°) مع المستوى الأفقي الذي يبلغ طوله (L<sub>1</sub>) .



والمستوي الأفقي BC خشن وقوة الاحتكاك تساوى (0.1 N) ويبلغ طوله (L<sub>2</sub>) فإذا كانت سرعة الجسم عند النقطة (B) تساوى (4 m/s)

( أ ) استخدم قانون حفظ الطاقة الميكانيكية لإيجاد طول الجزء AB :

(ب) أكمل الجسم مساره على المسار BC ليتوقف عند النقطة C احسب طول المسار BC :


## تطبيقات على حفظ (بقاء) الطاقة

**مثال 3 :** جسم كتلته (5 kg) تحرك من السكون من أعلى نقطة على سطح مستوي مائل أملس، يتصل بسطح أفقي خشن كما بالشكل (1) ومثلنا علاقة الطاقة الميكانيكية (ME) للجسم مع إزاحته (d) بيانيا، فحصلنا على الخط البياني ABC كما بالشكل (2). احسب : أ) ارتفاع المستوى المائل :




ب) مقدار سرعة الجسم عند نهاية المستوى المائل :

ج) مقدار قوة الاحتكاك بين الجسم والسطح الأفقي :



ب) سرعة الكرة عند وصولها إلى نقطة (B) :

ج) سرعة الكرة عند وصولها إلى نقطة (C) :



**مثال 5 :** جسم كتلته  $2 \text{ kg}$  يتحرك من السكون تحت تأثير قوة

مقدارها  $(F = 14 \text{ N})$  تصنع زاوية مقدارها  $(60^\circ)$  كما بالشكل

فإذا تحرك الجسم مسافة من A إلى B مقدارها  $(d = 4 \text{ m})$


على سطح خشن قوة احتكاكه  $(f = 3 \text{ N})$  . احسب :

أ) الشغل المبذول بواسطة القوة  $(F)$  خلال المسافة من A إلى B :

ب) الشغل المبذول بواسطة القوة  $(f)$  خلال المسافة من A إلى B :

ج) التغير في طاقة حركة الجسم خلال المسافة من A إلى B :

د) سرعة الجسم عند B :



**مثال 6 :** أسقط مظلي كتلته  $(80 \text{ kg})$  عند A من طائرة مروحية ساكنة كما بالشكل

من ارتفاع  $(h_A = 500 \text{ m})$  فوق سطح الأرض فوصل للسرعة الحدية مقدارها

$(v_B = 2 \text{ m/s})$  عند B على ارتفاع  $(h_B = 100 \text{ m})$  مستخدماً مبدأ حفظ الطاقة

أ) احسب الشغل المبذول ضد قوة مقاومة الهواء :

ب) متوسط قوة مقاومة الهواء ( بفرض انها ثابتة ) :



# الوحدة الأولى : الحركة

## الفصل الثاني : ميكانيكا الدوران





## الدرس ( 2 - 1 ) : عزم الدوران ( عزم القوة )

$$\vec{\tau} = \vec{F} \times \vec{d} = Fd \sin \theta$$

مقدرة القوة على إحداث حركة دورانية للجسم حول محور الدوران

عزم القوة

أو كمية متجهة تساوي حاصل الضرب الاتجاهي لمتجهي القوة في طول ذراعها



\*\* العوامل التي يتوقف عليها عزم القوة :


\*\* يقاس عزم القوة بحسب النظام الدولي للوحدات بوحدة

\*\* عزم القوة كمية ..... ويحدد اتجاهه بـ

\*\* القوة العمودية تبذل جهد ..... وفعل رافعة

\*\* يعتمد ائزان الميزان الذي يعمل بالأوزان المنزلقة على

\*\* من التطبيقات العملية على عزم الدوران :



ذراع العزم

المسافة من محور الدوران إلى نقطة تأثير القوة

\*\* في الشكل المقابل : أي مفتاح له عزم دوران أكبر ؟ مع ذكر السبب ؟

\*\* اتجاه القوة بالنسبة لذراع القوة التي يجب ان تستخدمه لإنتاج أكبر عزم للقوة هو اتجاه

قاعدة اليد اليمنى


قاعدة تحدد اتجاه عزم القوة والإبهام يشير إلى عزم القوة و الأصابع تشير إلى اتجاه الدوران

دوران الجسم	مع عقارب الساعة	عكس عقارب الساعة
اتجاه عزم القوة بالنسبة للصفحة		
إشارة ( نوع ) عزم القوة		

وجه المقارنة	الشغل	عزم القوة
العلاقة المستخدمة لحسابه	$W = \vec{F} \cdot \vec{d}$	$\vec{\tau} = \vec{F} \times \vec{d}$
نوع الكمية		
نوع الضرب		
وحدة القياس		

## العزوم التي تكون محصلتها تساوي صفر

## العزوم المتزنة



\*\* في الشكل المقابل : طفلين يلعبون الأرجوحة حيث أوزانهم غير متكافئة :

أ) ماذا يفعل الطفلين لكي تتزن الأرجوحة :

ب) ما هي الشروط الضرورية لتحقيق الاتزان الدوراني للجسم :

ج) ما هي الشروط الضرورية لتحقيق الاتزان العام للجسم :

د) هل الوزن هو الذي يسبب الدوران ؟ مع ذكر السبب :


هـ) ما العلاقة بين المجموع الجبري للعزوم مع اتجاه عقارب الساعة والمجموع الجبري للعزوم عكس عقارب الساعة :

و) حدد حالات إنعدام عزم القوة بالرغم وجود قوة مؤثرة على الجسم :

\*\* سبب دوران الجسم حول محوره تكون

\*\* عندما لا يدور الجسم تكون

\*\* نشاط : حدد في كل حالة هل يدور الباب أم لا . مع ذكر السبب ؟



\*\* شكل (A) :

\*\* شكل (B) :


\*\* شكل (C) :

\*\* شكل (D) :

## تابع عزم الدوران ( عزم القوة )

الموضع الذي تكون عنده محصلة عزوم قوة الجاذبية المؤثرة في الجسم تساوي صفر

مركز ثقل الجسم



ماذا يحدث مع ذكر السبب

1- عند وجود موقع مركز الثقل خارج المساحة الحاملة للجسم كما بالشكل :  
أو إذا حاولت أن تلمس أصابعك قدميك وأنت واقف وكعبا قدميك ملاصقان للحائط :

2- إذ عند ركل كرة القدم من نقطة على خط مستقيم مع مركز ثقلها كما بالشكل :

3- عند ركل كرة القدم أسفل مركز ثقلها أو فوق مركز ثقلها كما بالشكل :

علل لما يأتي :

1- العزم كمية متجهة .

2- يمكن الحصول على قيم متعددة لعزم القوة رغم ثبات مقدار القوة .

3- يصعب فك صامولة باستخدام مفتاح صغير .

4- تستخدم مطرقة مخليبية ذات ذراع طويلة لسحب مسمار من قطعة خشب .

أو يلزم استخدام عصا طويلة لتحريك صخرة كبيرة .

أو استخدام مفتاح ذا ذراع طويلة عند فتح صواميل إطارات السيارات .

أو يوضع مقبض الباب عند الطرف البعيد عن محور الدوران الموجود عند مفصلاته .

5- لا يدور أو يتزن الجسم الصلب عندما يكون خط عمل القوة المؤثرة عليه ماراً بمحور الدوران .


أو لا يمكنك فتح باب غرفة مقفل بالتأثير عليه بقوة تمر بمحور الدوران مهما كانت القوة .

6- لا يدور أو يتزن الجسم القابل للدوران عندما يكون خط عمل القوة موازياً لذراع القوة .


7- لا يدور أو يتزن الجسم القابل للدوران عندما يكون خط عمل القوة موازياً لمحور الدوران .

8- حدوث الأتزان الدوراني للجسم المعلق حول مركز ثقله .

## تطبيقات على عزم القوة





- مثال 1 :** ساق متجانسة طولها (100 cm) وزنها (60 N) تؤثر عليها ثلاث قوى .  
 أ) احسب محصلة العزوم على الساق :  
 ب) أستنتج اتجاه دوران الساق :




- مثال 2 :** ساق من الحديد متجانسة طولها (6 m) وزنها (100 N) يحملها شخصين فإذا علمت أن (A) يبعد عن منتصفها (2 m) و (B) يبعد عن منتصفها (3 m) . احسب الوزن الذي يحمله كل منهما :

- مثال 3 :** ساق معدني متجانس طوله (8 m) ووزنه (40 N) يستند بإحدى نفاطه على رأس مدبب علق في إحدى نهايته ثقل قدره (40 N) فإذا اتزن القضيب أفقياً . احسب بعد نقطة الإسناد عن الثقل المعلق .




- مثال 4 :** بالشكل القرص لا يدور . احسب الكتلة عند النقطة (C) :



**مثال 5 :** الشكل المجاور يمثل ساق متجانسة طولها  $m (6)$  وزنها  $N (100)$  ترتكز على حاجز وتؤثر فيها قوتان للأسفل  $F_1 = (400)\text{ N}$  و  $F_2$  مجهولة والنظام في حالة اتزان .  
 أ ) احسب عزم الدوران للقوة  $(F_1)$  :

ب ) احسب مقدار القوة  $(F_2)$  :




**مثال 6 :** أ ) احسب مقدار عزم القوة لكل من وزني الفتاة والولد الجالسين على اللوح المتأرجح الموضح في الشكل المقابل بإهمال وزن اللوح.

ب ) احسب المسافة التي يجب أن تفصل بين الفتاة الجالسة يميناً ومحور

ارتكاز اللوح المتأرجح عندما يساوي وزن الفتاة  $(400\text{ N})$  والنظام في حالة اتزان.

**مثال 7 :** في الشكل المقابل : ساق طوله يساوي  $22\text{ cm}$  وكل مربع بالساق يساوي  $1\text{ cm}$  .  
 احسب مقدار محصلة عزم القوتين عند كل محور ارتكاز. وحدد اتجاه دوران الساق.





## عزم الازدواج

قوتين متساويتين في المقدار و متوازيتين و متعاكستين بالاتجاه وليس لهما خط عمل واحد

الازدواج

$$\vec{C} = \vec{r}_1 + \vec{r}_2$$

محصلة عزم قوتين متساويتين و متوازيتين و متعاكستين في الاتجاه


عزم الازدواج

$$\vec{C} = \vec{F} \times \vec{d}$$

أو حاصل ضرب مقدار أحد القوتين في المسافة العمودية بينهما

عزم الازدواج	عزم القوة	وجه المقارنة
المسافة العمودية بين القوتين	المسافة بين القوة ومحور الدوران	طول ذراع


\*\* أستنتج أن عزم الازدواج يساوي حاصل ضرب مقدار أحدي القوتين بالمسافة العمودية بينهما :



\*\* العوامل التي يتوقف عليها عزم الازدواج :

\*\* عزم الازدواج الذي يخضع له جسم قابل للدوران حول محور يمر بمنتصفه يساوي ..... عزم إحدى القوتين

\*\* من التطبيقات على الازدواج :



علل لما يأتي :

1- سهولة فك البراغي عند استخدام مفك له قاعدة ذات قطر كبير .

2- مفتاح فك الصواميل يكون خاضعا لازدواج يعمل على إدارته بالرغم من إننا نشاهد قوة وحيدة تؤثر عليه .

3- لا يتزن أو يدور الجسم القابل للدوران حول محور تحت تأثير قوتين متوازيتين ومتضادتين في الاتجاه .

ماذا يحدث مع ذكر السبب :

1- لجسم عندما تؤثر عليه قوتين متساويتين بالمقدار ومتضادتان بالاتجاه وليس لهما خط عمل واحد.


الحدث :

السبب :

2- عندما يقع الجسم تحت تأثير ازدواجان متساويان مقداراً ومتضادان اتجاهاً.

الحدث :

السبب :



مثال 1 : مفك قطر مقبضه ( 3 cm ) وعرض رأس المفك الذي يدخل في شق البرغي ( 7 mm )

استخدم لتثبيت البرغي في لوح خشبي و ذلك بالتأثير في مقبضه بواسطة اليد بقوتين متساويتين

في المقدار ( 49 N ) ومتعاكستين في الاتجاه . احسب :

أ ) عزم الازدواج المؤثر في مقبض المفك :


ب) مقدار القوة التي تؤدي إلى دوران البرغي المراد تثبيته :

مثال 2 : قوتان متساويتين قيمة كل منهما ( 50 N ) تؤثران على مسطرة خشبية قابلة للدوران حول محور

في منتصفها طولها ( 20 cm ) .

أ ) احسب مقدار عزم الازدواج المؤثر في المسطرة ويجعلها تدور حول محورها .

ب) ماذا تفعل لكي تتزن المسطرة ولا تدور حول محورها .



مثال 3 : في الشكل : تؤثر قوتين متساويتين في المقدار (  $F_1 = F_2 = 20 N$  )

على ساق معدنية منتظمة ومتجانسة قابلة للدوران حول نقطة ( o ) في منتصفها

والمسافة من طرف الساق إلى منتصفها تساوي ( 50 cm ) . احسب :


أ ) عزم كلا من القوتين على الساق :

ب) عزم الازدواج المؤثر على الساق :

ج) أستنتج هل الساق يدور أم لا :


## الدرس ( 2 - 2 ) : القصور الذاتي الدوراني

وجه المقارنة	القصور الذاتي	القصور الذاتي الدوراني
التعريف	مقاومة الجسم لتغيير في حركته الخطية	مقاومة الجسم لتغيير في حركته الدورانية
نوع حركة الجسم		
المطلوب لتغيير حالة الجسم		
وحدة القياس		
العوامل التي يتوقف عليها		



- \*\* كلما زادت المسافة بين كتلة الجسم ومحور الدوران يزداد .....
- \*\* أرجح قلمك بين أصابعك إلى الأمام وإلى الخلف ثم قارن سهولة الدوران عند أرجحته من نقطة في منتصفه وعند أرجحته من أحد طرفيه في أي الحالتين الدوران يكون أسهل؟ .....

وجه المقارنة	مضرب البيسبول ذي الذراع الطويلة	مضرب البيسبول ذي الذراع القصيرة
القصور الذاتي الدوراني		
ميله للبقاء متحركاً		
زيادة سرعته أثناء دورانه		
سهولة الحركة الدورانية		
إمكانية إيقافه أثناء دورانه		



- علل لما يأتي :
- 1- دوران الجسم في الحالة الأولى وعدم دورانه في الحالة الثانية في الشكل :
- الحالة الأولى :
- الحالة الثانية :

2- لا تمتلك كرتان القصور الذاتي الدوراني نفسه بالرغم من أن الكرتان لهما الكتلة نفسها والقطر نفسه ولكن واحدة منهما مصمتة والأخرى مجوفة وتدوران حول محور يمر بمركز كتلتها .

3- القصور الذاتي الدوراني للقرص المعدني أصغر من القصور الذاتي الدوراني للعجلة الرفيعة (الطوق) .

4- يسهل عليك الجري وتحريك قدمك إلى الأمام والخلف عند ثنيهما قليلا .

5- البندول القصير يتحرك إلى الإمام والخلف أكثر من تحرك البندول الطويل .


6- الناس والحيوانات ذات القوائم الطويلة مثل الزرافات والخيول والنعام والغزال فهي تتحرك بسرعة أقل من الحيوانات ذات القوائم القصيرة مثل الخيول الصغيرة أو الفئران أو الكلب .

7- البهلوان المتحرك على سلك رفيع يمد يديه ليحافظ على اتزانه او يمسك بيده عصا طويلة .

نظرية تقوم بحساب القصور الذاتي الدوراني حول محور مواز للمحور المار بمركز الثقل

نظرية المحور الموازي  
( نظرية هوغنس )

$$I = I_0 + md^2$$



( I ) تمثل

( I<sub>0</sub> ) تمثل




( m ) تمثل

( d ) تمثل

### ملاحظات هامة

- 1- القصور الذاتي الدوراني ليس بالضرورة كميته محددة للجسم نفسه .
- 2- القصور الذاتي الدوراني للجسم يكون أقل عندما تتوزع الكتلة نفسها داخل الجسم بتقارب عن محور الدوران .
- 3- القصور الذاتي الدوراني للجسم يكون أكبر عندما تتوزع الكتلة نفسها داخل الجسم بتباعد عن محور الدوران .
- 4- القصور الذاتي الدوراني لعصا تدور حول مركز ثقلها أقل منه عندما تدور حول محور يمر بأحد أطرافها .
- 5- جسم كتلته مهملة فإن ( I = 0 )
- 6- جسم يدور حول محور يمر بمركز ثقله فإن ( d = 0 ) وبالتالي ( I = I<sub>0</sub> )
- 7- بالنسبة للكتلة النقطية فإن ( I<sub>0</sub> = 0 ) وبالتالي ( I = md<sup>2</sup> )
- 8- جسم كروي يتدحرج على منحدر فإن ( d = 0 ) وبالتالي ( I = I<sub>0</sub> )

## تابع القصور الذاتي الدوراني



**مثال 1 :** احسب القصور الذاتي الدوراني للنظام المؤلف من كرتين

من الحديد متماثلتين كتلة الواحدة ( $m = 5 \text{ kg}$ ) ونصف قطرها

( $r = 5 \text{ cm}$ ) مثبتتين على طرفي عصا كتلتها ( $m = 2 \text{ kg}$ )

وطولها  $L$  المسافة بين مركزي كتلة الكرتين تساوي ( $2 \text{ m}$ ) يدور

النظام حول محور عمودي يمر بنقطة الوسط للعصا علما بان مقدار

القصور الذاتي الدوراني كل من الأجسام الثلاثة حول محور يمر بمركز ثقل كل منها يساوي :


$$\left( I_{\text{sphere}} = \frac{2}{5} mr^2 \right) \text{ وبالنسبة للعصا } \left( I_{\text{rod}} = \frac{1}{12} mL^2 \right)$$

**مثال 2 :** عصا طولها ( $1 \text{ m}$ ) وكتلتها ( $4 \text{ kg}$ ) قصورها الذاتي الدوراني حول محور يمر بمركز كتلتها ( $20 \text{ kg.m}^2$ )

أ) احسب القصور الذاتي الدوراني للعصا عندما تدور حول محور يمر بأحد طرفيها :


ب) احسب القصور الذاتي الدوراني للعصا عندما تدور حول محور يمر بمنتصفها :

مثال 3 : في الشكل المقابل :



أ) احسب القصور الذاتي الدوراني لعصا طولها (65 cm) وكتلتها مهملة تنتهي بكتلتين نقطيتين كل منها (0.3 kg) وتدور حول احد طرفيها. علما بأن  $(I_0 = MR^2)$

ب) احسب القصور الذاتي الدوراني للعصا نفسها عندما تدور حول مركز كتلتها :



ج) قارن بين نتيجة ( أ ) ونتيجة ( ب ) :

مثال 4 : أسطوانة مصممة كتلتها (3 kg) وقطرها (20 cm) وتتدرج على منحدر وحيث  $(I_0 = \frac{1}{2} MR^2)$

احسب القصور الذاتي الدوراني :

مثال 5 : قرص كبير أفقي يدور على محور رأسي يمر خلال مركزه اذا كان القصور الذاتي الدوراني للقرص


(4000 kg.m<sup>2</sup>) وعندما سقط عليه شخص كتلته (90 kg) من فرع شجرة معلق. استقر الشخص عند نقطة

على بعد (3 m) من محور الدوران. احسب عزم القصور الذاتي الجديد للمجموعة :

مثال 6 : اربعة كتل نقطية متساوية الكتلة كل منها (100 g) مثبتة عند اركان مربع بواسطة اطار خفيف

مهمل الوزن وطول ضلع المربع (80 cm).

احسب عزم القصور الذاتي الدوراني للأربعة جسيمات حول محور عمودي يمر بنقطة تقاطع قطري المربع :





## الوحدة الأولى : الحركة

### الفصل الثالث : كمية الحركة الخطية



## الدرس ( 3 - 1 ) : كمية الحركة والدفع

وجه المقارنة	طاقة الحركة الخطية	كمية الحركة الخطية
التعريف	الشغل الذي يبذله الجسم بسبب حركته أو حاصل ضرب نصف الكتلة في مربع السرعة	القصور الذاتي للجسم المتحرك أو حاصل ضرب الكتلة في متجه السرعة
القانون	$KE = \frac{1}{2} m \cdot v^2$	$\vec{P} = m \cdot \vec{v}$
وحدة القياس		
العوامل		
التغير فيها		
زيادة السرعة للمثلي		

\*\* يتساوى مقدار كمية الحركة لجسم كتلته ( m ) مع مقدار طاقة حركته عندما يتحرك الجسم بسرعة .....

\*\* كمية الحركة كمية ..... ولها نفس اتجاه .....

\*\* سيارتين لهما الكتلة نفسها وتسيران بسرعتين مختلفتين أى منهما يسهل إيقافها ولماذا ؟

السيارة : .....

السبب : .....

\*\* سيارتين مختلفتين في الكتلة وتسيران بنفس السرعة أى منهما يسهل إيقافها ولماذا ؟


السيارة : .....

السبب : .....

\*\* يمكن لجسمين مختلفين في الكتلة أن يكون لهما نفس كمية الحركة. لماذا ؟

السبب : .....

.....



\*\* أرسم متجهي السرعة وكمية الحركة للكتلة ( m ) في المربع :

\*\* نظام مؤلف من عدة كتل نقطية فإن كمية الحركة للنظام تساوى .....

\*\* محصلة متجهين  $\vec{P}_1$  و  $\vec{P}_2$  لهما الاتجاه نفسه تساوى ..... واتجاهها


\*\* محصلة متجهين  $\vec{P}_1$  و  $\vec{P}_2$  متعاكسين بالاتجاه تساوى ..... واتجاهها

$$\vec{I} = \vec{F} \cdot \Delta t$$

الدفع حاصل ضرب مقدار القوة في زمن تأثيرها على الجسم

الدفع


- 1- العوامل التي يتوقف عليها دفع القوة :
- 2- يقاس الدفع بحسب النظام الدولي للوحدات بوحدة .....
- 3- الدفع كمية ..... ولها اتجاه .....
- 4- كلما كان مقدار الدفع على جسم معين أكبر كان التغير في كمية الحركة .....
- 5- المساحة تحت منحنى ( القوة - الإزاحة ) تمثل .....
- 6- المساحة تحت منحنى ( القوة - الزمن ) تمثل .....
- 7- مقدار الدفع على جسم في مدة زمنية ما يساوي التغير في ..... في الفترة الزمنية نفسها.
- 8- مقدار الشغل المبذول في مدة زمنية ما يساوي التغير في ..... في الفترة الزمنية نفسها.



\*\*\* في الشكل : كرة سرعتها ( V ) تترد من الحائط في الاتجاه المعاكس بنفس السرعة :

1- التغير في كمية حركة الكرة يساوي : .....


2- التفسير : .....



\*\*\* في الشكل : جسم يتحرك حركة دائرية منتظمة بسرعة ( v ) يكمل نصف دورة :

1- الدفع الذي يتلقاه الجسم خلال نصف دورة يساوي : .....

2- التفسير : .....



\*\*\* أشرح ماذا يحدث في كرة قدم تتلقى دفع من اللاعب ؟

القوة الثابتة التي إذا أثرت في جسم لأحدثت الدفع نفسه الذي تحدته القوة المتغيرة

متوسط القوة

\*\* استنتج أن مشتق كمية الحركة بالنسبة للزمن يساوي محصلة القوي الخارجية مستخدماً القانون الثاني لنيوتن

## تابع كمية الحركة والدفن

علل لما يأتي :

1- الحالة ( A ) يكون تأثير قوة الدفع أقل .



2- الحالة ( B ) يكون تأثير قوة الدفع أكبر .

3- الدفع كمية متجهه .

4- كمية الحركة الخطية كمية متجهه .

5- الدفع له اتجاه القوة المؤثرة دائماً .

6- كمية الحركة له اتجاه السرعة المتجهة دائماً .

7- التغير في كمية الحركة الخطية يساوي صفر للجسم المتحرك بسرعة ثابتة المقدار وثابتة الاتجاه .

8- التغير في كمية الحركة الخطية لا يساوي صفر للجسم المتحرك بسرعة ثابتة المقدار ومتغيرة الاتجاه .

9- يستطيع لاعب الكاراتيه أن يكسر مجموعة من الألواح الخشبية بضربة بحرف يده .






10- السقوط على أرض خشبية أقل ألماً من السقوط على أرض إسمنتية .

11- قوة التأثير على كوب زجاجي عندما يسقط على أرض صلبة أكبر منه في حالة سقوطه على وسادة إسفنجية .

12- وجود أكياس هوائية داخل السيارات كوسائل أمان .

13- الدفاعات المطاطية التي تلف سيارات اللعب في مدينة الملاهي تحمي الأولاد أثناء التصادم .

\*\* أرسـم المنحنيات أو الخطوط البيانية الدالة على المطلوب بين العلاقات التالية :



مثال 1 : تدور الأرض حول الشمس بسرعة خطية مقدارها (30 km/s) وكتلة الأرض

تساوي (6 x 10<sup>24</sup> kg) .

أ) احسب كمية الحركة لمركز كتلة الأرض :

ب) هل كمية الحركة محفوظة ؟ مع تعليل إجابتك ؟

## تطبيقات على كمية الحركة والدفع

مثال 2 : سيارة كتلتها (1500 kg) تصطدم بجدار بالسرعة الابتدائية للسيارة ( $v_i = 4.5 \text{ m/s}$ ) باتجاه اليسار

وترتد بعد التصادم بالسرعة النهائية ( $v_f = 1.5 \text{ m/s}$ ) باتجاه اليمين . احسب :

أ ( الدفع الناشئ عن التصادم :

ب) زمن التصادم . إذا كان متوسط القوة المبذولة على السيارة هي ( $F = 180000 \text{ N}$ ) :

مثال 3 : سقطت كرة كتلتها (2 Kg) من السكون من ارتفاع (10 m) عن سطح الأرض في غياب قوة الاحتكاك .

أ ( احسب سرعة الكرة لحظة اصطدامها بسطح الأرض :

ب) إذا ارتدت الكرة عن سطح الأرض بسرعة ( $2 \text{ m/s}$ ) . احسب الدفع الذي تلقتة الكرة :

مثال 4 : كرة كتلتها (0.5 kg) اصطدمت بالأرض بسرعة ( $8 \text{ m/s}$ ) وارتدت بسرعة ( $4 \text{ m/s}$ ) .

فإذا أستمر الاصطدام زمن قدره ( $0.001 \text{ s}$ ) . احسب :

أ ( مقدار القوة المؤثرة في الأرض نتيجة هذا الاصطدام :

ب) الارتفاع الذي ستبلغه الكرة بعد ارتدادها من الأرض في غياب قوة الاحتكاك :

مثال 5 : يتحرك جسم كتلته (4 kg) بسرعة ( $10 \text{ m/s}$ ) أثرت فيه قوة ثابتة فانخفضت سرعته إلى ( $8 \text{ m/s}$ )

دون تغير اتجاهه خلال زمن مقداره ( $2 \text{ s}$ ) . احسب :


أ ( كمية الحركة الابتدائية :

ب) كمية الحركة النهائية :

ج) الدفع الذي تلقاه الجسم :

د) مقدار متوسط القوة المؤثرة :






**مثال 6 :** أثرت قوة متغيرة بانتظام على جسم ساكن كتله (3 Kg) . احسب :

أ) مقدار التغير في كمية حركة الجسم :

ب) مقدار التغير في سرعة الجسم :

**مثال 7 :** قوة متغيره تتمثل بالرسم البياني التالي تؤثر في جسم ساكن كتلته (2 kg) . احسب :




أ) الدفع عند نهاية كل مرحلة :

ب) دفع القوة الكلي :

ج) سرعة الجسم عند نهاية الثانية الرابعة :

د) سرعة الجسم عند نهاية مدة التأثير :


هـ) الطاقة الحركية في نهاية مدة التأثير :



**مثال 8 :** الخط البياني الموضح بالشكل يبين التغير في كمية الحركة لجسم

يتحرك في خط مستقيم على سطح أفقي أملس . احسب :


أ) الدفع الذي تلقاه الجسم في كل شكل من الاشكال التي امامك :



**مثال 9 :** جسم يتحرك بطاقة حركية مقدارها (150 J) وكمية حركة

مقدارها (30 kg.m/s) . احسب سرعة الجسم الخطية :

## الدرس ( 3 - 2 ) : حفظ كمية الحركة و التصادمات



\*\* في الشكل كرة بلياردو ساكنة (A) على سطح الطاولة الأملس وكرة متحركة (B) مشابهة لها تتحرك نحوها لتتصادم بها .

أ) ماذا يحدث لحركة الكرتان بعد التصادم :

ب) ماذا يحدث لكمية حركة الكرتان بعد التصادم :

ج) التفسير :

كمية الحركة للنظام في غياب القوى الخارجية تبقى ثابتة ولا تتغير

قانون بقاء كمية الحركة

علل لما يأتي :

1- إذا دفعت مقعد السيارة الأمامي فيما تجلس على المقعد الخلفي لا تحدث تغييرا في كمية حركة السيارة .  
أو لا يحدث تغير في كمية الحركة إلا في وجود قوة خارجية مؤثرة في الجسم أو النظام .

2- كمية الحركة هي كمية محفوظة في النظام المعزول .

3- النشاط الإشعاعي للذرات وتصادم السيارات وانفجار النجوم تمثل أنظمة تتصف ببقاء كمية الحركة .

4- عندما تؤثر قوة احتكاك على سيارة متحركة فإن النظام يتصف بعدم بقاء كمية الحركة .

5- الحركة الدائرية نظام يتصف بعدم بقاء كمية الحركة .

\*\* حاول أن تقف على زلاجة في حالة سكون وأحمل جسما له كتلة ما ثم اقفذ بالجسم إلى الأمام أو إلى الخلف .

أ) ماذا تلاحظ :


ب) ماذا تستنتج :

سرعة ارتداد المدفع :

\*\* ارتداد المدفع عند إطلاق القذيفة أحد تطبيقات :

\*\* القوة التي تؤثر في القذيفة لدفعها إلى الأمام ..... قوة ارتداد المدفع إلى الخلف ..... في الاتجاه

\*\* إذا تدافع جسمان كتلة الأول (m) وكتلة الثاني (3m) على سطح أملس فإن :  $\Delta \vec{P}_2 =$  .....



**\*\* أستنتج أن في نظام (مدفع - قذيفة) تكون سرعة الإطلاق وسرعة الارتداد متعاكستان في الاتجاه بإهمال كمية حركة الغاز بالنسبة إلى القذيفة :**

علل لما يأتي :

1- النظام المكون من المدفع والقذيفة قبل الإطلاق يكون ساكن أو كمية حركة له تساوي صفر .


2- سرعة ارتداد المدفع أقل من سرعة انطلاق القذيفة .

3- كتلة المدفع أو البندقية أكبر من كتلة القذيفة.

4- يرتد المدفع نحو الخلف عند إطلاق القذيفة خارج ماسورة المدفع باتجاه الأمام .

5- في النظام (مدفع - قذيفة) تبقى محصلة القوي الخارجية المؤثرة تساوي صفر وتكون كمية حركة النظام محفوظة

**\*\*\* خلال انفجار القذيفة في النظام مدفع قذيفة لا يتغير موضع ..... النظام .**



**مثال 1 :** كتلتان نقطيتان ( $m_1 = 1 \text{ kg} - m_2 = 2 \text{ kg}$ ) مربوطتان بخيط من النايلون وتضعطان زنبرك بينهما وموضوعان على سطح أفقي أملس عديم الاحتكاك عند حرق الخيط يتحرر الزنبرك ويدفع الكتلتين فتتحرك ( $m_1$ ) بسرعة ( $v_1' = 1.8 \text{ m/s}$ ) على المحور الأفقي بالاتجاه الموجب بينما تتحرك ( $m_2$ ) بسرعة متجهة ( $v_2'$ ) .

أ) هل كمية حركة النظام محفوظة ؟ علل أجبائك :

ب) احسب السرعة المتجهة ( $v_2'$ ) مقداراً واتجهاً :

**مثال 2:** يقف رجل كتلته ( $76 \text{ kg}$ ) على لوح خشبي طافي كتلته ( $45 \text{ kg}$ ) ثم خطا بعيداً عن اللوح الخشبي باتجاه

اليابسة بسرعة ( $2.5 \text{ m/s}$ ) . كم ستبلغ سرعة اللوح الخشبي :

## التصادمات


عملية تتم بين جسيمين لفترة زمنية قصيرة تكون القوة الخارجية المؤثرة مهملة بالنسبة للقوة الداخلية

التصادم

وجه المقارنة	التصادم المرن ( تام المرونة )	التصادم اللامرّن والتصادم اللامرّن كلياً
مثال		
التعريف	التصادم المرّن : تصادم تكون الطاقة الحركية للنظام محفوظة ولا ينتج تشوّه ولا يولد حرارة	التصادم اللامرّن : تصادم تكون الطاقة الحركية للنظام غير محفوظة ويتحول جزء لحرارة ويحدث تشوّه  التصادم اللامرّن كلياً : تصادم يلتحم فيه الجسمان معاً ويتحركان بسرعة واحدة
حدوث تشوّه		
تولد حرارة		
حركة الجسيمين بعد التصادم	.....	التصادم اللامرّن : ..... التصادم اللامرّن كلياً : .....
طاقة الحركة		
معادلة طاقة الحركة	معادلة طاقة الحركة في التصادم المرّن : $KE_i = KE_f$ $\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2'^2$	معادلة طاقة الحركة في التصادم اللامرّن كلياً : $\Delta KE = KE_f - KE_i$ $= \left[ \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v'^2 \right] - \left[ \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \right]$
كمية الحركة		
معادلة كمية الحركة	معادلة كمية الحركة في التصادم المرّن : $m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$	معادلة كمية الحركة في التصادم اللامرّن : $m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$  معادلة كمية الحركة في التصادم اللامرّن كلياً : $m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v'$
سرعة الجسمين بعد التصادم	سرعة الجسم الأول بعد التصادم المرّن : $V_1' = \frac{2m_2 v_2 + (m_1 - m_2) v_1}{(m_1 + m_2)}$  سرعة الجسم الثاني بعد التصادم المرّن : $V_2' = \frac{2m_1 v_1 - (m_1 - m_2) v_2}{(m_1 + m_2)}$	سرعة الجسمين معاً بعد التصادم اللامرّن كلياً : $V' = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{(m_1 + m_2)}$

## البندول القذفي

جهاز يستخدم لقياس سرعة القذائف السريعة مثل الرصاصة



\*\* يقوم مبدأ عمل البندول القذفي على

علل لما يأتي :


1- يعتبر النظام المنفجر والأجسام المتصادمة نظاماً معزولاً أو كمية حركة للنظام محفوظة عند حدوث عملية التصادم

2- يحدث فقد في طاقة حركة جملة جسمين في التصادم اللامرن .


3- تصادم كرتين من المطاط يعتبر تصادماً مرناً .

ماذا يحدث عند حدوث التصادم في الحالات الآتية


1- إذا كانت الكتلة المتحركة ( $m_1$ ) أكبر من الكتلة الساكنة ( $m_2$ ) :



2- إذا كانت الكتلة المتحركة ( $m_1$ ) أصغر من الكتلة الساكنة ( $m_2$ ) :



3- إذا كانت الكتلة المتحركة ( $m_1$ ) تساوي الكتلة الساكنة ( $m_2$ ) :



\*\* تدافع صديقان عندما كانا في صالة التزلج فتحركا في اتجاهين متعاكسين

وكانت كتلة أحدهما ( $50 \text{ kg}$ ) وتحرك بسرعة ( $3 \text{ m/s}$ ) وكتلة الآخر ( $75 \text{ kg}$ )

وتحرك بسرعة ( $2 \text{ m/s}$ ). فان التغير في كمية حركة الشخص الأول

تساوي ..... والشخص الثاني تساوي

والتغير في كمية حركة الصديقين معاً تساوي

\*\* ملاحظة هامة : إذا تدافع جسمان فإن :

# الجسم الأول يؤثر على الجسم الثاني بدفع = الدفع الذي يتلقاه الجسم الأول من الجسم الثاني،

$$\text{ولكن بعكس الاتجاه } (\vec{I}_{1 \rightarrow 2} = -\vec{I}_{2 \rightarrow 1})$$

# التغير في كمية الحركة الخطية للجسم الأول = التغير في كمية الحركة الخطية للجسم الثاني،

$$\text{ولكن بعكس الاتجاه } (\Delta \vec{P}_2 = -\Delta \vec{P}_1)$$

## تطبيقات على التصادمات

**مثال 1 :** كرة كتلتها (0.6 kg) وتتحرك بسرعة (10 m/s) , تصادمت مع كرة أخرى ساكنة كتلتها (0.4 kg)

فإذا كان النظام معزولاً، وبفرض أن هذا التصادم هو تصادم تام المرونة. المطلوب :

أ) احسب سرعة الكرتين بعد التصادم مباشرة :

.....

.....

.....

.....

ب) صف اتجاه حركة الكرتين بعد التصادم :

ج) صف اتجاه حركة الكرتين بعد التصادم إذا كانت الكرة الثانية تتحرك بعكس الكرة الأولى بسرعة ( 5 m/s ) :

.....

.....

.....

.....

**مثال 2 :** تصادمت كرة كتلتها (0.25 kg) وتتحرك بسرعة مقدارها (6 m/s) مع كرة أخرى ساكنة كتلتها

(0.95 kg) تصادماً لأمرناً، إذا كان النظام معزولاً وتحركت الكرة الثانية بعد التصادم مباشرة بسرعة

مقدارها (3 m/s) . فاحسب سرعة الكرة الأولى بعد التصادم :

.....

.....

.....

**مثال 3 :** سمكة كبيرة كتلتها (5 kg) تتحرك بسرعة (1 m/s) باتجاه سمكة صغيرة ساكنة كتلتها (1 kg) . احسب :

أ) سرعة السمكة الكبيرة بعد ابتلاعها السمكة الصغيرة :

.....

.....

ب) سرعة السمكة الكبيرة في حال كانت السمكة الصغيرة تسبح بعكس اتجاه السمكة الكبيرة بسرعة (4 m/s) :

.....

.....




**مثال 4 :** كرتان من الصلصال تتصادمان تصادماً لأمرنا كليا كتلة الأولى (0.5 kg) وتتحرك لليمين بسرعة (4 m/s)

والكرة الثانية كتلتها (0.25 kg) وتتحرك نحو اليسار بسرعة (3 m/s) . احسب :

أ) سرعة النظام بعد التصادم :

ب) احسب مقدار الطاقة الحركية للجسيمين معاً بعد التصادم مباشرة :




**مثال 5 :** أطلقت رصاصة كتلتها (200 g) بسرعة (140 m/s) على

لوح سميك من الخشب كتلته (6.5 Kg) ساكن فإذا استقرت الرصاصة

داخل لوح الخشب وتحركت المجموعة على سطح أفقي أملس .

احسب سرعة النظام المؤلف من الكتلتين بعد التصادم :



**مثال 6 :** أطلقت رصاصة كتلتها (20 g) على بندول قذفي ساكن كتلته (5 kg) فارتفع

مسافة (10 cm) عن المستوي الأفقي بعدما انغرزت الرصاصة في داخله . احسب :


أ) حدد نوع التصادم . مع ذكر السبب :

ب) سرعة جملة الجسيمين معاً :

ج) سرعة الرصاصة عند إطلاقها :

د) الفقد في طاقة الحركة (الطاقة المبددة) :

## تابع تطبيقات على التصادمات



مثال 7 : كرتان كتله الأولى ( $m_1 = 200 \text{ g}$ ) وكتلة الثانية ( $m_2 = 400 \text{ g}$ ) معلقتان

ومتزنتان بخيطيين طول كل خيط ( $1 \text{ m}$ ) بجانب بعضهما البعض سحبت الكرة الثانية

بحيث بقي الخيط مشدوداً وصنع زاوية ( $60^\circ$ ) مع الخيط العمودي وتركت للتحرك من

السكون نحو الكرة ( $m_1$ ) الساكنة . احسب :

أ ) سرعة الكرة ( $m_2$ ) قبل لحظة التصادم :

.....

.....

ب) سرعة الكرتين بعد التصادم بافتراض أن التصادم مرن :

.....

.....

.....

.....


ج) الارتفاع عن المستوي المرجعي المار بمركز ثقلهما الذي ستصل إليه كلا الكرتين بعد التصادم :

.....

.....

.....

.....



مثال 8 : كرة حديدية مصمتة كتلتها ( $2.5 \text{ kg}$ ) مربوطة بخيط عديم الوزن لا يتمدد طوله

( $100 \text{ cm}$ ) ومثبت بطرفه الآخر بشكل رأسي فوق سطح أملس وسحبت الكرة ليصبح

الحبل أفقياً مشدوداً وتركت لتتحرك من السكون لتتصادم تصادماً مرناً بمكعب حديدي ساكن

كتلته ( $5 \text{ kg}$ ) . احسب : أ ) سرعة الكرة قبل لحظة اصطدامها بالمكعب :

.....

.....

.....

ب) احسب سرعة الكرة والمكعب مباشرة بعد التصادم :

.....

.....

.....

## العلاقات الرياضية المستخدمة في المنهج

التحويلات			
$gm \times 10^{-3} \rightarrow Kg$ $mg \times 10^{-6} \rightarrow Kg$	الكتلة	$cm \times 10^{-2} \rightarrow m$ $mm \times 10^{-3} \rightarrow m$	الطول
$min \times 60 \rightarrow S$ $hr \times 3600 \rightarrow S$	الزمن	$cm^2 \times 10^{-4} \rightarrow m^2$ $mm^2 \times 10^{-6} \rightarrow m^2$	المساحة
$Km/h \times \frac{1000}{3600} \rightarrow m/s$	السرعة	$cm^3 \times 10^{-6} \rightarrow m^3$ $mm^3 \times 10^{-9} \rightarrow m^3$	الحجم

قوانين الشغل والطاقة	
$W = \vec{F} \cdot \vec{d} = F \cdot d \cos \theta$	الشغل الذي تبذله قوة في إزاحة جسم أفقياً
$W_w = mgh$	الشغل الناتج عن وزن جسم عند إزاحته رأسياً
$W = \frac{1}{2} F \Delta X = \frac{1}{2} K \cdot \Delta X^2$	الشغل الناتج عن وزن كتلة معلقة في نابض مرن
$KE = \frac{1}{2} mV^2$	الطاقة الحركية للجسم
$PE_g = mgh$	الطاقة الكامنة الثقالية
$PE_e = \frac{1}{2} F \Delta X = \frac{1}{2} K \Delta X^2$	الطاقة الكامنة المرنة في النابض
$PE_e = \frac{1}{2} C \Delta \theta^2$	الطاقة الكامنة المرنة في خيط مطاطي
$v = \sqrt{\frac{2KE}{m}}$	سرعة الجسم بدلالة طاقته الحركية
$v = \sqrt{2gh}$	السرعة النهائية لجسم بدلالة الإزاحة الرأسية
$ME = KE + PE$	الطاقة الميكانيكية للجسم
$E = ME + U$	الطاقة الكلية للجسم
$W = \Delta KE$	علاقة الشغل والطاقة الحركية
$W_w = -\Delta PE$	علاقة الشغل والطاقة الكامنة الثقالية
$\Delta PE = -\Delta KE$	علاقة الطاقة الحركية والطاقة الكامنة الثقالية
$ME = \frac{1}{2} mv^2 + mgL (1 - \cos \theta)$	الطاقة الميكانيكية للبندول البسيط
$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2gL (1 - \cos \theta)}$	السرعة النهائية للبندول عند موضع الاستقرار







وجود الاحتكاك ( سطح مائل خشن )	غياب الاحتكاك ( سطح مائل أملس )	
$\Delta ME \neq 0$ $\Delta ME = + W_f$ $ME_f - ME_i = - f d$ $(KE_f + PE_f) - (KE_i + PE_i) = - f d$	$\Delta ME = 0$ $ME_i = ME_f$ $KE_i + PE_i = KE_f + PE_f$	التغير في الطاقة الميكانيكية ( $\Delta ME$ )
$W_w = \pm m g h$ $W_f = - f d$ $W_T = W_w + W_f$	$W_w = \pm m g h$ $W_f = 0$ $W_T = W_w$	حساب الشغل الكلي ( $W_T$ )


قوانين ميكانيكا الدوران	
$\vec{\tau} = \vec{F} \times \vec{d} = Fd \sin \theta$	عزم القوة ( عزم الدوران )
$\vec{C} = \vec{F} \times \vec{d}$	عزم الازدواج
$\vec{\tau}_{C.W} = \vec{\tau}_{A.C.W}$	العزوم المتزنة
$I = I_0 + md^2$	نظرية المحور الموازي ( القصور الذاتي الدوراني )

قوانين حفظ كمية الحركة والتصادمات	
$\vec{P} = m \cdot \vec{v}$	كمية الحركة الخطية
$\vec{I} = \Delta \vec{P} = \vec{F} \cdot \Delta t = m \cdot \Delta v$	الدفع الذي يتلقاه الجسم
$m_1 \cdot v_1' = - m_2 \cdot v_2'$	سرعة الارتداد للمدفع وسرعة الإطلاق للقذيفة


التصادم اللامرن ( اللامرن كياً )	التصادم المرن ( تام المرنة )	
$\Delta KE = \left[ \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v'^2 \right] - \left[ \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \right]$	$KE_i = KE_f$	طاقة الحركة
$v' = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{(m_1 + m_2)}$	$v'_1 = \frac{2m_2 v_2 + (m_1 - m_2) v_1}{(m_1 + m_2)}$ $v'_2 = \frac{2m_1 v_1 - (m_1 - m_2) v_2}{(m_1 + m_2)}$	سرعة الجسمين بعد التصادم

## الرسوم البيانية في المنهج







القصور الذاتي الدوراني والكتلة  
لعدة كتل نقطية  
الميل يمثل  $d^2$




القصور الذاتي الدوراني ومربع البعد  
لكتلة نقطية عن محور الدوران  
الميل يمثل  $m$




الدفع والقوة المؤثرة




الدفع وزمن التأثير




كمية الحركة ومتجه السرعة




كمية الحركة وكتلة الجسم




التغير في كمية الحركة  
والقوة المؤثرة



التغير في كمية الحركة  
وزمن التأثير




التغير في كمية الحركة  
والتغير في متجه السرعة




التغير في كمية الحركة  
وكتلة الجسم




متوسط القوة المؤثرة وزمن تأثيرها  
أثناء الدفع




القوة المؤثرة وزمن تأثيرها  
عند ركل لاعب لكرة قدم




القوة المؤثرة وزمن تأثيرها  
عند ثبات الدفع




كمية الحركة والزمن لجسم  
يتحرك بعجلة تباطؤ غير منتظمة




كمية الحركة والزمن لجسم  
يتحرك بعجلة تباطؤ منتظمة



كمية الحركة والزمن لجسم  
يتحرك بعجلة تسارع غير منتظمة



كمية الحركة والزمن لجسم  
يتحرك بعجلة تسارع منتظمة



كمية الحركة والزمن لجسم  
يتحرك بسرعة ثابتة