



الفيزياء

الكورس الأول

غير محلولة

2024 - 2023
UULA.COM

12


UULA



الفيزياء

الكورس الأول

غير محلولة

2024 - 2023

UULA.COM

12



UULA

حقق هدفك الدراسي

ريح بالك وارفع مستوى دراستك مع المذكرة الشاملة والفيديوهات التي تشرحها والاختبارات التي تدربك في منصة علا



نخبة المعلمين يجابونك بأسرع وقت

ما فهمت؟ تواصل مع أقوى المعلمين واحصل على شرح لسؤالك

دروس يشرحها أقوى معلمي الكويت

فيديوهات مبسطة قصيرة تشرح لك كل شيء خطوة بخطوة

تفوق في القصير والفايل مع نماذج اختبارات سابقة

نماذج اختبارات سابقة مشروحة بالكامل تجهزك لاختبارتك



اكتشف عالم التفوق مع منصة علا

لتشارك بالمادة وتستمع بالشرح المميز صور أو اضغط على رمز الQR

المعلق



هذه المذكرة تغطي المادة كاملة.

في حال وجود أي تغيير للمنهج أو تعليق جزء منه يمكنكم مسح رمز QR للتأكد من المقرر.



المنقذ



أول ما تحتاج مساعدة بالمادة ، المنقذ موجودا!

صور ال QR بكاميرا التلفون أو اضغط عليه إذا كنت تستخدم المذكرة من جهازك و يطلع لك فيديو يشرح لك.



قائمة المحتوى

01

الطاقة

5
16
29

الشغل
الشغل و الطاقة
حفظ (بقاء) الطاقة

02

ميكانيكا الدوران

44
54
60

عزم القوة
القصور الذاتي الدوراني
ديناميكا الدوران

03

كمية الحركة الخطية

74
83

كمية الحركة و الدفع
حفظ كمية الحركة الخطية (التصادمات)





إمكانية إنجاز شغل

الطاقة

هل تعلم؟!

- إذا دفع عامل صندوق من دون تحريكه فإنه لا يبذل شغلا
- إذا وقفت حاملا حقيبتك الثقيلة على جانب الطريق فقد تشعر بالتعب ولكنك لم تبذل شغلا

الشغل بمفهومه الفيزيائي لا يعني بذل الجهد أو التعب

عملية تقوم فيها قوة مؤثرة بإزاحة جسم في اتجاهها

الشغل

علل لما يأتي :

❑ إذا دفع عامل صندوق من دون تحريكه فإنه لا يبذل شغلا

❑ إذا وقفت حاملا حقيبتك الثقيلة على جانب الطريق فقد تشعر بالتعب ولكنك لم تبذل شغلا



$$W = \vec{F} \cdot \vec{d}$$

$$W = F d \cos \theta$$

الرمز	الاسم	الوحدة الدولية
W	الشغل	J
F	القوة	N
d	الإزاحة	m
θ	الزاوية بين القوة والإزاحة	درجة

حاصل الضرب العددي لمتجهي القوة و الإزاحة

الشغل

علل لما يأتي :

❑ الشغل كمية عددية و ليس كمية متجهة

اذكر العوامل التي يتوقف عليها مقدار الشغل

يقاس الشغل بوحدة قياس تسمى الجول J وهي تكافئ $N.m$


هو الشغل الذي تبذله قوة مقدارها $1 N$ لتحريك الجسم في اتجاهها مسافة $1 m$ **الجول**

ما المقصود بكل من :


الشغل المبذول في تحريك جسم $= 10 J$

ارسم العلاقات البيانية بين كل مما يلي :

العلاقة بين الشغل - الإزاحة



العلاقة بين الشغل - القوة



القوة

قوة غير منتظمة

متغيرة المقدار أو الاتجاه أو كليهما
مثال : قوة الشد في الزنبرك

قوة منتظمة

ثابتة المقدار والاتجاه
مثال : قوة الجاذبية الأرضية



UULA

صفوة معلمى الكويت

الشغل الناتج عن قوة منتظمة

حالات تغير الزاوية بين القوة والإزاحة :


1. إذا كانت القوة و الإزاحة في نفس الاتجاه

$$\theta = \text{zero}$$

$$\cos(0) = 1$$

$$W = Fd$$

- تكون أكبر قيمة للشغل
- الشغل = قيمة موجبة




2. إذا كانت الزاوية بين القوة و الإزاحة

$$0 < \theta < 90^\circ$$

$$\cos \theta = +$$

$$W = F d \cos \theta$$

- تكون قيمة الشغل موجبة




3. إذا كانت القوة عمودية على اتجاه الإزاحة

$$\theta = 90^\circ$$

$$\cos(90) = \text{zero}$$

$$W = \text{zero}$$

- تندعم قيمة الشغل




4. إذا كانت الزاوية بين القوة و الإزاحة

$$90^\circ < \theta < 180^\circ$$

$$\cos \theta = -$$

$$W = F d \cos \theta$$

- تكون قيمة الشغل سالبة




5. إذا كانت القوة اتجاهها معاكس لاتجاه الإزاحة

$$\theta = 180^\circ$$

$$\cos(180) = -1$$

$$W = - Fd$$

- الشغل = قيمة سالبة



الشغل الموجب و السالب

- إذا كان الشغل قيمة موجبة يسمى شغلا منتجا أو شغلا منجزا أو شغلا مفيدا أو شغلا مساعدا و ينتج عنه زيادة في سرعة الجسم
- إذا كان الشغل قيمة سالبة يسمى شغلا معيقا أو شغلا مقاوما و ينتج عنه نقصان في سرعة الجسم

قوة منتظمة مقدارها 10 N تعمل على صندوق , وضع فوق سطح أملس لينزلق ازاحة مقدارها 2 m , إذا كانت القوة في نفس اتجاه الإزاحة , احسب الشغل الناتج و حدد نوعه

قوة منتظمة مقدارها 10 N تعمل على صندوق , وضع فوق سطح أملس لينزلق ازاحة مقدارها 2 m , إذا كانت القوة في عكس اتجاه الإزاحة , احسب الشغل الناتج و حدد نوعه


يدفع شخص عربة بقوة 45 N تصنع زاوية 40° مع المحور الأفقي , احسب الشغل الناتج عن القوة إذا دفعت العربة مسافة 15 m

محصلة الشغل لمجموعة من القوى المنتظمة

يتطلب ذلك إيجاد محصلة القوى المؤثرة على الجسم ليكون الشغل مساويا لحاصل الضرب العددي لمحصلة القوى و الإزاحة أي :


$$W_{\text{NET}} = F_{\text{NET}} \cdot d$$

تحرك الجسم الموضح بالشكل ازاحة مقدارها 2 m غربا , احسب الشغل



الشغل الناتج عن قوة منتظمة على مسار منحنى

عندما يتحرك جسم بتأثير قوة منتظمة من النقطة A إلى النقطة B على مسار منحنى كما بالشكل ، فإن الشغل في هذه الحالة لا يتوقف على المسار الذي سلكه الجسم



الشغل المبذول من وزن الجسم عندما يتحرك الجسم في مجال الجاذبية الأرضية (في مسار رأسي)



$$W = F d$$

$$F = m g , \quad d = h$$


$$W = m g h$$

الرمز	الاسم	الوحدة الدولية
W	الشغل	J
m	الكتلة	Kg
h	الارتفاع	m
g	عجلة الجاذبية الأرضية	10 m/s ²


اذكر العوامل التي يتوقف عليها الشغل الناتج من وزن الجسم عند إزاحته رأسيًا

ارسم العلاقات البيانية بين كل مما يلي :

العلاقة بين الشغل - الكتلة



العلاقة بين الشغل - الارتفاع



اسقط جسم كتلته 5 Kg من ارتفاع 10 m ، احسب الشغل الناتج عن قوة الجاذبية الأرضية


صفوة المعلمة الكويت



حساب الشغل الناتج عن الوزن عندما يتحرك الجسم بين نقطتين مختلفتين في الارتفاع


عندما يتحرك جسم بين نقطتين مختلفتين في الارتفاع فإن :

$$W = m g (h_A - h_B)$$




ملاحظات


- عندما يتحرك الجسم إلى نقطة أدنى من موضعة الابتدائي $h_B < h_A$ يكون الشغل الناتج عن الوزن موجبا



- عندما يتحرك الجسم إلى نقطة أعلى من موضعة الابتدائي $h_B > h_A$ يكون الشغل الناتج عن الوزن سالبا







- إذا تحرك الجسم بين نقطتين على المستوى الرأسي نفسه , فإن الشغل المبذول من الوزن يساوي صفرا



$$h_B = h_A$$

ما نوع الشغل الناتج عن وزن الجسم إذا تحرك الجسم من النقطة A إلى النقطة B كما بالأشكال الموضحة



يحمل الولد في الشكل كرة كتلتها 1.5 Kg خارج نافذة غرفته التي ترتفع عن الأرض 8 m

ما هو مقدار الشغل المبذول على الكرة نتيجة إمساك الولد لها

أفلت الولد الكرة لتسقط , ما هو مقدار الشغل الناتج عن قوة الجاذبية الأرضية إذا تحركت مسافة 3 m

ما هو مقدار الشغل الناتج عن قوة الاحتكاك مع الهواء خلال سقوط الكرة 3 m علما أن مقدار قوة الاحتكاك 1 N

احسب الشغل الكلي المبذول على الكرة نتيجة القوى المؤثرة فيها

حالات يندم عندها مقدار قيمة الشغل :

1. إذا تحرك الجسم بسرعة منتظمة يندم قيمة الشغل



علل لما يأتي :

الشغل المبذول عند تحريك جسم بسرعة منتظمة يساوي صفر

2. إذا أثرت على الجسم عدة قوى متزنة , ينعدم قيمة الشغل

علل لما يأتي :

❶ الشغل الناتج عن عدة قوى متزنة مؤثرة على جسم يساوي صفر

3. إذا أثرت القوة على الجسم ولم تسبب له إزاحة (الإزاحة = صفر) , ينعدم قيمة الشغل

علل لما يأتي :


❶ دفع عامل لصندوق دون تحريكه فإن الشغل الناتج يساوي صفر

★ ممكن أن يأتي السؤال بصيغة أخرى: عند حمل طالب لحقيبة مدرسية و لم يتحرك بها فإن الشغل الناتج يساوي صفر

4. إذا تحرك الجسم على مسار مغلق فإن إزاحة الجسم تساوي صفر وبالتالي يصبح الشغل مساويا صفر

علل لما يأتي :

❶ ينعدم الشغل المبذول على جسم عندما يتحرك على مسار دائري مغلق



5. إذا تحرك الجسم بين نقطتين على المستوى الرأسي نفسه , فإن الشغل المبذول من الوزن يساوي صفر , لأن محصلة الإزاحة الرأسية ($h_A - h_B$) تساوي صفر

6. إذا كانت الزاوية بين القوة والإزاحة تساوي 90° (القوة عمودية على الإزاحة) يصبح الشغل مساوي صفر

علل لما يأتي :

❶ الشغل المبذول من وزن السيارة عندما تتحرك على طريق أفقي يساوي صفر

❶ الشغل المبذول من الوزن عند حمل حقيبة ثقيلة والتحرك بها على مسار أفقي يساوي صفر




الشغل المبذول من وزن جسم عندما يتحرك على مستوى أملس يميل على المستوى الأفقي بزواوية

القوة الوحيدة المؤثرة على الجسم = $mg \sin \theta$


$$h = d \sin \theta$$

$$W = mgh$$




الرمز	الاسم	الوحدة الدولية
W	الشغل	J
m	الكتلة	Kg
h	ارتفاع المستوى المائل	m
g	عجلة الجاذبية الأرضية	10 m/s ²
d	طول المستوى المائل	m
θ	زاوية ميل المستوى المائل	درجة

وضع صندوق كتلته **100 g** على مستوى أملس يميل بزواوية **30°** , احسب الشغل الناتج عن وزن الصندوق إذا كان ارتفاع المستوى المائل **25 cm**





وضع صندوق كتلته **100 g** على مستوى أملس يميل بزواوية **30°** , احسب الشغل الناتج عن وزن الصندوق إذا تحرك على المستوى المائل مسافة **AB = 50 cm**






احسب مقدار الشغل من الرسوم البيانية التالية







الشغل الناتج عن قوة متغيرة

قانون هوك


تناسب قوة الشد المؤثرة في نابض طردياً مع مقدار الاستطالة الحادثة

$$F \propto \Delta x$$

$$F = K \Delta x$$



الرمز	الاسم	الوحدة الدولية
F	قوة الشد في نابض	N
K	ثابت النابض (هوك)	N/m
Δx	الاستطالة	m



حساب الشغل الناتج عن قوة الشد في نابض

$$W = \text{المساحة تحت المنحنى} = \frac{1}{2} \times \text{القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$W = \frac{1}{2} F \Delta x$$

$$F = K \Delta x$$


$$W = \frac{1}{2} K \Delta x^2$$

الرمز	الاسم	الوحدة الدولية
W	الشغل	J

❏ اذكر العوامل التي يتوقف عليها الشغل الناتج عن كتلة معلقة في نابض

ارسم العلاقات البيانية بين كل مما يلي :

❏ العلاقة بين الشغل - الاستطالة الحادثة في نابض



ماذا يحدث في الحالات التالية :

❏ للشغل إذا زادت الاستطالة إلى المثلين

❏ للشغل إذا قلت الاستطالة إلى النصف



❏ زنبرك مثبت من أحد طرفيه، ثابت مرونته يساوي 40 N/m ، ما هو مقدار الشغل الذي يجب بذله لجعله يستطيل 2 cm عن طوله الأصلي

❏ إذا كان مقدار الشغل اللازم لجعل زنبرك يستطيل 8 cm عن طوله الأصلي 400 J ، احسب مقدار ثابت مرونة الزنبرك



تدرب و تفوق

اختبارات الكترونية ذكية



صفوة معلمى الكويت

الشغل و الطاقة



المقدرة على إنجاز شغل

الطاقة

- إذا أردت أن تنجز شغلا فلا بد أن تمتلك طاقة , و يتوقف مقدار الشغل المنجز على مقدار الطاقة المعطاة
- الكرة المقذوفة بسرعة أفقية كبيرة على مستوى أفقي تستطيع أن تقطع مسافة أكبر قبل أن تتوقف من كرة مماثلة لها قذفت بسرعة أقل لأن الكرة الأولى تمتلك طاقة حركية أكبر

شغل ينجزه الجسم بسبب حركته

الطاقة الحركية KE

$$KE = \frac{1}{2} m v^2$$

الرمز	الاسم	الوحدة الدولية	
KE	طاقة الحركة	J	جول
m	الكتلة	Kg	كيلوجرام
v	السرعة الخطية	m/s	متر/ثانية

وحدة قياس الطاقة الحركية هي الجول J وهي تكافئ وحدة $Kg.m^2/s^2$

اذكر العوامل التي يتوقف عليها الطاقة الحركية




ما المقصود أن الطاقة الحركية لجسم = 100 J

ارسم العلاقات البيانية بين كل مما يلي :

العلاقة بين جذر الطاقة الحركية - سرعة الجسم


العلاقة بين الطاقة الحركية - مربع سرعة الجسم

العلاقة بين الطاقة الحركية - كتلة الجسم



حالات حساب الطاقة الحركية :

1. الطاقة الحركية لكثلة نقطية



$$KE = \frac{1}{2} m v^2$$



2. الطاقة الحركية لنظام مكون من عدة كتل نقطية

$$KE = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 + \dots$$

3. الطاقة الحركية لجسم صلب


$$KE = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v^2$$

$$KE = \frac{1}{2} M v^2$$

الطاقة الحركية الدورانية

عندما يدور جسم صلب حول محور ، يكون له سرعة دورانية تسمى ω و يمكن حساب طاقته الحركية الدورانية بالعلاقة التالية :

$$KE = \frac{1}{2} I \omega^2$$



الرمز	الاسم	معلق ⚠	الوحدة الدولية	
KE	طاقة الحركة الدورانية		J	جول
I	القصور الذاتي الدوراني		Kg. m ²	كيلوجرام.متر ²
ω	السرعة الزاوية (الدورانية)		rad/s	راديان/ثانية

اذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من :

الطاقة الحركية لجسم يدور

جسم قصوره الذاتي الدوراني 0.125 Kg.m^2 يدور حول محور بسرعة زاوية (دورانية) مقدارها 10 rad/s , احسب الطاقة الحركية الدورانية

صفوة معلم الكويت

- يختلف مقدار القصور الذاتي الدوراني من جسم إلى آخر , حسب شكل الجسم و موضعه بالنسبة لمحور الدوران
- يمكن حساب القصور الذاتي الدوراني لبعض الأجسام بالعلاقات التالية :

$$I = \frac{1}{12} mL^2$$

عصا منتظمة

$$I = \frac{1}{2} mr^2$$

قرص مصمت

$$I = mr^2$$

حلقة دائرية

$$I = mr^2$$

كتلة نقطية

معلق ⚠

احسب الطاقة الحركية الدورانية لعصا كتلتها 500 g و طولها 50 cm تدور حول محور بسرعة دورانية 10 rad/s ,
حيث $(I = \frac{1}{12} mL^2)$



العلاقة بين الشغل و الطاقة الحركية

$$W = KE_2 - KE_1$$

$$W = \Delta KE$$

الرمز	الاسم	الوحدة الدولية
ΔKE	التغير في طاقة الحركة	J
W	الشغل	J

الشغل الناتج عن محصلة القوة الخارجية المؤثرة في جسم خلال فترة زمنية محددة يساوي التغير في الطاقة الحركية خلال تلك الفترة

قانون الطاقة الحركية

الطاقة الحركية كمية موجبة دائما , أما التغير في الطاقة الحركية قد يكون موجبا أو سالبا

علل لما يأتي :

الشغل المبذول عند تحريك جسم بسرعة منتظمة يساوي صفر

صفوة معلم الكويت

سيارة كتلتها **2000 Kg** تسير بسرعة **5 m/s** زاد سائقها من سرعتها لتصبح **20 m/s** بعجلة مقدارها **10 m/s²** , احسب

▪ طاقة الحركة الابتدائية للسيارة

▪ طاقة الحركة النهائية للسيارة

▪ التغير في طاقة الحركة للسيارة

▪ الشغل المبذول في تحريك السيارة

▪ المسافة التي قطعتها السيارة



سيارة كتلتها **2000 Kg** تسير بسرعة **5 m/s** ضغط سائقها على الفرامل **فتوقفت** بعد مرور زمن قدره **10 s** , احسب

▪ طاقة حركة السيارة قبل الضغط على الفرامل

▪ طاقة الحركة عندما تتوقف السيارة عن الحركة

▪ التغير في طاقة الحركة للسيارة

▪ أين تذهب الطاقة المفقودة

▪ الشغل المبذول أثناء عملية توقف السيارة

صفوة علمي الكويت

- قوة الاحتكاك مع إطارات السيارة إذا تحركت السيارة مسافة **20 m** قبل أن تتوقف تماما

علل لما يأتي :

- ارتفاع درجة حرارة إطارات السيارة خلال عملية توقيفها

▪ سيارة كتلتها **1200 Kg** تتحرك بسرعة **30 m/s** ضغط سائقها على الفرامل فانزلت السيارة ثم **توقفت** السيارة تماما بسبب الاحتكاك بين الإطارات و الأرض ، إذا علمت أن قوة الاحتكاك تساوي **6000 N** ، احسب

- التغير في طاقة حركة السيارة خلال عملية التوقف

- الشغل المبذول في عملية الايقاف

- المسافة التي انزلتها السيارة قبل أن تتوقف

- الشغل المبذول من **وزن السيارة** أثناء عملية التوقف

▪ كرة كتلتها **300 g** سقطت من **السكون** من مبنى فوصلت سطح الأرض بسرعة **10m/s** ، احسب

- طاقة الحركة للكرة عند سطح الأرض

- الشغل المبذول من وزن الجسم أثناء سقوط الجسم

- ارتفاع المبنى



كرة كتلتها **300 g** سقطت من مبنى مرتفع بسرعة ابتدائية مقدارها **5 m/s** واصطدمت بسطح الأرض بسرعة مقدارها **35 m/s** ، احسب

▪ طاقة الحركة الابتدائية للكرة

▪ طاقة الحركة للكرة لحظة اصطدامها بالأرض

▪ الشغل المبذول أثناء سقوط الكرة

▪ الارتفاع الذي سقطت منه الكرة



كرة كتلتها **300 g** سقطت من **السكون** من مبنى ارتفاعه **10 m** ، احسب

▪ طاقة الحركة للجسم عند سطح الأرض

▪ سرعة الجسم عند سطح الأرض

▪ باستخدام قانون الطاقة الحركية احسب سرعة كرة سقطت من **سكون** من ارتفاع **30 cm** لحظة اصطدامها بالأرض



قذف جسم كتلته **300 g** بسرعة ابتدائية **5 m/s** ووصل إلى أقصى ارتفاع له بإهمال قوة الاحتكاك مع الهواء , احسب

▪ الطاقة الحركية عند نقطة القذف

▪ الطاقة الحركية عند أقصى ارتفاع


▪ الشغل الناتج عن قذف الجسم

▪ أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم



قذف صندوق خشبي كتلته **10 Kg** أنزل من **سكون** على مستوى أملس طوله **5 m** يميل على الأفقي بزاوية مقدارها **(30°)** , احسب

▪ القوة التي تحرك الجسم



▪ الشغل الناتج عن وزن الصندوق عندما ينزلق على المستوى المائل

▪ طاقة حركة الصندوق لحظة وصوله إلى أسفل المستوى المائل

▪ سرعة الصندوق لحظة وصوله إلى أسفل المستوى المائل




توجد الطاقة الكامنة في الفحم الحجري و الغذاء و البطاريات الكهربائية و المركبات الكيميائية

الطاقة الكامنة المرنة في الزنبرك (الناض)

عند شد أو ضغط النابض فإنه يخزن طاقة كامنة مرونية تسمح هذه الطاقة للزنبرك بالعودة إلى وضعه الأصلي عند إفلاته و يمكن حسابها من العلاقة التالية

$$PE_e = \frac{1}{2} K \Delta x^2$$




الرمز	الاسم	الوحدة الدولية
PE_e	الطاقة الكامنة المرنة	J
K	ثابت المرونة (هوك)	N/m
Δx	الاستطالة	m

اذكر العوامل التي يتوقف عليها الطاقة الكامنة المرنة في زنبرك

ارسم العلاقات البيانية بين كل مما يلي :

العلاقة بين الطاقة الكامنة المرنة - مربع الاستطالة




نابض مرن ثابتته (200 N/m) شد بقوة فاستطال مسافة 4 cm ، احسب الطاقة الكامنة المرنة المختزنة فيه



الطاقة الكامنة المرنة في الخيط المرن

عند لى جسم مثبت في خيط مطاطي فإنه يخزن طاقة كامنة تسمح هذه الطاقة للخيط المرن بالعودة إلى وضعه الأصلي عند إفلاته و يمكن حسابها من العلاقة التالية



$$PE_e = \frac{1}{2} C \Delta\theta^2$$


الرمز	الاسم	الوحدة الدولية
PE_e	الطاقة الكامنة المرنة	J
C	ثابت مرونة الخيط المرن	N.m/rad ²
θ	الإزاحة الزاوية	rad

اذكر العوامل التي يتوقف عليها ثابت المرونة في خيط مرن

اذكر العوامل التي يتوقف عليها الطاقة الكامنة في خيط مرن

ارسم العلاقات البيانية بين كل مما يلي :


العلاقة بين الطاقة الكامنة المرنة - مربع الإزاحة الزاوية



خيط مطاطي مرن ثابت مرونته $C = 100 \text{ N.m/rad}^2$ تم ليه عن موضع سكونه $\frac{\pi}{8} \text{ rad}$, احسب الطاقة الكامنة المرنة المخزنة فيه

صفوة معلمى الكويت

❏ لكي ينطلق الحجر الموضح بالشكل لمسافة بعيدة يجب شد الخيط المطاطي بقوة كبيرة للخلف



الطاقة الكامنة الثقالية



❏ إذا أسقطت مطرقة على مسمار من مكان مرتفع ينغرس المسمار أكثر أي تنجز شغل أكبر مقارنة بإسقاطها من مكان أقل ارتفاعا ، لأنها في الحالة الأولى تمتلك طاقة كامنة ثقالية أكبر

الطاقة الكامنة الثقالية (طاقة الوضع الثقالية)

الشغل المبذول علي الجسم لرفعه إلى نقطة ما

$$PE = mgh$$


الرمز	الاسم	الوحدة الدولية
PE	الطاقة الكامنة الثقالية	J
m	الكتلة	Kg
g	عجلة الجاذبية الأرضية	10 m/s ²
h	الارتفاع - البعد عن المستوى المرجعي	m

❏ عند حساب الطاقة الكامنة الثقالية وجد أنها تنسب إلى سطح الأرض و يسمى مستوى سطح الأرض في هذه الحالة بالمستوى المرجعي

- المستوى الذي نبدأ من عنده قياس الطاقة الكامنة
- المستوى الذي تكون عنده طاقة الوضع الثقالية تساوي صفر

المستوى المرجعي

- ❏ اختيار المستوى المرجعي هو اختياري بحت ، من الممكن اختيار أرضية مختبر في الدور الثاني مستوى مرجعي
- الطاقة الكامنة الثقالية لا ترتبط بكيفية الوصول إلى ارتفاع معين ولكن بالمسافة الرأسية بين النقطة والمستوى المرجعي



علل لما يأتي :

❑ لا يتغير مقدار الشغل للجسم عند رفع الجسم إلى مستوى معين بصورة أفقية أو على مستوى مائل




اذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من :


❑ طاقة الوضع الثقالية (الطاقة الكامنة الثقالية)

ارسم العلاقات البيانية بين كل مما يلي :

❑ العلاقة بين طاقة الوضع - الكتلة



❑ العلاقة بين طاقة الوضع - الارتفاع



ما المقصود بكل من :

❑ طاقة الوضع الثقالية لجسم عند ارتفاع معين يساوي $J (100)$

💡 أشهر الأمثلة على الطاقة الكامنة الثقالية مياه الشلالات , لذلك فهي تبذل شغلا يمكنها من الهبوط

علل لما يأتي :


❑ المياه الساقطة من الشلالات يمكنها توليد الطاقة الكهربائية

❑ عند طرق مسمار بمطرقة , بزيادة ارتفاع المطرقة أثناء الطرق يزداد انغراس المسمار

ماذا يحدث في كل من الحالات التالية :

❑ للطاقة الكامنة الثقالية لجسم إذا ارتفع عن المستوى المرجعي

❑ للطاقة الكامنة الثقالية لجسم إذا انخفض عن المستوى المرجعي



كرة كتلتها 0.1 Kg , موضوعة علي المستوى الأفقي المار بالنقطة B , احسب الطاقة الكامنة الثقالية للكرة بالنسبة للمستوي المرجعي B في الحالات التالية :

- عند المستوى الأفقي المار بالنقطة B
- عند المستوى الأفقي المار بالنقطة A الذي يرتفع 40 cm عن المستوى المرجعي
- عند المستوى الأفقي المار بالنقطة C الذي ينخفض 50 cm عن المستوى المرجعي




العلاقة بين الشغل و الطاقة الكامنة الثقالية

الشغل المبذول من وزن الجسم هو معكوس التغير في الطاقة الكامنة الثقالية

$$W_w = - \Delta PE$$

$$\Delta PE = - W_w$$

الرمز	الاسم	الوحدة الدولية
ΔPE	التغير في الطاقة الكامنة الثقالية	J
W	الشغل	J



كرة كتلتها مقدارها 5 Kg تم رفعها رأسياً من النقطة A إلى النقطة B , احسب

- الطاقة الكامنة عند النقطة A و النقطة B
- التغير في طاقة الوضع الثقالية خلال الإزاحة من A إلى B

- الشغل المبذول من وزن الجسم خلال الإزاحة من A إلى B

الطاقة الميكانيكية ME

- الطاقة اللازمة لتغيير موضع الجسم أو تعديله
- مجموع الطاقة الحركية و الطاقة الكامنة للجسم

$$ME = KE + PE$$



الرمز	الاسم	الوحدة الدولية
ME	الطاقة الميكانيكية	J
KE	الطاقة الحركية	J
PE	الطاقة الكامنة	J

سيارة كتلتها **600 Kg** تسير بسرعة **20 m/s** فوق جبل يرتفع عن سطح الأرض **m (100)** , احسب

- طاقة حركة السيارة

- طاقة وضع السيارة

- الطاقة الميكانيكية للسيارة

ارسم العلاقات البيانية بين كل مما يلي :

العلاقة بين الطاقة الحركية - الطاقة الكامنة التثاقلية

KE

PE



تدرب و تفوق

اختبارات الكترونية ذكية



الطاقة

حفظ (بقاء) الطاقة

الجسم الذي يملك أبعادا يمكن رؤيتها بالعين

الجسم الماكروسكوبي


الأجسام التي لا ترى بالعين المجردة

الأجسام الميكروسكوبية

الطاقة الميكانيكية الماكروسكوبية

مجموع الطاقة الحركية و الطاقة الكامنة للجسم الماكروسكوبي وهي لا تختلف عن الطاقة الميكانيكية التي درسناها من قبل , لذلك سنطلق عليها الطاقة الميكانيكية

$$ME_{macro} = KE_{macro} + PE_{macro}$$



- يخزن كوب الماء الموضح بالشكل طاقة داخلية لأن جزيئاته تتحرك بسرعة وتزداد هذه السرعة بارتفاع درجة حرارة الجسم
- كذلك تتغير الروابط بين الجزيئات عندما تتغير حالة المادة كالانصهار أو التجمد

الطاقة الميكانيكية الميكروسكوبية U

هي مجموع طاقة الوضع و طاقة الحركة لجسيمات النظام وسنطلق عليها لفظ **الطاقة الداخلية** لمنع الخلط بين ماكرو وميكرو

$$ME_{micro} = KE_{micro} + PE_{micro} = U$$

الطاقة الكامنة الميكروسكوبية

الطاقة التي تتبادلها جسيمات النظام و تؤدي إلى تغير حالته بتغيير طاقة الربط بين أجزائه

علل لما يأتي :

تزداد الطاقة الحركية الميكروسكوبية للنظام برفع درجة حرارته

تزداد الطاقة الميكانيكية الميكروسكوبية للنظام عند تغير حالة المادة من صلب إلى سائل

هي مجموع الطاقة الداخلية U والطاقة الميكانيكية ME

الطاقة الكلية E

$$E = ME + U$$

حفظ (بقاء) الطاقة الكلية




- الطبيعة تحتوي على مصادر للطاقة لا يمكن بأي طريقة أن تزيد أو تنقص
- في الأنظمة المعزولة المغلقة التي لا تتبادل طاقة مع محيطها تكون الطاقة الكلية محفوظة

الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم , ويمكن داخل أي نظام معزول أن تتحول من شكل إلى آخر , فالطاقة الكلية للنظام ثابتة لا تتغير

قانون بقاء الطاقة

أمثلة علي بقاء الطاقة :



1. في الشكل المقابل عند لف الزنبرك للعبة السيارة نجد أن جزءاً من الطاقة الكامنة المرنة يتحول إلى طاقة حركية والجزء الباقي إلى طاقة حرارية نتيجة الاحتكاك وبالتالي فإن الطاقة الكلية للنظام (السيارة و الأرض و الهواء المحيط) لم تتغير

علل لما يأتي :

الطاقة الكلية لنظام معزول مؤلف من الأرض و السيارة و الهواء المحيط لم تتغير



2. إذا اخذنا نظام معزول مؤلف من مظلي و الأرض و الهواء المحيط , المظلي الذي يهبط باستخدام المظلة يصل إلى سرعة حدية ثابتة وبالتالي لا تتغير طاقة حركته بينما تتناقص الطاقة الكامنة الثقالية وتتحوّل إلى طاقة حرارية تسبب ارتفاع درجة حرارة الهواء المحيط و المظلة

علل لما يأتي :

عند القفز بالمظلة يحدث ارتفاع في درجة حرارة المظلة و الهواء المحيط بها



حفظ الطاقة الميكانيكية في نظام معزول

الطاقة الكلية محفوظة وبالتالي $\Delta E = \text{zero}$, وبإهمال الاحتكاك دائما فإن الطاقة الداخلية للنظام لا تتغير $\Delta U = \text{zero}$ و هذا يعني أن الطاقة الميكانيكية للنظام ثابتة لا تتغير $\Delta ME = \text{zero}$ بإهمال قوى الاحتكاك مع الهواء

$$\Delta E = \Delta ME + \Delta U$$

$$\Delta E = \text{zero} \quad , \quad \Delta U = \text{zero}$$

$$\Delta ME = \text{zero}$$

$$ME_1 = ME_2$$

$$KE_1 + PE_1 = KE_2 + PE_2$$

$$KE_1 - KE_2 = PE_2 - PE_1$$

$$-(KE_2 - KE_1) = PE_2 - PE_1$$

$$-\Delta KE = \Delta PE$$

حفظ الطاقة في نظام معزول

في الأنظمة المعزولة عندما تكون الطاقة الميكانيكية محفوظة يكون التغير في الطاقة الكامنة (طاقة الوضع) مساويا لمعكوس التغير في الطاقة الحركية

في الأنظمة المعزولة تكون الطاقة الميكانيكية محفوظة (ثابتة) عند جميع النقاط ولا تتغير بتغير موضع الجسم 



حالة (1)

عندما يتحرك الجسم من النقطة 1 (أقصى ارتفاع) إلى النقطة 2 (المستوى المرجعي)

$$ME_1 = ME_2$$

عند أقصى ارتفاع (النقطة 1)

الجسم يتحرك من السكون

$$v_1 = \text{zero} \quad , \quad KE_1 = \text{zero}$$

$$PE_1 = mgh_1$$

وبالتالي

$$ME_1 = PE_1$$

نقطة (1)



h

نقطة (2)



المستوى المرجعي

عند سطح الأرض (المستوى المرجعي) (النقطة 2)

$$h_2 = \text{zero} \quad , \quad PE_2 = \text{zero}$$

$$KE_2 = \frac{1}{2} m v_2^2$$

وبالتالي :

$$ME_2 = KE_2$$

ومن قانون حفظ الطاقة في الأنظمة المعزولة نجد أن :

$$ME_1 = ME_2$$

أي أن :

$$PE_1 = KE_2$$

❶ جسم كتلته **30 Kg** موجود على سطح مبنى ارتفاعه **m (20)** فإذا سقط سقوطاً حراً ، احسب

▪ طاقة الوضع الثقالية للجسم قبل سقوطه

▪ الطاقة الميكانيكية للجسم قبل سقوطه

▪ طاقة حركة الجسم عندما يصل لسطح الأرض

صفوة معلمي الكويت

▪ سرعة الجسم عند لحظة وصوله لسطح الأرض

▪ الشغل الذي يبذله الجسم نتيجة سقوطه

▪ الارتفاع الذي تصبح عنده سرعة الجسم تساوي 10 m/s

▪ سرعة الجسم عند ارتفاع 10 m من سطح الأرض



نقطة (2)



h

نقطة (1)



المستوى المرجعي

$$h_1 = \text{zero}, \quad PE_1 = \text{zero}$$

$$KE_1 = \frac{1}{2} m v_1^2$$

$$ME_1 = KE_1$$

$$v_2 = \text{zero}, \quad KE_2 = \text{zero}$$

$$PE_2 = mgh_2$$

$$ME_2 = PE_2$$

حالة (2)

عند قذف الجسم لأعلى

عند نقطة القذف

وبالتالي

عند أقصى ارتفاع

وبالتالي

عند حساب قيمة الشغل تكون عجلة الجاذبية الأرضية سالبة

صفوة الكمي الكلويت

قذف حجر كتلته **2 Kg** بسرعة **16 m/s** رأسياً إلى أعلى أعتبر أن نقطة القذف هي المستوى المرجعي ثم ، احسب

▪ طاقة حركة الحجر لحظة قذفه

▪ الطاقة الميكانيكية للنظام

▪ طاقة وضع الحجر عند أقصى ارتفاع يصل إليه

▪ أقصى ارتفاع وصل إليه الحجر

▪ الشغل الذي بذلته قوة جذب الأرض


▪ الارتفاع الذي يتساوى عنده طاقتي الوضع و الحركة

▪ السرعة التي يتساوى عندها طاقتي الوضع و الحركة

صفوة معلمى الكويت



جسم كتلته 100 g موضوع أسفل مستوى مائل كما بالشكل ، إذا اعتبرنا سطح المستوى المائل هو المستوى المرجعي ، إذا اطلق الجسم لأعلى من النقطة A بسرعة ابتدائية 10 m/s ، احسب



الطاقة الميكانيكية للجسم

أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم

ارتفاع الجسم الذي يجعل سرعته 5 m/s

الارتفاع الذي يتساوى عنده طاقتي الوضع والحركة


سرعة الجسم عند الموضع الذي يتساوى فيه طاقتي الوضع و الحركة

صفوة معلمي الكويت



صندوق خشبي كتلته **10 Kg** انزلق من **سكون** من النقطة (1) على مستوى أملس طوله **5 m** يميل على المستوى المرجعي بزاوية مقدارها **30°** حتى وصل إلى المستوى المرجعي عن النقطة (2) ، احسب

طاقة الميكانيكية للنظام



طاقة حركة الصندوق أسفل المستوى المائل

ارتفاع المستوى الذي تكون عنده سرعة الصندوق تساوي **5 m/s**

سرعة الصندوق على ارتفاع **2 m** من المستوى المرجعي


الارتفاع الذي يتساوى عنده طاقتي الوضع و الحركة

سرعة الصندوق عند الموضع الذي يتساوى فيه طاقتي الوضع و الحركة

صفوة معلم الكويت



كرة وزنها 200 N تنزل من النقطة a على المسار الأملس abc الموضح بالشكل , إذا علمت أن النقطة b تمثل المستوى المرجعي , احسب



طاقة وضع الكرة عند النقطة a


الطاقة الميكانيكية للكرة عند النقطة a

سرعة الكرة عند النقطة b

سرعة الكرة عند النقطة c


الطاقة الكامنة المرنة في الزنبرك

عند شد أو ضغط النابض فإنه يخزن طاقة كامنة مرونية



الرمز	الاسم	الوحدة الدولية
PE_e	الطاقة الكامنة المرنة	J
K	ثابت المرونة (هوك)	N/m
Δx	الاستطالة	m

• نابض طوله 100 cm ضغط حتى أصبح طوله 50 cm عند النقطة A ووضع أمامه جسم كتلته 2 Kg ، إذا كان ثابت مرونة النابض يساوي 200 N/m ، و تحرك الجسم علي المسار الأملس ABC اعتبر الخط AB هو المستوى المرجعي ، احسب



▪ سرعة الجسم عند النقطة B

▪ اقصي ارتفاع يصل إليه الجسم عند النقطة C



تدرب و تفوق


اختبارات الكترونية ذكية

صفوة معلمي الكويت

حركة البندول



تعتبر حركة البندول البسيط في غياب الاحتكاك مثالا على حفظ الطاقة الميكانيكية في نظام معزول عند دراسة التبادل بين طاقتي الوضع الثقالية والحركة في غياب قوة الاحتكاك فإنه عند سحب البندول من موضع الاستقرار G_0 ليصنع زاوية θ_m فإنه يرتفع مسافة h عن موضع الاستقرار وبالتالي يمكن حساب طاقة الوضع الثقالية بالمعادلة التالية :



$$PE_g = m g h$$

$$h = L (1 - \cos \theta)$$

$$PE_g = m g L (1 - \cos \theta)$$

عند حساب الطاقة الميكانيكية عند أي موضع :

$$ME = KE + PE$$

$$ME = \frac{1}{2} m v^2 + m g L (1 - \cos \theta)$$

عند أقصى ارتفاع :

$$KE = \text{zero}$$

$$ME = m g L (1 - \cos \theta_m)$$

عند نقطة الاتزان G_0 :

$$PE = \text{zero}$$

$$ME = \frac{1}{2} m v^2$$

الرمز	الاسم	الوحدة الدولية
KE	طاقة الحركة	J
PE	طاقة الوضع	J
m	الكتلة	Kg
L	طول البندول	m
θ_m	الزاوية	درجة

اذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من :

☑ طاقة الوضع الثقالية لبندول

علل لما يأتي :

☑ عندما يمر ثقل البندول المهتز بموضع اتزانه فإنه لا يسكن



صفوة علمي الكويت




ارسم العلاقات البيانية بين كل مما يلي :

طاقة الوضع - الزاوية التي يتحرك بها البندول


طاقة الحركة - الزاوية التي يتحرك بها البندول




الطاقة الميكانيكية - الزاوية التي يتحرك بها البندول



العلاقات البيانية بين الطاقة الحركية و طاقة الوضع والطاقة الميكانيكية للبندول مع الزاوية



صفوة معلمى الكويت



• بندول بسيط مكون من كتلة **100 g** مربوط بخيط عديم الوزن لا يتمدد طوله **40 cm** , سحب الكتلة مع إبقاء الخيط مشدودا بزاوية 60° وأطلقت من دون سرعة ابتدائية , لتهتز في غياب الاحتكاك , احسب

▪ الطاقة الميكانيكية للنظام

▪ سرعة الكتلة عند النقطة G_0

▪ الزاوية التي يتساوى عندها طاقتي الوضع و الحركة

▪ احسب السرعة التي يتساوى عندها طاقتي الوضع و الحركة



🎯 **تدرب و تفوق**

اختبارات الكترونية ذكية

صفوة معلمي الكويت



عدم حفظ الطاقة الميكانيكية في نظام معزول

التغير في الطاقة الكلية للنظام يكون نتيجة التغير في الطاقة الداخلية أو الميكانيكية أو الاثنين معا

$$\Delta E = \Delta ME + \Delta U$$

ومع حفظ الطاقة في النظام المعزول يصبح $\Delta E = \text{zero}$ وبالتالي :

$$\Delta ME = - \Delta U$$

و بالتالي التغير في الطاقة الميكانيكية يساوي معكوس التغير في الطاقة الداخلية وبما أن الشغل الناتج عن قوة الاحتكاك يتحول إلى طاقة داخلية , تعمل على تغير درجة حرارته أو تغير حالته الفيزيائية أو الاثنين معا

$$\Delta ME = - W_f$$


$$\Delta ME = - f \times d$$

وبالتالي التغير في الطاقة الميكانيكية يساوي الشغل الناتج عن قوة الاحتكاك

الرمز	الاسم	الوحدة الدولية
ΔME	التغير في الطاقة الميكانيكية	J
f	قوة الاحتكاك	N
d	الإزاحة	m


علل لما يأتي :

عندما يتحرك جسم على مستوى خشن فإن الطاقة الميكانيكية للنظام تصبح غير محفوظة



صندوق صغير كتلته $m = 100 \text{ g}$, أمّلت من سكون من النقطة A , على المستوى المائل الخشن , إذا كان طول المسار AB يساوي 4 m , و يصنع زاوية مقدارها 30° مع المستوى الأفقي , إذا وصل الصندوق إلى النقطة B بسرعة $v_B = 6 \text{ m/s}$ و كان الخط الأفقي المار بالنقطة B يمثل المستوى المرجعي , احسب مقدار قوة الاحتكاك على المستوى المائل

صفوة معلمى الكويت



الشكل المقابل يوضح جسما كتلته 5 Kg موضوع أعلى مستوي مائل **أملس** , تحرك الجسم من السكون من النقطة **A** التي ترتفع عن الأرض بمقدار 2 m لتصل إلى النقطة رقم **B** , ثم تحركت علي المستوي **الخشن** لتتوقف عن الحركة عند النقطة **C** , إذا كان الخط الأفقي المار بالنقطتين **BC** يمثل المستوي المرجعي و المطلوب , احسب

الطاقة الميكانيكية للجسم عند النقطة **A**

سرعة الجسم عند النقطة **B**

إذا كان طول المسار (**BC**) يساوي 1 m احسب مقدار قوة الاحتكاك



تدرب و تفوق

اختبارات الكترونية ذكية

صفوة معلمي الكويت





كمية فيزيائية تعبر عن مقدرة القوة على إحداث حركة دورانية للجسم حول محور الدوران

عزم القوة (عزم الدوران) τ

- عندما تؤثر القوة على صنبور أو عند فتح الباب أو ربط صامولة فإن المسبب لدوران الجسم هو عزم القوة و ليس القوة
- القوة تكسب الجسم تسارعا اما عزم القوة فيكسب الجسم دورانا

$$\vec{\tau} = \vec{F}_\perp \times \vec{d}$$

$$\tau = F d \sin \theta$$

الرمز	الاسم	الوحدة الدولية
τ	عزم القوة	N.m
F	القوة	N
d	ذراع القوة - ذراع العزم	m
θ	الزاوية بين القوة و محور الدوران	درجة

المسافة من محور الدوران إلى نقطة تأثير القوة

ذراع القوة (ذراع الرافعة)

- يقاس عزم القوة بوحدة N.m وهي لا تكافئ وحدة الجول
- عندما تؤثر علي الجسم قوة بزاوية تميل على محور الدوران فإن مركبة القوة العمودية فقط هي التي تسهم في عمل القوة




اذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من :

عزم القوة


صفوة معلم الكويت

ارسم العلاقات البيانية بين كل مما يلي :

عزم القوة - ذراع العزم



عزم القوة - القوة



- يزداد مقدار عزم القوة بزيادة مقدار القوة المؤثرة
- يزداد مقدار عزم القوة بزيادة ذراع العزم (ذراع القوة)
- عند استخدامنا لمفتاح ربط طويل , فإن استخدام مفتاح الربط الطويل يؤدي إلى بذل جهد اقل و عزم أكبر و يفتح البرغي بسهولة

علل لما يأتي :

يمكن الحصول علي قيم متعددة لعزم القوة رغم ثبات مقدار القوة

استخدام مطرقة مخليية طويلة لسحب مسمار من قطعة خشبية

استخدام سكين طويل لفتح علبة دهان


يوضع مقبض الباب بعيدا عن محور دوران الباب (مفصلات الباب)

استخدام مفاتيح ذات اذرع طويلة لفك الصواميل

يصعب فك صامولة باستخدام مفتاح ذات ذراع قصير


يلزم عصا طويلة لتحريك صخرة كبيرة من علي سطح الأرض

استخدام قوة عمودية تؤدي إلى عزم أكبر وبالتالي يسهل فتح البرغي



علل لما يأتي :

عند فتح الباب فأنتك تدفعه بقوة عمودية








تحديد اتجاه عزم القوة

علل لما يأتي :

عزم القوة كمية متجهة

- يحدد اتجاه عزم القوة بقاعدة اليد اليمنى
- إذا كان اتجاه عزم القوة عكس عقارب الساعة فإن اتجاه العزم عمودي على الصفحة للخارج ويعتبر العزم موجبا
- إذا كان اتجاه عزم القوة مع عقارب الساعة فإن اتجاه العزم عمودي على الصفحة للداخل ويعتبر العزم سالبا

احسب مقدار عزم القوة في الحالات التالية (مع تحديد اتجاه العزم)






حالات يكون فيها عزم القوة صفر :

1. إذا كان خط عمل القوة يمر بمحور الدوران

$$d = \text{zero} \Rightarrow \tau = \text{zero}$$

2. إذا كان خط عمل القوة يوازي محور الدوران

$$\theta = \text{zero} \Rightarrow \sin(\text{zero}) = \text{zero} \Rightarrow \tau = \text{zero}$$





علل لما يأتي :


❶ لا يدور الجسم الصلب القابل للدوران عند التأثير عليه بقوة توازي محور الدوران

❷ لا يدور الجسم الصلب القابل للدوران عند التأثير عليه بقوة يمر خط عملها بمحور الدوران

❸ احسب مقدار عزم القوة في الحالات التالية




❹ ساق منتظمة و متجانسة ووزنها 10 N و طولها 20 cm , احسب محصلة العزوم المؤثرة على الساق بالنسبة لمحور الدوران O



صفوة معلم الكويت



يوضح الشكل ساقا متجانسة طولها 100 cm وزنها 60 N تؤثر فيها ثلاث قوى , احسب



مقدار عزم القوة لكل من القوى الأربعة و حدد اتجاهها حول محور الدوران 0

محصلة العزوم علي الساق الناتج عن القوى الأربعة




العزوم المتزنة

لتحقيق الاتزان الدوراني يجب أن يكون محصلة جمع العزوم تساوي صفرا

$$\Sigma \tau = \text{zero}$$

أي أن المجموع الجبري للعزوم مع عقارب الساعة = المجموع الجبري للعزوم عكس اتجاه عقارب الساعة

$$\Sigma \tau_{a.c.w} = \Sigma \tau_{c.w}$$



$\tau_{a.c.w}$ عكس عقارب الساعة

$$F \times d$$

$$400 \times 1.5$$

$$+ 600 \text{ N.m}$$

$\tau_{c.w}$ مع عقارب الساعة

$$F \times d$$

$$200 \times 3$$

$$- 600 \text{ N.m}$$

$$\Sigma \tau = \text{zero}$$

ينتج نفس عزم القوة بتأثير قوة كبيرة مع ذراع قصير أو بتأثير قوة صغيرة مع ذراع كبير

علل لما يأتي :

يتوازن الأطفال علي الأرجوحة حتى ولو اوزانهم غير متكافئة

يعتمد اتزان الميزان الذي يعمل بالأوزان المنزلة على اتزان العزوم وليس اتزان الأوزان

لاتزان جسم يتحرك حركة خطية



$$\Sigma F = \text{zero}$$

لاتزان جسم يتحرك حركة دورانية

$$\Sigma \tau = \text{zero}$$


لاتزان جسم مادي لابد من توافر شرطين

$$\Sigma \tau = \text{zero} \quad , \quad \Sigma F = \text{zero}$$




احسب مقدار عزم القوة لكل من وزني الفتاة و الولد الجالسين علي اللوح المتأرجح بإهمال وزن اللوح

احسب المسافة التي تفصل الفتاة عن محور ارتكاز اللوح عندما يساوي وزن الفتاة 400 N و النظام في حالة اتزان دوراني



يجلس طفلان وزن أحدهما 300N و الآخر 450 N علي طرفي أرجوحة طولها 3 m كما بالشكل , حدد موقع محور الدوران الذي يجعل النظام في حالة اتزان دوراني



صفوة معلم الكويت

عزم القوة ومركز الثقل



ملاحظات

- يقع مركز الثقل عند الموضع المتوسط للجسم
- إذا كان موضع مركز الثقل داخل المساحة الحاملة للجسم فإن الجسم يتزن و تكون محصلة العزوم تساوي صفر
- إذا كان مركز الثقل خارج المساحة الحاملة للجسم يصبح هناك عزم للقوة يسبب انقلابا

علل لما يأتي :



- إذا حاولت أن تلمس أصابع قدميك وأنت واقف و ظهرك ملامس للحائط فأنت تنقلب

هو موقع محور الدوران الذي تكون محصلة عزوم قوى الجاذبية المؤثرة في الجسم الصلب حوله تساوي صفر

مركز ثقل الجسم الصلب

عند ركل كرة يحدث احتمال من اثنين :

- إذا كان خط عمل القوة يمر بمركز ثقل الكرة فإن الكرة تتحرك دون أن تدور حول مركز ثقلها
- إذا كان خط عمل القوة لا يمر بمركز الثقل فإن الكرة ستتحرك و كذلك ستدور حول مركز ثقلها بفعل عزم القوة الناتج



ماذا يحدث في الحالات التالية :

- عند ركل كرة بقوة تمر بمركز ثقلها

- عند ركل كرة بقوة لا تمر بمركز ثقلها

صفوة معلمي الكويت



قوتان متساويتان في المقدار و متوازيتان و تعملان في اتجاهين متضادين و ليس لهما خط عمل واحد

الازدواج

يمكن استنتاج قانون لحساب عزم الازدواج كما يلي

$$\tau_1 = F_1 d_1$$

$$\tau_2 = F_2 d_2$$


$$\tau_t = \tau_1 + \tau_2 = C$$

$$C = F_1 d_1 + F_2 d_2$$

وبما أن القوتين متساويتان

$$C = F (d_1 + d_2)$$

$$C = F d$$



الرمز	الاسم	الوحدة الدولية
C	عزم الازدواج	N.m
F	القوة	N
d	المسافة العمودية بين القوتين (ذراع الازدواج)	m

وبالتالي يمكن إيجاد صيغة تعريف جديدة لعزم الازدواج طبقا للقانون السابق كما يلي

حاصل ضرب مقدار إحدى القوتين بالمسافة العمودية بينهما

عزم الازدواج



اذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من :

عزم الازدواج

ارسم العلاقات البيانية بين كل مما يلي :

عزم الازدواج - ذراع الازدواج

عزم الازدواج - القوة



صفوة معلم الكويت

تطبيقات على عزم الازدواج



عند فتح الصنبور فإننا نؤثر بإصبعين في مقبض الصنبور مما يشكل ازدواجاً و يسبب دوران الصنبور

علل لما يأتي :

عندما نريد فتح صنبور نؤثر عليه بأصبعينا فيدور الصنبور ولا يتزن رغم تساوي القوتين


عندما تقود دراجتك على المنعطف فإنك تبذل بيدك قوتين يشكلان ازدواج يؤدي إلى التفاف الدراجة



علل لما يأتي :

عندما تقود دراجتك فأنتك تؤثر بيدك الاثنتين على المقود

عندما يستخدم الميكانيكي المفتاح الرباعي لفك صواميل اطار السيارة فإنه يستخدم يديه ليشكل ازدواجاً ليسهل فك الصواميل




علل لما يأتي :

استخدام المفتاح الرباعي لنزع إطارات السيارة




احسب مقدار عزم الازدواج في الحالات التالية :



❶ مفك قطر مقبضه 3 cm وعرض رأسه الذي يدخل في البرغي 7 mm أستخدم لتثبيت برغي بواسطة اليد بقوتين متساويتين 49 N ومتعاكستين في الاتجاه ، احسب

▪ عزم الازدواج المؤثر علي مقبض المفك



▪ القوة التي تؤدي إلى دوران البرغي

علل لما يأتي :

❶ يستخدم المفك لتثبيت البراغي أو نزعها بدلا من استخدام اليد مباشرة

❶ تزداد سهولة فك البراغي كلما زاد نصف قطر مقبض المفك المستخدم



تدرب و تفوق

اختبارات الكترونية ذكية



صفوة معلمي الكويت



القصور الذاتي الدوراني

مقاومة الجسم للتغير في حركته الدورانية

القصور الذاتي الدوراني (I)

- تميل الأجسام التي تدور إلى الاستمرار في الدوران و تميل الأجسام الساكنة إلى البقاء ساكنة
- يحتاج الجسم إلى قوة لتغيير حالته الخطية (سكون أو حركة في خط مستقيم) ، ويحتاج الجسم عزم القوة لتغيير الحالة الدورانية للجسم



العوامل التي تؤثر في القصور الذاتي الدوراني :

- 1. موضع محور الدوران بالنسبة للجسم**
 - كلما زادت المسافة بين كتلة الجسم و محور الدوران يزداد القصور الذاتي الدوراني
- 2. شكل الجسم و توزيع كتلته**
 - يختلف مقدار القصور الذاتي الدوراني إذا كان الجسم أجوف أو مصمتا
 - يختلف مقدار القصور الذاتي الدوراني باختلاف طريقة توزيع كتلة الجسم حول محور الدوران
- 3. مقدار كتلة الجسم**
 - زيادة كتلة الجسم يزداد القصور الذاتي الدوراني

اذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من :

القصور الذاتي الدوراني




- مضرب كرة البيسبول ذي الذراع الطويل له قصور ذاتي دوراني أكبر من المضرب ذي الذراع القصيرة بسبب زيادة المسافة بين الجسم و محور الدوران
- المضرب الطويل عندما يتحرك يكون له ميل للبقاء متحركا أكثر من القصير
- المضرب الطويل يكون من الصعب زيادة سرعته بسبب قصوره الذاتي الدوراني الكبير ، لذلك لا يميل إلى التأرجح بسهولة على عكس المضرب القصير الذي يميل إلى التأرجح بسهولة
- المضرب القصير له قصور ذاتي دوراني قليل لذلك استخدامه أسهل لأنه من الممكن التحكم فيه بإمساكه بقوة

علل لما يأتي :

يسهل استخدام عصا البيسبول القصيرة عن العصا الطويلة

صفوة من الكوبت



البندول البسيط الطويل له قصور ذاتي دوراني أكبر من البندول القصير بسبب زيادة المسافة بين الجسم و محور الدوران لذلك يميل البندول القصير إلى التحرك إلى الأمام والخلف (سهل التأرجح) أكثر من البندول الطويل

علل لما يأتي :

البندول القصير يتحرك إلى الأمام و الخلف أكثر من تحرك البندول الطويل

- الحيوانات ذات القوائم (الأرجل) الطويلة لها قصور ذاتي دوراني أكبر من الحيوانات ذات القوائم القصيرة بسبب زيادة المسافة بين الجسم و محور الدوران
- لذلك الحيوانات ذات الأرجل الطويلة تتحرك بسرعة أقل من الحيوانات ذات الأرجل القصيرة

علل لما يأتي :

الكلب ذو القوائم القصيرة يتحرك بسرعة أكبر من الغزال ذو القوائم الكبيرة



عند هز قدميك وهي ممدودة و عند هز قدميك عند ثني الساق , نجد أن تحريك الساق أسهل في حالة ثنيها لأن قصورها الذاتي الدوراني يقل وذلك بسبب اختلاف توزيع الكتلة حول محور الدوران



علل لما يأتي :

يفضل ثني القدمين عند الجري


يمسك البهلوان عصا أو يمد يده ليزيد من قصوره الذاتي الدوراني مما يساعده على مقاومة الدوران ليحظى بوقت أطول للحفاظ على اتزانه



علل لما يأتي :

يمسك البهلوان عصا طويلة في يديه وهو يتحرك

صفوة معلم الكويت



عند أرجحه القلم من منتصفه يكون أسهل لأن قصوره الذاتي الدوراني يكون أقل من أرجحته من الطرف

علل لما يأتي :

يسهل أرجحه القلم (المسطرة) وأنت تمسكه من المنتصف عن الطرف

يختلف زمن درجة جسم مصمت عن جسم أجوف عند تحركهم على مستوى مائل , بسبب اختلاف القصور الذاتي الدوراني

علل لما يأتي :

اختلاف القصور الذاتي الدوراني لكرة مصمته عن كرة مجوفة تسقط من منحدر

قوانين القصور الذاتي الدوراني


يختلف قانون حساب القصور الذاتي الدوراني طبقا لاختلاف موضع محور الدوران , أو شكل الجسم أو توزيع كتلته , أو كتلة الجسم



القصور الذاتي الدوراني للكتلة النقطية

إذا كانت الكتلة النقطية تدور حول محور دوران

$$I = m d^2 = m r^2$$



الرمز	الاسم	الوحدة الدولية
I	القصور الذاتي الدوراني	Kg. m ²
m	الكتلة	Kg
d	بعد الكتلة عن محور الدوران	m
r	نصف قطر الدوران	m


إذا كانت الكتلة النقطية منطبقة على محور الدوران

$$I = \text{zero}$$


$$d = \text{zero}$$



احسب القصور الذاتي الدوراني لعصا طولها 65 cm وكتلتها مهملة
تنتهي بكتلتين نقطيتين متساويتين مقدار كل منهما 0.3 Kg وتدور حول
أحد طرفيها كما بالشكل , علما أن $I = mr^2$




احسب القصور الذاتي الدوراني للعصا عندما تدور حول مركز كتلتها




ملاحظات

- القصور الذاتي الدوراني ليس بالضرورة أن يكون كمية محددة للجسم نفسه
- القصور الذاتي الدوراني للجسم يكون أقل عندما تتوزع الكتلة نفسها داخل الجسم بتقارب عن محور الدوران
- القصور الذاتي الدوراني للجسم يكون أكبر عندما تتوزع الكتلة نفسها داخل الجسم بتباعد عن محور الدوران
- يختلف مقدار القصور الذاتي الدوراني باختلاف موضع محور الدوران
- القصور الذاتي الدوراني لعصا تدور حول مركز ثقلها أقل منه عندما تدور حول محور يمر بأحد أطرافها




صفوة معلم الكويت

- يختلف مقدار القصور الذاتي الدوراني باختلاف توزيع الكتلة (جسم أجوف أو مصمت)



- يختلف مقدار القصور الذاتي الدوراني باختلاف شكل الجسم



- الجسم مهمل الكتلة ليس له قصور ذاتي دوراني

$$I = \text{zero}$$

- بالنسبة للكتلة النقطية , إذا مر محور الدوران بالكتلة يكون

$$I = \text{zero}$$



- احسب القصور الذاتي الدوراني لإسطوانة مصمته كتلتها 3 Kg و قطرها 20 cm و تتدحرج علي منحدر , علما بأن

$$I = \frac{1}{2} mr^2$$


صفوة معلم الكويت

حساب القصور الذاتي الدوراني



- عندما يمر محور الدوران بمركز ثقل الجسم يكون $I = I_0$ و يختلف قانون حساب I_0 حسب شكل الجسم كما هو موضح بالجدول السابق للأشكال الهندسية المختلفة
- لكن إذا كان محور الدوران يبعد عن مركز ثقل الجسم بمقدار d يستخدم نظرية المحور الموازي لحساب القصور الذاتي الدوراني


نظرية المحور الموازي



تسمح لنا النظرية بحساب القصور الذاتي الدوراني للجسم عندما يدور حول أي محور مواز للمحور المار بمركز ثقله ويبعد عنه مسافة d

$$I = I_0 + md^2$$

الرمز	الاسم	الوحدة الدولية
I_0	القصور الذاتي الدوراني عند المحور المار بمركز الثقل	Kg. m^2
I	القصور الذاتي الدوراني عند المحور الموازي	Kg. m^2
m	كتلة الجسم	Kg
d	المسافة الفاصلة بين المحورين	m



- ساق منتظمة المقطع كتلتها 3 Kg وطولها 2 m تدور حول نقطة O في منتصفها , إذا علمت أن القصور الذاتي الدوراني يحسب بالعلاقة $I = \frac{1}{12} mL^2$, احسب القصور الذاتي الدوراني للساق

- احسب القصور الذاتي الدوراني عندما يكون محور الدوران يبعد عن النقطة O مسافة 0.3 m

- احسب القصور الذاتي الدوراني عندما يكون محور الدوران عند طرف الساق



تدرب و تفوق

اختبارات الكترونية ذكية



سنقوم في هذا الدرس بعمل مقارنة بين الحركة الخطية و التي سبق دراستها مع الحركة الدورانية و سيتم تحويل الكميات التالية من الكمية الخطية إلى ما يعاثلها في الحركة الدورانية كما يلي

حركة في خط مستقيم		← →	الحركة الدورانية	
ازاحة خطية	S	← →	θ	ازاحة زاوية
سرعة خطية	v	← →	ω	سرعة زاوية (دورانية)
عجلة خطية	a	← →	θ''	عجلة زاوية (دورانية)
قوة	F	← →	τ	عزم قوة
كتلة	m	← →	I	القصور الذاتي الدوراني

مماثلة قوانين الحركة الدورانية

الحركة الخطية		الحركة الزاوية
$S_{(m)}$	معلق !	$\theta_{(rad)}$
$v_{(m/s)}$		$\omega_{(rad/s)}$
	$v = \omega r$	
$a_{(m/s^2)}$		$\theta''_{(rad/s^2)}$
	$a = \theta'' r$	
$F_{(N)}$		$\tau_{(Nm)}$
	$\tau = F r$	
$m_{(Kg)}$		$I_{(Kg \cdot m^2)}$
	$I = m r^2$	

الإزاحة في الحركة الدورانية

▪ إذا دار الجسم دورة واحدة كاملة يمكن حساب إزاحته كما يلي

$$\theta = 2\pi$$

▪ إذا دارا لجسم عدة دورات N يمكن حساب إزاحته كما يلي

$$\theta = N 2\pi$$



متغير	الاسم	وحدة
θ	الإزاحة الزاوية	rad
N	عدد الدورات	rev

صفوة معلم الكلوب

Q تدور الكتلة النقطية M على مسار دائري نصف قطره 50 cm , احسب

الإزاحة الزاوية للجسم عندما يقطع قوساً طوله 20 cm

عدد الدورات التي يعملها الجسم عندما يقطع إزاحة زاوية مقدارها 44 rad

السرعة الزاوية في الحركة الدورانية

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{t}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

الرمز	الاسم	الوحدة الدولية	
ω	السرعة الزاوية	rad/s	راديان / ثانية
f	التردد	rev/s	دورة/ثانية
T	الزمن الدوري	s	ثانية

معلق ⚠

Q تدور الكتلة النقطية M على مسار دائري نصف قطره 50 cm و بتردد 10 rev/s , احسب

السرعة الزاوية التي يتحرك بها الجسم

السرعة الخطية التي يتحرك بها الجسم

العجلة الزاوية في الحركة الدورانية

$$\theta'' = \frac{\Delta\omega}{t}$$



صفوة معلم الكويت

الحركة الدورانية منتظمة العجلة	الحركة الدورانية المنتظمة (منتظمة السرعة)
<p>الحركة الدورانية منتظمة العجلة</p> <ul style="list-style-type: none"> هي حركة الجسم عندما تتغير السرعة الزاوية للجسم المتحرك حركة دورانية بالنسبة للزمن تغيراً منتظماً $\theta'' = \frac{\Delta\omega}{t}$ $\theta'' \neq \text{zero}$ <ul style="list-style-type: none"> السرعة الزاوية متغيرة 	<p>الحركة الدورانية المنتظمة</p> <ul style="list-style-type: none"> هي حركة الجسم حين يقطع الجسم على محيط دائرة أقواساً متساوية في أزمنة متساوية حركة الجسم حين يسمح نصف القطر زوايا متساوية في أزمنة متساوية $\omega = \frac{\Delta\theta}{t}$ $\theta'' = \text{zero}$ <ul style="list-style-type: none"> السرعة الزاوية ثابتة



معادلات الحركة الدورانية المعجلة بانتظام

معلق !

$$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \theta'' t^2$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2 \theta'' \theta$$

الرمز	الاسم	الوحدة الدولية	الوحدة الدولية
θ''	العجلة الزاوية	rad/s ²	راديان/ثانية ²
ω_0	السرعة الابتدائية	rad/s	راديان/ثانية
ω	السرعة النهائية	rad/s	راديان/ثانية
t	الزمن	s	ثانية
θ	الإزاحة الزاوية	rad	راديان



- إذا تحرك الجسم من السكون
- إذا توقف الجسم عن الحركة

$$\omega_0 = \text{zero}$$

$$\theta'' = +$$

$$\omega = \text{zero}$$

$$\theta'' = -$$

صفوة معلم الكويت



تدور الكتلة النقطية M من **السكون** في مدار نصف قطره 50 cm , و بعجلة زاوية منتظمة مقدارها 10 rad/s^2 , احسب

▪ السرعة الزاوية بعد مرور زمن 10 s

▪ الإزاحة الزاوية للكتلة خلال 10 s

▪ عدد الدورات التي تدورها الكتلة خلال 10 s

تتحرك كتلة نقطية علي مسار دائري بسرعة زاوية مقدارها 10 rad/s لتتوقف عن الحركة بعد مرور زمن 5 s , احسب

▪ العجلة الزاوية للكتلة النقطية

معلق ⚠

▪ الإزاحة الزاوية للكتلة خلال زمن 5 s

▪ عدد الدورات التي تدورها الكتلة خلال نفس الفترة الزمنية

صفوة معلم الكويت



التمثيل البياني لمعادلات الحركة الدورانية بعجلة منتظمة

إذا تحرك الجسم بعجلة دورانية منتظمة من السكون تكون سرعته الابتدائية تساوي صفر

$$\omega_0 = \text{zero}$$

و بالتالي تصبح المعادلات كما يلي :



$$\omega = \omega_0 + \theta''t$$

$$\omega = \theta''t$$


عندما يدور الجسم بعجلة زاوية منتظمة تكون **السرعة الدورانية النهائية** تتناسب طرديا مع **الزمن**



$$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \theta'' t^2$$

$$\theta = \frac{1}{2} \theta'' t^2$$

عندما يدور الجسم بعجلة زاوية منتظمة تكون **الإزاحة الزاوية** تتناسب طرديا مع **مربع الزمن** **معلق** ⚠️



$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2 \theta'' \theta$$

$$\omega^2 = 2 \theta'' \theta$$

عندما يدور الجسم بعجلة زاوية منتظمة تكون **مربع سرعته الدورانية النهائية** تتناسب طرديا مع **الإزاحة الزاوية**



هو نظام من جزئيات تبعد عن بعضها بعضا مسافات متساوية , وهو ثابت الشكل لا يتغير بتأثير القوى الخارجية أو عزوم القوى , أي أنه غير قابل للتشكيل أو التشويه

الجسم المصمت

- في الحركة الخطية لا نفرق بين كتلة نقطية و جسم مصمت لأن حركة الجسم تمثل بحركة النقطة أو حركة مركز الثقل للجسم
- في الحركة الدورانية لابد أن نفرق بين الكتلة النقطية و الجسم المصمت لأن شكل الجسم و طريقة توزيع كتلته بالنسبة لمحور الدوران له تأثير على حركته

صفوة علمي الكويت

علل لما يأتي :

تطبيق معادلات الحركة الدورانية على كتلة نقطية يختلف عن تطبيقها على جسم مصمت

الحركة الدورانية لجسم مصمت لا تتمثل بحركة مركز ثقله



زمن وصول إسطوانة مفرغة إلى أسفل منحدر يختلف عن زمن وصول إسطوانة مصمتة لها نفس الكتلة ونصف القطر



قوانين نيوتن للحركة الدورانية

تطبق القوانين الثلاثة لنيوتن على الحركة الدورانية كما يلي

القانون الأول لنيوتن (للحركة الدورانية)

يبقى الجسم الساكن ساكناً والجسم المتحرك يستمر في حركته الدورانية المنتظمة ما لم تؤثر عليهما **عزم قوة** خارجية

علل لما يأتي :

لا يمكن لإطار السيارة أن يدير نفسه أو يوقف نفسه عن الدوران **معلق** !



القانون الثاني لنيوتن (للحركة الدورانية)

محصلة **عزوم القوى** الخارجية المؤثرة في النظام حول محور دوران ثابت تساوي حاصل ضرب **العجلة الدورانية** و **العصور الذاتي الدوراني** حول محور الدوران نفسه

عند التأثير على الجسم بعزوم مختلفة يصبح القانون :


$$\sum \tau = I \alpha$$

الرمز	الاسم	الوحدة الدولية
θ'' <td>العجلة الزاوية</td> <td>راديان / ثانية²</td>	العجلة الزاوية	راديان / ثانية ²
τ <td>عزم القوة</td> <td>نيوتن . متر</td>	عزم القوة	نيوتن . متر
I <td>العصور الذاتي الدوراني</td> <td>كيلوجرام . متر²</td>	العصور الذاتي الدوراني	كيلوجرام . متر ²

صفوة معلم الكويت

ارسم العلاقات البيانية بين كل مما يلي :

العجلة الزاوية - القصور الذاتي الدوراني (عند ثبات عزم القوة)



عزم القوة - العجلة الزاوية



عزم القوة - القصور الذاتي الدوراني



علل لما يأتي :

عزم العزوم لجسم يدور بسرعة زاوية منتظمة يساوي صفر

عزم كتلة نقطية كتلتها 2 Kg حول محور ثابت يبعد عنها 50 cm بتأثير عزم قوى خارجية ثابتة , بدأت الكتلة حركتها من سكون و اكتسبت سرعة بتردد مقداره 2 rev/s خلال 3.14 s , احسب

العجلة الزاوية

معلق ⚠

محصلة عزم القوى الخارجية



عزم يدور برغي حول محور يمر بمركز كتلته بتردد 3600 rev/min و أثر عليه عزم ازدواج ثابتا بعكس الاتجاه يؤدي إلى توقفه بعد دقيقة واحدة , علما أن القصور الذاتي الدوراني له يساوي 0.2 Kg.m² , احسب

العجلة الزاوية التي يتحرك بها البرغي

صفوة معلم الكويت

▪ عزم الدوران الذي أدى إلى توقفه

▪ الإزاحة الزاوية التي يعملها البرغي حتى يتوقف

▪ عدد الدورات التي أكملها البرغي حتى يتوقف



عجلة مطحنة عبارة عن قرص كتلته **10 Kg** ونصف قطره **10 cm** (بتردد) **1500 rev/m** ، انزلت بانتظام **لتتوقف** في زمن **10 s** علماً بأن عزم القصور الذاتي للعجلة يتعين من العلاقة $I = \frac{1}{2} m r^2$ ، احسب

▪ العجلة الزاوية التي تحرك بها القرص

معلق ⚠

▪ عزم القوة الذي أثر عليها



صفوة معلمى الكويت

تدور عجلة قطرها 1.5 m و كتلتها 4 Kg تحت تأثير عزم قوة مماسيه مقدارها $F = 6\text{ N}$ تنطلق العجلة من السكون (علماً بأن $I = mr^2$) ، احسب

عزم القوة المؤثر

العجلة الزاوية

الإزاحة الزاوية خلال زمن 5 s

معلق ⚠

عدد الدورات التي تكملها العجلة خلال زمن 5 s




القانون الثالث لنيوتن (للحركة الدورانية)

لكل عزم قوة عزم قوة مضاد له (يساويه في المقدار ويعاكسه في الاتجاه)

علل لما يأتي :

تدور العجلات المسننة في اتجاهين متعاكسين



صفوة معلمى الكويت



$$W = \tau \theta$$

الرمز	الاسم	الوحدة الدولية	
W	الشغل	J	جول
θ	الأزاحة الزاوية	rad	راديان
τ	عزم القوة	N.m	نيوتن.متر



اذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من :

الشغل الناتج عن عزم قوة منتظمة

ارسم العلاقات البيانية بين كل مما يلي :


الشغل - الإزاحة الزاوية

الشغل - عزم القوة



حبل ملفوف حول قرص حديدي قطره 2 m و كتلته 5 Kg , سحب الحبل بقوة ثابتة 50 N لمسافة **مترين** إلى الأسفل , احسب

عزم القوة المؤثر



الإزاحة الزاوية

الشغل الناتج عن عزم القوة

صفوة معلمى الكويت



الطاقة الحركية في الحركة الدورانية

$$KE = \frac{1}{2} I \omega^2$$

الرمز	الاسم	الوحدة الدولية	
KE	الطاقة الحركية	J	جول
I	القصور الذاتي الدوراني	Kg . m ²	كيلوجرام . متر ²
ω	السرعة الدورانية	rad/s	راديان/ثانية

اذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من :

الطاقة الحركية في الحركة الدورانية

ارسم العلاقات البيانية بين كل مما يلي :

الطاقة الحركية الدورانية - القصور الذاتي الدوراني
الطاقة الحركية الدورانية - مربع السرعة الزاوية



قرص مصمت كتلته 0.25 Kg و نصف قطره 10 cm يدور حول محور عمودي يمر في مركزه بسرعة زاوية مقدارها

10 rad/s , احسب الطاقة الحركية الدورانية للقرص علما بأن $I = \frac{1}{2} m r^2$



هي المعدل الزمني للتحيز شغل

القدرة P

الرمز	الاسم	الوحدة الدولية	
P	القدرة	Watt	وات
τ	عزم القوة	N . m	نيوتن . متر
ω	السرعة الدورانية	rad/s	راديان/ثانية

صفحة معلم الكويت

ما المقصود بكل من :


قدرة جسم يتحرك حركة دورانية 10 watt

اذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من :


القدرة الناتجة عن عزم القوة الدورانية

ارسم العلاقات البيانية بين كل مما يلي :

القدرة - السرعة الزاوية



القدرة - عزم القوة



قرص مصمت كتلته 1 Kg و نصف قطره 50 cm , قصوره الذاتي الدوراني $I = \frac{1}{2} m r^2$ طبق عليه عزم قوة منتظم مقداره 5 N.m , يبدأ دورانه من السكون , احسب العجلة الزاوية التي يتحرك بها القرص

معلق !

السرعة الزاوية بعد زمن ثانيتين

القدرة التي يبذلها عزم القوة في ثانيتين

صفوة معلم الكويت



• كتلة نقطية كتلتها 0.1 Kg و قصورها الذاتي الدوراني يساوي 10 Kg.m^2 تتحرك بسرعة دورانية مقدارها 20 rad/s أثرت فيها عزم قوة مقدارها 10 N.m لمدة 5 s , احسب

▪ العجلة الزاوية التي يتحرك بها الجسم

▪ السرعة الزاوية النهائية للكتلة النقطية

▪ الإزاحة الزاوية للكتلة

▪ عدد الدورات التي تعملها الكتلة

معلق ⚠

▪ طاقة الحركة الابتدائية و النهائية للكتلة

▪ مقدار الشغل المبذول



صفوة معلمى الكويت



طُبقت قوة ثابتة $N (50)$ مماسياً على حافة قرص نصف قطره $cm (10)$ وعزم القصور الذاتي له $Kg.m^2 (20)$ ، تحرك القرص من السكون لمدة $s (40)$ ، احسب

العجلة الزاوية للقرص

السرعة الزاوية النهائية

الإزاحة الزاوية التي عملها الجسم

عدد اللفات خلال هذه الفترة الزمنية

معلق ⚠️

الشغل المبذول خلال هذه الفترة الزمنية

طاقة الحركة النهائية للحركة

القدرة خلال هذه الفترة الزمنية

تدرب و تفوق 🎯

اختبارات الكترونية ذكية



صفوة معلمي الكويت





كمية الحركة و الدفع

- القصور الذاتي للجسم المتحرك
- حاصل ضرب الكتلة ومتجه السرعة

كمية الحركة

$$\vec{P} = m \vec{v}$$

الرمز	الاسم	الوحدة الدولية
P	كمية الحركة	Kg . m/s
m	الكتلة	Kg
v	السرعة	m/s

علل لما يأتي :

كمية الحركة كمية متجهة

إيقاف شاحنة كبيرة أصعب من إيقاف سيارة صغيرة تسير بنفس السرعة

إذا تحركت سيارتان لهما نفس الكتلة بسرعتين مختلفتين , فإن السيارة الابطأ يسهل إيقافها

اذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من :

كمية الحركة

ارسم العلاقات البيانية بين كل مما يلي :

كمية الحركة - السرعة

كمية الحركة - الكتلة



يكون لكمية الحركة اتجاه السرعة دائما , لأن كتلة الجسم دائما موجبة

كمية الحركة الخطية لنظام مكون من عدة كتل نقطية

كمية الحركة الخطية الكلية للنظام تساوي حاصل جمع كمية الحركة للأجسام

$$\vec{P}_{\text{system}} = \sum \vec{P} = \vec{P}_1 + \vec{P}_2 + \vec{P}_3 + \dots + \vec{P}_n$$




متجه له مقدار يساوي وحدة واحدة من وحدات القياس و يرمز له باستخدام حرف مع إشارة المتجه عليه و يستخدم ليشير إلى الاتجاه في الفراغ

احداثيات المتجهات

متجه الوحدة

متجه الوحدة على المحور x يرمز له بالرمز \vec{i} و على المحور y بالرمز \vec{j} و يمكن تمثيل المتجهات كما هو موضح بالشكل التالي



الضرب النقطي لمتجه الوحدة لنفسه يساوي 1


$$\vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = 1$$

معلق! ⚠️

$$\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{i} = \text{zero}$$

الضرب النقطي لمتجهين متعامدين يساوي 0

في الشكل ثلاث متجهات كمية الحركة لثلاث كتل نقطية , احسب كمية الحركة المتجهة للنظام



حساب التغير في كمية الحركة الخطية لجسم

إذا تحرك جسم كتلته m و تغيرت سرعته من v_1 إلى v_2 , يمكن حساب التغير في كمية الحركة الخطية له كما يلي :

$$\vec{P}_1 = m \vec{v}_1$$

$$\vec{P}_2 = m \vec{v}_2$$

$$\Delta \vec{P} = \vec{P}_2 - \vec{P}_1$$

$$\Delta \vec{P} = m \vec{v}_2 - m \vec{v}_1$$

$$\Delta \vec{P} = m (\vec{v}_2 - \vec{v}_1)$$

$$\Delta \vec{P} = m \Delta \vec{v}$$


الرمز	الاسم	الوحدة الدولية
ΔP	التغير في كمية الحركة	Kg . m/s
m	الكتلة	Kg
Δv	التغير في السرعة	m/s

اذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من :


التغير في كمية الحركة

ارسم العلاقات البيانية بين كل مما يلي :

تغير كمية الحركة - الكتلة



تغير كمية الحركة - تغير السرعة



يتحرك جسم كتلته **10 Kg** بسرعة **4 m/s** في الاتجاه الموجب لمحور **x** أثرت فيه قوة فزادت سرعته إلى **8 m/s** ، احسب

▪ كمية الحركة الخطية الابتدائية

▪ كمية الحركة الخطية النهائية

▪ مقدار التغير في كمية الحركة



حاصل ضرب مقدار القوة في زمن تأثيرها علي الجسم

الدفع

$$\vec{I} = \vec{F} \Delta t$$

الرمز	الاسم	الوحدة الدولية
I	الدفع	N.s
F	القوة	N
Δt	زمن التأثير - زمن التلامس	s

علل لما يأتي :

الدفع كمية متجهة




اذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من :

الدفع

ارسم العلاقات البيانية بين كل مما يلي :

الدفع - زمن التأثير

الدفع - القوة



الدفع كمية متجهة لها اتجاه القوة , لأن الزمن دائما كمية موجبة
القوة المؤثرة تكون دائما قوة متغيرة مثل الدفع الذي تتلقاه كرة من قدم لاعب
حيث تتغير قيمة القوة من صفر في لحظة تماس الكرة حتي تصل إلى قيمة عظمي
ثم تتناقص إلى أن تتلاشى كما بالشكل المقابل


متوسط القوة

القوة الثابتة التي لو أثرت في الجسم للفترة
الزمنية نفسها لأحدثت الدفع نفسه الذي تحدثه
القوة المتغيرة

وبالتالي سنتعامل مع القوة في المسائل على أنها متوسط القوة لتصبح قوة منتظمة

حساب الدفع بيانيا

يمكن حساب الدفع بيانيا عن طريق حساب المساحة تحت منحنى القوة - الزمن



احسب بيانيا الدفع من الشكل البياني التالي



$$\vec{I} = \overline{\Delta P}$$

$$\vec{I} = \vec{F} \Delta t = \overline{\Delta P} = m \Delta \vec{v}$$

الرمز	الاسم	الوحدة الدولية
I	الدفع	N.s
F	القوة	N
Δt	زمن التأثير - زمن التلامس	s
ΔP	التغير في كمية الحركة	Kg . m/s
Δv	التغير في السرعة	m/s


ملاحظات

- الدفع يساوي مقدار التغير في كمية الحركة الخطية
- كلما كان الدفع الذي يتلقاه الجسم أكبر كلما كان التغير في كمية الحركة أكبر
- إذا كان الدفع في نفس اتجاه الحركة فإن كمية الحركة تزداد (تزداد سرعة الجسم)
- إذا كان الدفع في عكس اتجاه الحركة فإن كمية الحركة تقل (تقل سرعة الجسم)
- القوة و الزمن عاملان أساسيان لإحداث تغير في كمية الحركة
- كلما كان تأثير القوة أكبر في الجسم يعني ذلك وجود تغير أكبر في السرعة و بالتالي تغير أكبر في كمية الحركة

ارسم العلاقات البيانية بين كل مما يلي :

التغير في كمية الحركة - القوة


الدفع - التغير في سرعة الجسم



عند ثبات قيمة التغير في كمية الحركة (الدفع الذي يتلقاه الجسم) فإنه عندما يزداد زمن التأثير يقل تأثير قوة الدفع , و عندما يقل زمن التأثير يزداد تأثير قوة الدفع

صفوة معلم الكويت

إن حدث التغير لكمية الحركة في فترة زمنية أطول يكون تأثير قوة الدفع أقل (حالة أ) بينما إذا حدث التغير في كمية الحركة الخطية في فترة زمنية قصيرة يكون تأثير القوة أكبر (حالة ب) , وذلك عند ثبات قيمة التغير في كمية الحركة الخطية



علل لكل مما يلي :

عند اصطدام سيارة في حائط إسمنتي فإنها تتهشم بينما عند اصطدامها بجبل من القش لا تصاب بأذى

من أهم التطبيقات علي زيادة زمن التأثير هو **الوسادة الهوائية** في السيارات , حيث تعمل علي زيادة زمن التلامس مع رأس السائق عند حدوث الاصطدام و بالتالي يقل تأثير القوة علي رأسه و تخف من حدة الحادث , بينما إذا اصطدم رأس السائق مباشرة بعقود السيارة فسيكون زمن التلامس قليلا للغاية و بالتالي تأثير القوة كبير مما يعمل على إصابة السائق بصورة خطيرة

علل لكل مما يلي :

استخدام الوسادة الهوائية في السيارات لحماية الركاب

جسم ساكن كتلته **100 g** تعرض لقوة مقدارها **100 N** لفترة زمنية مقدارها **0.01 s** , احسب

التغير في كمية الحركة

الدفع



صفوة معلم الكويت

▪ التغير في سرعة الجسم

▪ سرعة الجسم النهائية

❏ جسم كتلته **3 Kg** أثرت فيه قوة مقدارها **12 N** فزادت سرعته من **10 m/s** إلى **18 m/s** ، احسب

▪ الدفع المعطى للجسم

▪ التغير في كمية الحركة للجسم

▪ زمن تأثير القوة

❏ يبين الخط البياني الموضح بالشكل التغير في كمية الحركة لجسم كتلته **2 Kg** يتحرك في خط مستقيم على سطح أفقي أملس ، احسب


▪ كمية حركته الخطية الابتدائية

▪ كمية حركته الخطية النهائية

▪ التغير في كمية حركته

▪ الدفع الذي تلقاه الجسم

▪ مقدار متوسط القوة المؤثرة عليه



صفوة معلم الكويت



سقطت كرة مطاطية كتلتها 420 g من مكان مرتفع فوصلت سطح الأرض بسرعة 20 m/s ثم ارتدت رأسياً إلى أعلى بسرعة 15 m/s إذا كان زمن تلامسها بالأرض 0.1 s ، احسب


▪ كمية الحركة الخطية الابتدائية

▪ كمية الحركة الخطية النهائية

▪ مقدار التغير في كمية الحركة

▪ القوة المؤثرة في الكرة لحظة اصطدامها بالأرض

▪ كرة كتلتها 0.15 Kg ، إذا كانت سرعتها لحظة اصطدامها بالأرض تساوي 6.5 m/s و سرعة ارتدادها 3.5 m/s ، احسب مقدار و اتجاه القوة المؤثرة في الأرض نتيجة الاصطدام إذا استمر لمدة 0.025 s



صفوة معلمى الكويت

القانون الثاني لنيوتن

مشتق كمية الحركة بالنسبة للزمن يساوي محصلة القوي الخارجية المؤثرة في النظام
 ▪ ويمكن إيجاد صيغة جديدة للقانون الثاني لنيوتن كما يلي :

$$\Sigma \vec{F} = m \vec{a}$$

$$\vec{F} \Delta t = \Delta \vec{P}$$

$$\Sigma \vec{F} = \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t} = \frac{d \vec{P}}{d t}$$

الرمز	الاسم	الوحدة الدولية
ΔP	التغير في كمية الحركة	Kg m/s
F	القوة	N
Δt	الزمن	s
$\frac{d \vec{P}}{d t}$	مشتقة كمية الحركة بالنسبة للزمن	Kg m/s ²

- كتلة نقطية مقدارها **1 Kg** تتحرك بسرعة منتظمة **10 m/s** في الاتجاه الموجب لمحور **x** , أثرت قوة منتظمة على الجسم لمدة **4 s** فخفضت سرعتها إلى **2 m/s** دون تغير اتجاهها , احسب
 ▪ كمية الحركة قبل تأثير القوة و بعده

- التغير في كمية الحركة

- الدفع

- مقدار القوة المؤثرة في الجسم و اتجاهها

صفوة معلم الكويت



تدرب و تفوق

اختبارات الكترونية ذكية



كمية الحركة الخطية

حفظ كمية الحركة الخطية (التصادمات)

تنقسم القوة إلى نوعين :

- قوة خارجية : تحدث شغلا و تؤدي إلى تغير في سرعة الجسم و كمية حركته
- قوة داخلية : لا تحدث شغل و لا تغير من سرعة الجسم ولا كمية حركته

عندما تؤثر قوى خارجية على النظام فإن كمية الحركة تتغير (تصبح غير محفوظة) و يتغير مقدار السرعة أو اتجاهها أو المقدار والاتجاه معا

مثال

- عندما تؤثر قوة الاحتكاك على السيارة المتحركة في خط مستقيم فإن مقدار سرعة السيارة تتغير و بالتالي تتغير كمية الحركة
- في الحركة الدائرية يتغير اتجاه السرعة الخطية من نقطة إلى أخرى و بالتالي يحدث تغير في كمية الحركة

عندما تؤثر قوى داخلية على النظام فإن كمية الحركة لا تتغير (تصبح محفوظة) و لا يتغير مقدار السرعة أو اتجاهها

مثال

- قوى التفاعل بين الجزيئات الموجودة داخل كرة القدم ليس لها تأثير في تغير سرعتها و كمية حركتها
 - إذا دفعت مقعد السيارة الأمامي فيما تجلس أنت في المقعد الخلفي لا يحدث ذلك تغير في كمية الحركة للسيارة أو في سرعتها
 - وذلك لأن قوى التفاعل بين الجزيئات أو قوتك المبذولة على المقعد هي قوى داخلية تتواجد على شكل زوج من القوى المتزنة (محصلتها تساوي صفرا) وبالتالي يلغي تأثيرها داخل الجسم
- وبالتالي : **لا يحدث تغير في كمية الحركة إلا في وجود قوة خارجية مؤثرة على النظام أو الجسم**

إذا كانت القوة الخارجية المؤثرة على النظام تساوي صفر فإن

$$\Sigma \vec{F}_{\text{ext}} = \frac{d\vec{P}}{dt} = \text{zero}$$

في غياب القوى الخارجية المؤثرة , تبقى كمية الحركة للنظام ثابتة ومنتظمة و لا تتغير

حفظ (بقاء) كمية الحركة

أي كمية فيزيائية لا تتغير مع الزمن تعتبر كمية محفوظة



هناك أمثلة عديدة محفوظة فيها كمية الحركة مثل :

- النشاط الاشعاعي للذرات
- تصادم السيارات
- انفجار النجوم
- التفاعل بين جزيئات الغاز

لأن القوى المؤثرة في هذه الأنظمة تعتبر قوة داخلية لا تغير السرعة و بالتالي لا تحدث تغيرا في كمية الحركة

علل لما يأتي :

❏ إذا دفعت مقعد السيارة بينما أنت جالس في المقعد الخلفي لا يحدث ذلك تغيرا في كمية الحركة للسيارة


❏ قوى التفاعل بين جزيئات الغاز داخل كرة قدم لا تغير من كمية الحركة للكرة

❏ قوى الاحتكاك المؤثرة علي اطار السيارة تغير من كمية الحركة للسيارة

❏ في الحركة الدائرية تعتبر كمية الحركة غير محفوظة

❏ سيارة كتلتها **1500 Kg** تتحرك بسرعة **120 Km/h** قرر السائق تخفيض سرعتها , هل كمية حركة النظام محفوظة ؟ احسب متوسط القوة المبذولة لإيقاف السيارة خلال **8 s**





سرعة ارتداد المدفع

- النظام المكون من المدفع و القذيفة متزن قبل الإطلاق لأن وزن المدفع لاسفل مساوي لقوة رد الفعل لأعلى
- يعتبر ارتداد المدفع عند إطلاق القذيفة أحد تطبيقات حفظ كمية الحركة , لأن عند الإطلاق ينفجر البارود ويقذف القذيفة خارج المدفع و تعتبر قوى داخلية و تبقى القوى الخارجية تساوي صفر

علل لما يأتي :

في النظام المكون من مدفع و قذيفة تكون كمية الحركة للنظام محفوظة

و مما سبق نستنتج أن :

$$\Delta \vec{P} = \text{zero}$$

$$\vec{P}_i = \vec{P}_f$$

وحيث إن المدفع و القذيفة كانا ساكنين قبل الإطلاق يصبح

$$\vec{P}_i = \text{zero}$$

وبالتالي :

$$0 = \vec{P}_f$$

$$0 = m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2$$

$$m_1 \vec{v}'_1 = - m_2 \vec{v}'_2$$

الإشارة السالبة تعني أن السرعتين متعاكستين نتيجة الارتداد وبالمثل يمكن حساب سرعة ارتداد أي جسم



طلقة مسدس كتلتها $g (50)$ انطلقت بسرعة $(m/s) 120$ من مسدس كتلته $g (600)$, احسب سرعة ارتداد المسدس

علل لما يأتي :

يصنع المسدس (المدفع) بحيث تكون كتلته كبيرة

سرعة ارتداد المدفع أقل من سرعة انطلاق القذيفة

ترتد البندقية للخلف عند خروج القذيفة منها

تنطلق الدراجة المائية إلى الأمام بدفعها للماء نحو الخلف

المشي عملية تدافع بين القدم ووسطح الأرض لكننا لا نرى الأرض تتحرك

يقف رجل كتلته **76 Kg** على لوح خشبي طافي كتلته **45 Kg** إذا خطا بعيدا عن اللوح الخشبي بسرعة **2.5 m/s** , كم ستبلغ سرعة اللوح الخشبي

انفجر جسم كتلته **200 g** و انقسم إلى نصفين متساويين , احسب سرعة الجزء الثاني منه إذا كانت سرعة الجسم الأول **0.1 m/s** – على المحور الأفقي بالاتجاه السالب



تدرب و تفوق

اختبارات الكترونية ذكية



عملية تتم بين جسمين لفترة زمنية قصيرة و تكون القوة الخارجية المؤثرة مهملة بالنسبة للقوة الداخلية المسببة للتصادم

التصادمات

علل لما يأتي :

يعتبر التصادم نظاما معزولا

يعتبر الانفجار نظام معزولا

وبالتالي : إذا حدثت عملية تصادم أو انفجار في فترة زمنية قصيرة جدا تكون كمية حركة النظام محفوظة
 كمية الحركة للنظام قبل التصادم = كمية الحركة للنظام بعد التصادم

أنواع التصادمات

تصادمات لا مرنة	تصادمات مرنة كلياً
تكون كمية الحركة للنظام محفوظة كمية الحركة للنظام قبل التصادم = كمية الحركة للنظام بعد التصادم	تكون كمية الحركة للنظام محفوظة كمية الحركة للنظام قبل التصادم = كمية الحركة للنظام بعد التصادم
تكون الطاقة الحركية للنظام غير محفوظة الطاقة الحركية للنظام قبل التصادم \neq الطاقة الحركية للنظام بعد التصادم	تكون الطاقة الحركية للنظام محفوظة الطاقة الحركية للنظام قبل التصادم = الطاقة الحركية للنظام بعد التصادم



التصادم المرن كلياً (تام المرونة)

- تكون كمية الحركة للنظام محفوظة
 كمية الحركة للنظام بعد التصادم = كمية الحركة للنظام قبل التصادم

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2$$

- تكون الطاقة الحركية للنظام محفوظة
 الطاقة الحركية للنظام بعد التصادم = الطاقة الحركية للنظام قبل التصادم

$$KE_{\text{قبل}} = KE'_{\text{بعد}}$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v'^2_1 + \frac{1}{2} m_2 v'^2_2$$

- لا ينتج تشوهات أو يتولد حرارة بين الأجسام المتصادمة لأنه لا يحدث فقد في الطاقة نتيجة التصادم
- من أمثلة التصادم المرن كلياً تصادم الجزيئات الصغيرة و الذرات

- يمكن حساب سرعة كلا من الجسمين بعد التصادم من العلاقات التالية

$$\vec{v}'_1 = \frac{2 m_2 \vec{v}_2 + (m_1 - m_2) \vec{v}_1}{(m_1 + m_2)}$$

$$\vec{v}'_2 = \frac{2 m_1 \vec{v}_1 - (m_1 - m_2) \vec{v}_2}{(m_1 + m_2)}$$

صفوة معلمى الكويت

• يتحرك جسم كتلته 5 Kg بسرعة مقدارها 2 m/s في الاتجاه الموجب $+x$ تصادم مع جسم آخر كتلته 3 Kg يتحرك بسرعة 2 m/s عكس اتجاه حركة الجسم الأول ، احسب سرعة كل من الجسمين بعد التصادم وحدد اتجاه كل منهما (بفرض أن التصادم تام المرونة)



حالات خاصة :

- إذا كانت الكتلة m_2 ساكنة قبل التصادم :
- إذا كانت الكتلة m_1 أكبر من الكتلة m_2 ستتحرك الكتلتان بعد التصادم باتجاه v_1
- إذا كانت الكتلة m_1 أصغر من الكتلة m_2 سترتد m_1 بعكس اتجاه v_1 و تتحرك الكتلة m_2 في اتجاه v_1
- إذا كانت $m_1 = m_2$ نجد أن m_1 بعد التصادم تصبح ساكنة و تتحرك الكتلة m_2 في اتجاه v_1 و بنفس المقدار (كمية الحركة انتقلت كلياً من الجسم 1 إلى الجسم 2)

ماذا يحدث في الحالات التالية :

- إذا تصادم جسمان m_1 , m_2 و كانت الكتلة m_2 ساكنة قبل التصادم ماذا يحدث في الحالات التالية :
- إذا كانت الكتلة m_1 أكبر من الكتلة m_2

- إذا كانت الكتلة m_1 أصغر من الكتلة m_2

- إذا كانت $m_1 = m_2$



التصادمات اللامرنة

تصادم لا مرّن كلياً	تصادم لا مرّن
يؤدي التصادم إلى التهام الأجسام المتصادمة لتصبح جسماً واحداً ولها سرعة مشتركة بعد التصادم	ترتد الجزيئات بعيداً عن بعضها البعض بسرعات مختلفة عن سرعتها قبل التصادم
تكون الطاقة الحركية للنظام غير محفوظة	
الطاقة الحركية للنظام قبل التصادم \neq الطاقة الحركية للنظام بعد التصادم	
يتحول الفقد في الطاقة الحركية إلى تشوهات في شكل النظام	



التصادم اللامرن كليا

- تكون كمية الحركة للنظام محفوظة

كمية الحركة للنظام بعد التصادم = كمية الحركة للنظام قبل التصادم

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = (m_1 + m_2) \vec{v}'$$

- تكون الطاقة الحركية للنظام غير محفوظة

الطاقة الحركية للنظام بعد التصادم \neq الطاقة الحركية للنظام قبل التصادم

$$KE_{\text{قبل}} \neq KE'_{\text{بعد}}$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \neq \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \vec{v}'^2$$

- يمكن حساب سرعة جملة الجسمين (النظام) بعد التصادم من العلاقات التالية :

$$\vec{v}' = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{(m_1 + m_2)}$$

- ينتج تشوهات أو يتولد حرارة بين الأجسام المتصادمة لأنه يحدث فقد في الطاقة الحركية نتيجة التصادم
- من أمثلة التصادم اللامرن كليا البندول القذفي

- يتحرك جسم كتلته 5 Kg بسرعة 3 m/s شمالا (الاتجاه الموجب لمحور y) تصادم مع جسم آخر كتلته 3 Kg يتحرك بسرعة 6 m/s جنوبا (الاتجاه السالب لمحور y) إذا التحم الجسمان و تحركا كجسم واحد ، احسب السرعة المشتركة للنظام بعد التصادم

- الفقد في الطاقة الحركية (أين تذهب الطاقة المفقودة)

يحدث فقد في طاقة حركة جملة الجسمين في التصادم اللامرن




- كرتان من الصلصال تتصادمان تصادما لا مرنا كليا , كتلة الكرة الأولى 0.5 Kg و تتحرك إلى اليمين بسرعة 4 m/s بينما الكرة الثانية كتلتها 0.25 Kg و تتحرك نحو اليسار بسرعة 3 m/s , احسب سرعة النظام المؤلف من الكتلتين بعد التصادم

مقدار التغير في مقدار الطاقة الحركية



هو جهاز يستخدم في قياس سرعة القذائف


البندول القذفي



يقوم مبدأ عمل البندول القذفي على حفظ كمية الحركة و حفظ الطاقة الميكانيكية

صفوة معلمى الكويت

• طلقة كتلتها 20 g انطلقت بسرعة 300 m/s لتصدم بالبندول القذفي المثبت فيه كتلة ساكنة مقدارها 5 Kg , اصب



▪ السرعة التي يتحرك بها جملة الجسمين بعد التصادم

▪ أقصى ارتفاع للبندول القذفي بعد التصادم



تدرب و تفوق

اختبارات الكترونية ذكية

