



الاحطاء

الفصل الثاني

11

الحادي عشر

صفوة معلمي الكومسي



2025-2024



مذكرات
النجاح
طريقك
للنجاح



66279318



لماذا؟

مذكرات النجاح


اختبارات الكترونية
لكل درس

- 1 شاملة ومختصرة
- 2 ملونة ومرتبطة
- 3 اختبارات قصيرة
- 4 اختبارات نهائية
- 5 مرتبة حسب الدروس
- 6 محلولة

معلمة صفوة الكوثر

فهرس المذكرة

وصف البيانات	
٥	الوسيط والربيع الأدنى والاعلى من جدول تكراري
٧	الوسيط والربيع الأدنى الأعلى لمجموعة من البيانات موزعة على فئات
٩	الالتواء وعلاقته بمقاييس النزعة المركزية
١٢	مقاييس التشتت
١٥	التوزيع الطبيعي
١٩	القيمة المعيارية
الاحتمال	
٢٣	المبدأ الأساسي للعد
٢٤	مضروب العدد
٢٥	التباديل
٢٧	التوافق
٣٠	نظرية ذات الحدين
٣٣	التجربة العشوائية وفضاء العينة
٣٥	تعيين احتمالات الحدث
٣٦	الاحداث المتنافية
٣٧	متمم الحدث
٣٩	الحدثان المستقلان





اختبار
الكروني
تدرب
و تعلم

الوسيط والربيع الأدنى والاعلى من جدول تكراري

تعريف

الوسيط: (أ) إذا كان عدد القيم (ن) فردياً: ترتيب الوسيط = $\frac{1+n}{2}$

(ب) إذا كان عدد القيم (ن) زوجياً: ترتيب الوسيط هو المتوسط الحسابي للقيمتين $\frac{n}{2}$ ، $1 + \frac{n}{2}$

تعريف


الربيع الأدنى: هو وسيط النصف الأدنى من قيم البيانات المرتبة تصاعدياً ورمزه r_1

تعريف

الربيع الأعلى: هو وسيط النصف الأعلى من قيم البيانات المرتبة تصاعدياً ورمزه r_3

تعريف

مخطط الصندوق ذي العارضتين: هو مخطط يتم عليه تمثيل مجمل الأعداد الخمسة وهي: القيمة



الصغرى، الربيع الأدنى، الوسيط، الربيع الأعلى، القيمة العظمى

١ بين الجدول التالي معدل أجر الموظفين بالدنار الكويتي مقابل كل ساعة عمل في بعض الشركات:

معدل الأجر	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	المجموع
التكرار	٢	٢	٢	٣	٢	٢	١٣

◀ رتب هذه البيانات بحسب القيم تصاعدياً .

نرتب البيانات تصاعدياً

١٠، ١٠، ٩، ٩، ٨، ٨، ٨، ٨، ٧، ٧، ٦، ٦، ٥، ٥

◀ أوجد الوسيط r_2 .

عدد القيم = ١٣ فردي

$$\text{ترتيب الوسيط} = \frac{1+n}{2} = \frac{1+13}{2} = 7$$


الوسيط = $(r_2) = 8$

◀ أوجد الربيع الأدنى r_1 ، والربيع الأعلى r_3 .

$$\text{الربيع الأدنى} = \frac{6+6}{2} = 6$$

$$\text{الربيع الأعلى} = \frac{9+9}{2} = 9$$

◀ مثل هذه البيانات بمخطط الصندوق ذي العارضتين



يمثل الجدول التكراري التالي مبيعات أحد المتاجر في أحد الأيام لأنواع مختلفة من ساعات اليد بالدينار الكويتي.

سعر الساعة	٥٠	٦٥	٧١	٩٥	١٢٠	المجموع
التكرار	٤	٢	٣	٥	٢	١٦

◀ رتب هذه البيانات بحسب القيم تصاعداً .

ترتيب البيانات تصاعدياً

١٢٠, ١٢٠, ٩٥, ٩٥, ٩٥, ٩٥, ٩٥, ٧١, ٧١, ٧١, ٦٥, ٦٥, ٥٠, ٥٠, ٥٠, ٥٠

◀ أوجد الوسيط r .

عدد القيم $n = ١٦$ (زوجي)

ترتيب الوسيط $= \frac{n}{2} = \frac{١٦}{2} = ٨$, $= ١ + \frac{n}{2} = ١ + \frac{١٦}{2} = ٩$

الوسيط $(r) = \frac{٧١+٧١}{2}$

◀ أوجد الربع الأدنى r_1 ، والربع الأعلى r_3 .

نصف مجموعة البيانات الأدنى عددها $= ٨$ (زوجي)

ترتيب الربع الأدنى $= \frac{n}{2} = \frac{٨}{2} = ٤$, $= ١ + \frac{n}{2} = ١ + \frac{٨}{2} = ٥$


الربع الأدنى $(r_1) = \frac{٥٧+٥٠}{2}$

نصف مجموعة البيانات الأدنى عددها $= ٨$ (زوجي)

ترتيب الربع الأعلى $= \frac{n}{2} = \frac{٨}{2} = ٤$, $= ١ + \frac{n}{2} = ١ + \frac{٨}{2} = ٥$

الربع الأعلى $(r_3) = \frac{٩٥+٩٥}{2}$

◀ مثل هذه البيانات بمخطط الصندوق ذي العارضتين





الوسيط والربيع الأدنى لأعلى لمجموعة من البيانات موزعة على فئات

الوسيط (r) الحد الأدنى لفئة الوسيط + $\frac{\frac{n}{2} - \text{التكرار المتجمع الصاعد السابق لفئة الوسيط}}{\text{التكرار الأصلي لفئة الوسيط}} \times \text{طول الفئة}$

الربيع الأدنى (r) الحد الأدنى لفئة الربيع الأدنى + $\frac{\frac{n}{4} - \text{التكرار المتجمع الصاعد السابق لفئة الربيع الأدنى}}{\text{التكرار الأصلي لفئة الربيع الأدنى}} \times \text{طول الفئة}$

الربيع الأعلى (r) الحد الأدنى لفئة الربيع الأعلى + $\frac{\frac{3n}{4} - \text{التكرار المتجمع الصاعد السابق لفئة الربيع الأعلى}}{\text{التكرار الأصلي لفئة الربيع الأعلى}} \times \text{طول الفئة}$

يمثل الجدول التالي أعمار سكان أحد الأبنية بالسنوات :

الفئة	--	-١٥	-٣٠	-٤٥	المجموع
التكرار	٤	٧	٦	٣	٢٠

◀ كون جدول التكرار المتجمع الصاعد .

الفئة	التكرار	أقل من الحد الأعلى للفئة	التكرار المتجمع الصاعد
--	٤	أقل من ١٥	٤
-١٥	٧	أقل من ٣٠	١١
-٣٠	٦	أقل من ٤٥	١٧
-٤٥	٣	أقل من ٦٠	٢٠
المجموع	٢٠		

◀ أوجد الوسيط حسابياً

مجموع التكرارات ن = ٢٠

ترتيب الوسيط = $\frac{n}{2} = \frac{20}{2} = 10$

الحد الأدنى لفئة الوسيط = ١٥

التكرار المتجمع الصاعد السابق لفئة الوسيط = ٤

التكرار الأصلي لفئة الوسيط = ٧ طول الفئة = ١٥

الوسيط (r) = الحد الأدنى لفئة الوسيط + $\frac{\frac{n}{2} - \text{التكرار المتجمع الصاعد السابق لفئة الوسيط}}{\text{التكرار الأصلي لفئة الوسيط}} \times \text{طول الفئة}$

$$= 10 + \frac{10 - 4}{7} \times 15 = 17,85$$

يمثل الجدول التكراري التالي درجات ٢٣ طالب في مادة الرياضيات في أحد فصول الصف الحادي عشر حيث النهاية العظمى ٣٠ درجة.

الفئة	-٥	-١٠	-١٥	-٢٠	-٢٥	المجموع
التكرار	٩	٦	٨	٥	٤	٣٢

◀ إيجاد جدول التكرار المتجمع الصاعد

الفئة	التكرار	أقل من الحد الأعلى للفئة	التكرار المتجمع الصاعد
-٥	٩	أقل من ١٥	٩
-١٠	٦	أقل من ٣٠	١٥
-١٥	٨	أقل من ٤٥	٢٣
-٢٠	٥	أقل من ٦٠	٢٨
-٢٥	٤	أقل من ٣٠	٣٢
المجموع	٣٢		

◀ الربع الأدنى والربع الأعلى

مجموع التكرارات $n = ٣٢$

ترتيب الربع الأدنى $(r) = \frac{٣٢}{٤} = ٨$

فئة الربع الأدنى هي $[١٠, ١٥]$

التكرار الأصلي لفئة الربع الأدنى $= ٦$ ، طول الفئة $= ١٥ - ١٠ = ٥$

التكرار المتجمع الصاعد السابق لفئة الربع الأدنى $= ٩$

الربع الأدنى $r =$ الحد الأدنى لفئة الربع الأدنى $+ \frac{\text{التكرار المتجمع الصاعد السابق لفئة الربع الأدنى}}{\text{التكرار الأصلي لفئة الربع الأعلى}} \times \text{طول الفئة}$

$$r = ١٠ + ٥ \times \frac{٩ - ٨}{٦} = ٩,١٦$$

ترتيب الربع الأعلى $(r) = \frac{٣٢ \times ٣}{٤} = ٢٤$

فئة الربع الأعلى $[٢٠, ٢٥]$

التكرار الأصلي لفئة الربع الأعلى $= ٥$ ، طول الفئة $= ٥$

التكرار المتجمع الصاعد السابق لفئة الربع الأعلى $= ٢٣$

الربع الأعلى $r =$ الحد الأدنى لفئة الربع الأعلى $+ \frac{\text{التكرار المتجمع الصاعد السابق لفئة الربع الأعلى}}{\text{التكرار الأصلي لفئة الربع الأعلى}} \times \text{طول الفئة}$

$$r = ٢٠ + ٥ \times \frac{٢٣ - ٢٤}{٥} = ٢١$$




صفحة لم الكلوب



اختبار
الكثروني
تدرب
و تعلم

الالتواء وعلاقته بمقاييس النزعة المركزية

الربط بين مقاييس النزعة المركزية والالتواء:




المنوال > الوسيط > المتوسط الحسابي
الالتواء الى اليمين (الالتواء الموجب)

- ١) الالتواء سالب المنوال هو أكبر قيمة
٢) الالتواء موجب المنوال هو أصغر قيمة
٣) الوسيط قيمته دائماً في المنتصف

ملاحظة

بين الجدول التالي أوزان ٣٠ طالباً بالكلوجرام.



تمثل البيانات التالية أطوال مجموعة من التلاميذ في إحدى المدارس (مقاسه بالسنتمتر):

١٣٩، ١٢٤، ١٣٨، ١٣٠، ١١٩، ١٢٤، ١٣٦، ١٣٤، ١٣٥

أحسب المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لهذه البيانات

$$\text{المتوسط الحسابي} = \frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عدد القيم}} = \frac{1179}{9} = 131$$

القيم مرتبة تصاعدياً ١١٩، ١٢٤، ١٢٤، ١٣٠، ١٣٤، ١٣٥، ١٣٦، ١٣٨، ١٣٩

الوسيط = ١٣٤




المنوال = ١٢٤

هل يوجد التواء؟ حدد نوعه إن وجد.

الوسيط < المتوسط < المنوال المنحي التكراري متماثل

لا يوجد التواء

العلاقة بين الالتواء ومخطط الصندوق ذي العارضتين

الالتواء إلى اليسار (الالتواء سالب)	الالتواء إلى اليمين (الالتواء موجب)	متماثل
		
يوضح مخطط الصندوق ذي العارضتين أن الوسيط أقرب إلى الربع الأعلى منه إلى الربع الأدنى	يوضح مخطط الصندوق ذي العارضتين أن الوسيط أقرب إلى الربع الأدنى منه إلى الربع الأعلى	يوضح مخطط الصندوق ذي العارضتين أن الوسيط يقع في المنتصف بين الربع الأدنى والربع الأعلى

صفوة معلم الكويت

في البيانات التالية: ٤٥، ٤٨، ٥٢، ٥٩، ٦٤، ٦٦، ٧٢، ٧٦، ٧٩، ٨٠، ٨٦، ٩٠، ٩٦، ٩٨، ١٠٥، ١٠٩، ١١٣، ١١٧، ١٢٢

أحسب الوسيط والربيع الأدنى والربيع الأعلى

عدد القيم (ن) = ١٩ (فردية)

ترتيب الوسيط =

الوسيط $r = ٨٠$

نصف مجموعة البيانات الأدنى عددها = ٩ (فردية)

ترتيب الربيع الأدنى =


الربيع الأدنى = ٦٤

نصف مجموعة البيانات الأعلى عددها = ٩ (فردية)

ترتيب الربيع الأعلى =

الربيع الأعلى = ١٠٥

أرسم مخطط الصندوق ذي العارضتين



هل البيانات تبين تماثلاً أم التواء إلى اليمين أو التواء إلى اليسار؟

الوسيط أقرب إلى الربيع الأدنى

اذن يوجد التواء إلى اليمين (التواء موجب)

اختر الإجابة الصحيحة:

١ وسيط البيانات التالية: ١، ٥، ١٠، ١٠، ٢٥، ٥٠ هو:

د ١٢,٥

ج ١٥

ب ١٠

أ ٢٠

٢ في البيانات التالية: ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١٣، ١٥ نصف المدى الربيعي يساوي

د ١٠

ج ٣

ب ٦

أ ٣٠

صفوة معلم الكويت



اختبار
الكروني
تدرب
و تعلم

مقاييس التشتت

المدى = القيمة العظمى - القيمة الصغرى

$$\text{نصف المدى الربيعي} = \frac{\text{الربيع الأعلى} - \text{الربيع الأدنى}}{2}$$

✍ في مجموعة من القيم:

$$\text{التباين} = \sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

$$\text{الانحراف المعياري} = \sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

ن: عدد القيم

س: المتوسط الحسابي

س: المتغير

ت_ر: عدد تكرار المتغير س

✍ في الفئات:

$$\text{التباين} = \sigma^2 = \frac{\sum_{j=1}^h (x_j - \bar{x})^2 \cdot t_j}{\sum_{j=1}^h t_j}$$

$$\text{الانحراف المعياري} = \sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

لنأخذ البيانات: ١٧، ١٦، ٨، ١٥، ٩، ١١، ١٢، ١٣، ٧

١

◀ أوجد المدى، الوسيط، الربيع الأدنى، الربيع الأعلى، نصف المدى الربيعي لهذه البيانات

ترتيب البيانات تصاعدياً: ٧، ٨، ٩، ١١، ١٢، ١٣، ١٥، ١٦، ١٧

المدى = القيمة العظمى - القيمة الصغرى = ١٧ - ٧ = ١٠

عدد القيم ن = ٩، ترتيب الوسيط = $\frac{1+9}{2} = \frac{10}{2} = ٥$

الوسيط = ١٢

الربيع الأدنى = $\frac{9+8}{2} = ٨,٥$

الربيع الأعلى = $\frac{16+15}{2} = ١٥,٥$

نصف المدى الربيعي = $\frac{\text{الربيع الأعلى} - \text{الربيع الأدنى}}{2} = \frac{١٥,٥ - ٨,٥}{2} = ٣,٥$

صفوة تعلمي الكويت

أوجد المتوسط الحسابي ، التباين ، الانحراف المعياري

$$\bar{x} = \frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عدد القيم}} = \frac{108}{9} = 12$$

$$\text{التباين } s^2 = \frac{102}{9} = 11,33$$

$$\text{الانحراف المعياري } s = \sqrt{11,33} = 3,36$$

س	س - س	(س - س)²
٧	٥-	٢٥
٨	٤-	١٦
٩	٣-	٩
١١	١-	١
١٢	٠	٠
١٣	١	١
١٥	٣	٩
١٦	٤	١٦
١٧	٥	٢٥

لاحظ صاحب صيدلية أن مبيع الأدوية بحسب أسعارها بالدينار الكويتي كما يلي:

الفئة(بالدينار)	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	المجموع
التكرار	١٩	٣٠	٤٧	٢٨	٢٠	١٦	١٦٠

أكمل الجدول بإيجاد مركز كل فئة، ثم أوجد المتوسط الحسابي.

الفئة	مركز الفئة	التكرار	س × س	س - س	(س - س)²	(س - س) × س
٠٠	٢,٥	١٩	٤٧,٥	١١,٥	١٣٢,٢٥	٢٥١٢,٧٥
٠٠	٧,٥	٣٠	٢٢٥	٦,٥	٤٢,٢٥	١٢٦٧,٥
٠٠	١٢,٥	٤٧	٥٨٧,٥	١,٥	٢,٢٥	١٠٥,٧٥
٠٠	١٧,٥	٢٨	٤٩٠	٣,٥	١٢,٢٥	٣٤٣
٠٠	٢٢,٥	٢٠	٤٥٠	٨,٥	٧٢,٢٥	١٤٤٥
٠٠	٢٧,٥	١٦	٤٤٠	١٣,٥	١٨٢,٢٥	٢٩١٦
المجموع		١٦٠	٢٢٤٠			٨٥٩٠

$$\frac{\sum x^2}{n} = \frac{53,687}{160} = 335.54375$$

$$\frac{(\sum x)^2}{n} = \frac{8090^2}{160} = 407,206.25$$

$$s^2 = 335.54375 - 407,206.25 = -406,870.70625$$

$$s = \sqrt{-406,870.70625} = 637.91$$


٣ في البيانات التالية : ١٠, ١٥, ٧, ٨, أوجد التباين والانحراف المعياري لهذه البيانات

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{10+15+7+8}{4} = 10$$

$$s^2 = \frac{\sum x^2}{n} - \bar{x}^2 = \frac{38}{4} - 10^2 = 9.5 - 100 = -90.5$$

$$s = \sqrt{-90.5} = 9.52$$

س	س - س	(س - س)²
٨	-٢	٤
٧	-٣	٩
١٠	٠	٠
١٥	٥	٢٥
المجموع = ٣٨		



التوزيع الطبيعي

تعريف


التوزيع الطبيعي: هو توزيع البيانات بشكل متماثل حول المتوسط الحسابي والمنحنى التكراري الذي

يمثل هذه البيانات بأخذ شكل الجرس كما في الشكل التالي

حوالي ٦٨ ٪ من الأرباح تقع على الفترة $[\bar{S} - \sigma, \bar{S} + \sigma]$

حوالي ٩٥ ٪ من قيم هذه البيانات تقع على الفترة $[\bar{S} - 2\sigma, \bar{S} + 2\sigma]$

حوالي ٩٩,٧ ٪ من الأرباح تقع على الفترة $[\bar{S} - 3\sigma, \bar{S} + 3\sigma]$



لاحظت شركة تجارية أن المتوسط الحسابي لأرباحها ٥٧ ديناراً بانحراف معياري ٥١ ديناراً (طبق القاعدة التجريبية) هل وصلت أرباح هذه الشركة إلى ٥٧ ديناراً ؟ فسر ذلك

حوالي ٦٨ ٪ من الأرباح تقع على الفترة $[\bar{S} - \sigma, \bar{S} + \sigma]$

$$[700 - 110, 700 + 110] = [590, 810]$$

حوالي ٩٥ ٪ من الأرباح تقع على الفترة $[\bar{S} - 2\sigma, \bar{S} + 2\sigma]$

$$[700 - 2 \times 110, 700 + 2 \times 110] = [480, 920]$$

حوالي ٩٩,٧ ٪ من الأرباح تقع على الفترة $[\bar{S} - 3\sigma, \bar{S} + 3\sigma]$

$$[700 - 3 \times 110, 700 + 3 \times 110] = [280, 1020]$$

اذن نعم من المتوقع ان تصل أرباح الشركة الى ٧٥٠ ديناراً لأن $750 \in [280, 1020]$

إذا كان المتوسط الحسابي لأرباح إحدى المشاريع الصغيرة ٧٥٠ ديناراً ، والانحراف المعياري ١١٥ ديناراً والمنحنى التكراري لأرباح هذا المشروع هو على شكل جرس (توزيع طبيعي)

طبق القاعدة التجريبية

حوالي ٦٨ ٪ من الأرباح تقع على الفترة $[\bar{S} - \sigma, \bar{S} + \sigma]$

$$[750 - 115, 750 + 115] = [635, 865]$$

حوالي ٩٥ ٪ من الأرباح تقع على الفترة $[\bar{S} - 2\sigma, \bar{S} + 2\sigma]$

$$[750 - 2 \times 115, 750 + 2 \times 115] = [520, 980]$$

حوالي ٩٩,٧ ٪ من الأرباح تقع على الفترة $[\bar{S} - 3\sigma, \bar{S} + 3\sigma]$

$$[750 - 3 \times 115, 750 + 3 \times 115] = [305, 1155]$$

◀ هل وصلت أرباح المشروع الى ١٠٠ دينار

اذن نعم من المتوقع ان تصل أرباح الشركة الى ١٠٠ ديناراً لأن $100 \in [40, 1090]$

٣ اذا كان المتوسط الحسابي لأرباح احدى المشاريع الصغيرة ١٢٥٠ ديناراً ، والانحراف المعياري ٥٢٢ ديناراً والمنحنى التكراري لأرباح هذا المشروع هو على شكل جرس (توزيع طبيعي)

◀ طبق القاعدة التجريبية

حوالي ٦٨ ٪ من الأرباح تقع على الفترة [س - σ , س + σ]

$$[1250 - 522, 1250 + 522] = [728, 1772]$$

حوالي ٩٥ ٪ من الأرباح تقع على الفترة [س - ٢σ , س + ٢σ]

$$[1250 - 2 \times 522, 1250 + 2 \times 522] = [206, 2294]$$

حوالي ٩٩,٧ ٪ من الأرباح تقع على الفترة [س - ٣σ , س + ٣σ]

$$[1250 - 3 \times 522, 1250 + 3 \times 522] = [-116, 2972]$$

◀ هل وصلت أرباح المشروع الى ٢٠٠ دينار

المبلغ ٢٠٠ دينار يقع خارج الفترة [١٩٢٥ , ٥٧٥] والتي تناظر ٩٩,٧ ٪ من الأرباح لذلك من غير المتوقع أن تكون أرباح

الشركة قد وصلت الى المبلغ ٢٠٠ دينار

٤ يعلن مصنع لإنتاج المصابيح الكهربائية أن متوسط عمر المصباح الكهربائي من النوع (h) هو ٧٠٠ ساعة بانحراف ١٠٠ ساعة على افتراض أن المنحنى الممثل لتوزيع عمر المصابيح الكهربائية يقترب كثيراً من التوزيع الطبيعي.

◀ أوجد النسبة المئوية للمصابيح الكهربائية من النوع (أ) التي يزيد عمرها عن ٥٠٠ ساعة.

طبق القاعدة التجريبية.

حوالي ٦٨ ٪ من القيم تقع على الفترة [س - σ , س + σ]

$$[700 - 100, 700 + 100] = [600, 800]$$

حوالي ٩٥ ٪ من القيم تقع على الفترة [س - ٢σ , س + ٢σ]



$$[700 - 2 \times 100, 700 + 2 \times 100] = [500, 900]$$

حوالي ٩٩,٧ ٪ من الأرباح تقع على الفترة [س - ٣σ , س + ٣σ]

$$[700 - 3 \times 100, 700 + 3 \times 100] = [400, 1000]$$

النسبة المئوية للمصابيح الكهربائية من النوع (أ) التي يزيد عمرها عن ٥٠٠ ساعة.

$$100 - 99,7 = 0,3 \%$$



◀ أوجد النسبة المئوية للمصابيح الكهربائية من النوع (أ) التي يقل عمرها عن ٤٠ ساعة
النسبة المئوية للمصابيح الكهربائية من النوع (أ) التي يقل عمرها عن ٤٠ ساعة ١٥٪

يعلن مصنع لإنتاج الأسلاك المعدنية أن متوسط تحمل السلك هو ١٣٠٠ كجم بانحراف معياري ٢٠٠ كجم، على افتراض أن المنحنى الممثل لتوزيع تحمل الاسلاك يقترب كثيراً من التوزيع الطبيعي. طبق القاعدة التجريبية

حوالي ٦٨٪ من الاسلاك تحملها يقع على الفترة:

$$[س - \sigma, س + \sigma] = [٢٠٠ - ١٣٠٠, ٢٠٠ + ١٣٠٠] = [١٠٠, ١٥٠٠]$$

حوالي ٩٥٪ من الاسلاك تحملها يقع على الفترة:

$$[س - ٢\sigma, س + ٢\sigma] = [٤٠٠ - ١٣٠٠, ٤٠٠ + ١٣٠٠] = [٩٠٠, ١٧٠٠]$$

حوالي ٩٩,٧٪ من الاسلاك تحملها يقع على الفترة:

$$[س - ٣\sigma, س + ٣\sigma] = [٦٠٠ - ١٣٠٠, ٦٠٠ + ١٣٠٠] = [٧٠٠, ١٩٠٠]$$

تبين لإحدى المؤسسات الاستثمارية أن المتوسط الحسابي لأرباحها الشهرية ٢٥٠٠ دينار بانحراف معياري ٢٥٠ دينار وأن المنحنى التكراري لهذه الأرباح على شكل جرس (توزيع طبيعي). طبق القاعدة التجريبية.

$$س = ٢٥٠٠, \sigma = ٢٥٠$$

باستخدام القاعدة التجريبية نحصل على مايلي :

١- حوالي ٦٨٪ من الأرباح تقع على الفترة :

$$[س - \sigma, س + \sigma]$$

$$= [٢٥٠ - ٢٥٠, ٢٥٠ + ٢٥٠] = [٠, ٥٠٠]$$

٢- حوالي ٩٥٪ من الأرباح تقع على الفترة :

$$[س - ٢\sigma, س + ٢\sigma]$$

$$= [٥٠٠ - ٥٠٠, ٥٠٠ + ٥٠٠] = [٠, ١٠٠٠]$$

٣- حوالي ٩٩,٧٪ من الأرباح تقع على الفترة :

$$[س - ٣\sigma, س + ٣\sigma]$$

$$= [٧٥٠ - ٧٥٠, ٧٥٠ + ٧٥٠] = [٠, ١٥٠٠]$$



اختر الإجابة الصحيحة:

٧


١ في التوزيع الطبيعي الفترة [س - ٣σ ، س + ٣σ] تحتوي على:

أ ٦٨٪ من قيم البيانات ب ٩٥٪ من قيم البيانات ج ٩٩,٧٪ من قيم البيانات د ٩٧٪ من قيم البيانات

ظلل أ إذا كانت العبارة صحيحة وظلل ب إذا كانت العبارة خاطئة:

٨

ب	أ	العبارة
		إذا كان المتوسط الحسابي لعينة ما يساوي ٢٠ والانحراف المعياري يساوي ٢ والمنحى على شكل جرس فإن ٩٥٪ من القيم تقع في [٢٤,١٦]



القيمة المعيارية

هو مؤشر يدل على انحراف قيمة مفردة من بيانات عن المتوسط الحسابي و ذلك باستخدام الانحراف المعياري لقيم هذه البيانات. إذا كان المطلوب مقارنة قيمتين لمفردتين مختلفتين تنتمي كل منهما إلى مجموعة محددة فإنه لا يكفي إحصائياً.

$$\text{القيمة المعيارية (ق)} = \frac{\text{قيمة المفردة} - \text{المتوسط الحسابي}}{\text{الانحراف المعياري}} = \frac{\bar{س} - س}{\sigma}$$

جاءت إحدى درجات طالب في مادة الفيزياء ٥١ حيث المتوسط الحسابي ١٤ والانحراف المعياري ٣,٨ و في مادة الكيمياء ١٥ حيث المتوسط الحسابي ١٣ والانحراف المعياري ٧,٨ ما القيمة المعيارية للدرجة ١٥ مقارنة مع درجات كل مادة ؟ أيهما أفضل ؟

الفيزياء	الكيمياء
س = ١٥	س = ١٥
س = ١٤	س = ١٣
$\sigma = ٣,٨$	$\sigma = ٧,٨$
$ق_١ = \frac{١٥ - ١٤}{٣,٨} = ٠,٢٦٣$	$ق_٢ = \frac{١٥ - ١٣}{٧,٨} = ٠,٢٥٣$
$ق_١ < ق_٢$	درجة الفيزياء هي الأفضل

إذا كانت درجة طالب في مادة الجغرافيا ١٩ درجة حيث المتوسط الحسابي ١٦ والانحراف المعياري ٤، وحصل على ١٩ درجة في مادة التاريخ حيث المتوسط الحسابي ١٧ والانحراف المعياري ٥، ما القيمة المعيارية للدرجة ١٩ مقارنة مع درجات كل مادة ؟ أيهما أفضل ؟

القيمة المعيارية للدرجة ١٩ في مادة الجغرافيا: $ق_١ = \frac{١٩ - ١٦}{٤} = ٠,٧٥$
القيمة المعيارية للدرجة ١٩ في مادة التاريخ: $ق_٢ = \frac{١٩ - ١٧}{٥} = ٠,٤$
$٠,٧٥ > ٠,٤$

درجة الطالب في مادة الجغرافيا أفضل من درجته في التاريخ

صفوة معلم الكويت

٣

يسكن خالد في المدينة (أ) حيث إن طول قامته ٨١ سم و المتوسط الحسابي لأطوال قامات الرجال في هذه المدينة ٤٧ سم مع انحراف معياري ٢١ سم. أما صالح فيسكن في المدينة ب حيث إن طول قامته ٢٧ سم و المتوسط الحسابي لأطوال قامات الرجال في هذه المدينة ٥٦ سم مع انحراف معياري ٥١. أي منهما طول قامته أفضل من الآخر مقارنة مع أطوال الرجال في كل مدينة؟

خالد	صالح
س = ١٨٠	س = ١٧٢
س = ١٧٤	س = ١٦٥
$\sigma = ١٢$	$\sigma = ١٥$
$ق_١ = \frac{\bar{س} - س}{\sigma} = \frac{١٧٤ - ١٨٠}{١٢} \approx -٠,٥$	$ق_٢ = \frac{\bar{س} - س}{\sigma} = \frac{١٦٥ - ١٧٢}{١٥} \approx -٠,٤٧$
$ق_١ < ق_٢$	طول خالد هو الأفضل

٤

إذا كانت درجة طالب في مادة الرياضيات ٢٤ درجة حيث المتوسط الحسابي ٢٩ والانحراف المعياري ٨، وحصل على ٤٥ درجة في مادة التاريخ حيث المتوسط الحسابي ٤٨ والانحراف المعياري ٣. في أي المادتين كان أداء الطالب أفضل؟

القيمة المعيارية $ق_١ = \frac{\bar{س} - س}{\sigma}$

القيمة المعيارية للدرجة ٢٤ في مادة الرياضيات: $ق_١ = \frac{٢٩ - ٢٤}{٨} = -٠,٦٢٥$

القيمة المعيارية للدرجة ٤٥ في مادة التاريخ: $ق_٢ = \frac{٤٨ - ٤٥}{٣} = ١$

$\therefore -٠,٦٢٥ < ١$

أداء الطالب في مادة الرياضيات أفضل من أدائه في مادة التاريخ

٥

إذا كانت درجة طالب في مادة الرياضيات ٢٤ درجة حيث المتوسط الحسابي ٢١ والانحراف المعياري ٦، وحصل على ٢٤ درجة في مادة التربية الإسلامية حيث المتوسط الحسابي ٢٠ والانحراف المعياري ٥. في أي المادتين كان أداء الطالب أفضل؟

القيمة المعيارية $ق_١ = \frac{\bar{س} - س}{\sigma}$

القيمة المعيارية للدرجة ٢٤ في مادة الرياضيات: $ق_١ = \frac{٢١ - ٢٤}{٦} = -٠,٥$

معلمة الكويت

$$\text{القيمة المعيارية للدرجة ٢٤ في مادة التاريخ: } q_1 = \frac{20-24}{0} = 0,8$$

$$\therefore 0,8 < 0,5$$

أداء الطالب في مادة التربية الاسلامية أفضل من أدائه في مادة الرياضيات

٦ إذا كانت درجة طالب في مادة اللغة العربية ٦٩ درجة حيث المتوسط الحسابي ٦٤ والانحراف المعياري ٨، وحصل على ٤٨ درجة في مادة الجغرافيا حيث المتوسط الحسابي ٥٦ والانحراف المعياري ١٠ في أي المادتين كان أداء الطالب أفضل؟

$$\text{القيمة المعيارية } q_1 = \frac{\bar{S}-S}{\sigma}$$

$$\text{القيمة المعيارية للدرجة ٦٩ في مادة اللغة العربية: } q_1 = \frac{64-69}{8} = 0,625$$

$$\text{القيمة المعيارية للدرجة ٤٨ في مادة الجغرافيا: } q_1 = \frac{56-48}{10} = 0,8$$

$$\therefore 0,8 < 0,625$$

أداء الطالب في مادة التربية الاسلامية أفضل من أدائه في مادة الرياضيات

٧ في نتيجة نهاية العام الدراسي حصل طالب على ٨٢ درجة في مادة اللغة العربية حيث المتوسط الحسابي ١٢ والانحراف المعياري ٨ وحصل على ٨٢ درجة في مادة الجغرافيا حيث المتوسط الحسابي ٤٢ والانحراف المعياري ١٠. في أي المادتين كان الطالب أفضل؟

$$q = \frac{\bar{S}-S}{\sigma}$$

$$\text{القيمة المعيارية لدرجة الطالب في مادة اللغة العربية: } q_1 = \frac{42-82}{8} = 0,875$$

$$\text{القيمة المعيارية لدرجة الطالب في مادة الجغرافيا: } q_1 = \frac{24-82}{10} = 0,4$$

القيمة المعيارية لدرجة الطالب في مادة اللغة العربية أكبر من القيمة المعيارية لدرجة الطالب في مادة الجغرافيا وبالتالي درجة الطالب في مادة اللغة العربية أفضل من درجته في مادة الجغرافيا.

صفوة معلم الكويت

اختر الإجابة الصحيحة:

٨

١ في مجموعة البيانات إذا كان المتوسط الحسابي س = ١٤ والانحراف المعياري = ٤ فان القيمة المعيارية ل س = ١٦ هي ق = :

- أ $\frac{1}{4}$ ب $\frac{1}{2}$ ج $\frac{1}{2}$ د $\frac{1}{2}$


٢ في مجموعة بيانات إذا كان المتوسط الحسابي = ٤٣ والانحراف المعياري = ٢,٥ فان القيمة المعيارية ل س = ٤٥ هي ق = :

- أ -٠,٩ ب ٠,٩ ج ٠,٨ د -٠,٨

ظلل أ إذا كانت العبارة صحيحة وظلل ب إذا كانت العبارة خاطئة:

٩

ب	أ	العبارة
		يعتبر المتوسط الحسابي هو أحد مقاييس التزعة المركزية .
		في مجموعة بيانات إذا كان المتوسط الحسابي س = ١٣ والانحراف المعياري = ٤ فإن القيمة المعيارية ل س = ١٥ هي ق = $\frac{1}{2}$





اختبار
الكروني
تدرب
و تعلم

المبدأ الأساسي للعد

✍ لإجراء عملية على م مرحلة متتابعة وقد أجريت المرحلة الأولى ب ن طريقة مختلفة والمرحلة الثانية ب ن طريقة مختلفة ، وهكذا حتى المرحلة الأخيرة م ب ن طريقة مختلفة ، فإن عدد طرائق إجراء هذه العملية هو:
 $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_m$

١ لوحات السيارات في إحدى القرى السياحية تبدأ من اليمين بحرف من حروف الأبجدية يتبعه رقمان يتم اختيارهما من المجموعة { ١ , ٢ , ٣ , ٤ , ٥ , ٦ } كم عدد لوحات السيارات إذا كانت اللوحات تبدأ من اليمين بحرف من حروف الأبجدية يتبعه ثلاثة أرقام يتم اختيارها من المجموعة { ١ , ٢ , ٣ , ٤ , ٥ , ٦ }

حرف رقم رقم رقم
 $28 \times 6 \times 5 \times 4 = 3360$ طريقة

٢ كم عدد الأعداد المكون رمز كل منها من ثلاثة أرقام مأخوذة من عناصر المجموعة { ١ , ٣ , ٦ , ٩ } في كل مما يلي:

◀ إذا لم يسمح بالتكرار.

◀ إذا سمح بالتكرار

إذا لم يسمح التكرار

أحاد عشرات مئات

أحاد عشرات مئات

$64 = 4 \times 4 \times 4$

$24 = 2 \times 3 \times 4$

◀ إذا كان العدد فردي ويسمح بالتكرار

إذا كان العدد فردي ويسمح بالتكرار

أحاد عشرات مئات

$48 = 4 \times 4 \times 3$

٣ كم عدد الأعداد المكون رمز كل منها من أربعة أرقام مأخوذة من عناصر { ٢ , ٥ , ٦ , ٨ , ٩ } في كل مما يلي:

◀ إذا كان العدد فردي ويسمح بالتكرار

◀ إذا كان رقم الأحاد ٦ ولا يسمح بالتكرار

عدد الأعداد = $2 \times 5 \times 5 \times 5 = 250$

عدد الأعداد = $24 = 2 \times 3 \times 4 \times 1$

مضروب العدد

$$1 \times 2 \times 3 \times \dots \times (n-3) \times (n-2) \times (n-1) \times n = n!$$

$$n! = n \times (n-1) \times \dots \times 1$$

$$1! = 1$$

١ احسب (موضحاً خطوات الحل):

$$0.6 = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 = 7! \quad \leftarrow$$

$$90 = \frac{1! \times 9 \times 10}{1!} = \frac{1!}{1!} \quad \leftarrow$$

$$429 = \frac{1! \times 9 \times 10 \times 11 \times 12 \times 13 \times 14}{1! \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{1!}{1! \times 7!} \quad \leftarrow$$

٢ اختر الإجابة الصحيحة:

١ قيمة المقدار $\frac{1!}{1! \times 3!}$ هي:

د ١

ج ١٢٠

ب $\frac{1}{120}$

أ $\frac{1}{12}$

٣ ظلل أ إذا كانت العبارة صحيحة وظلل ب إذا كانت العبارة خاطئة:

ب	أ	العبارة
		$n! = n \times (n-1)$
		قيمة المقدار $5! \times 4!$ هي ٣٦٠
		$12! = 12 \times 11!$

صفوة معلم الكويت

٢ عدد الطرق الممكنة لاختيار ٣ كتب من مجموعة من ٧ كتب مختلفة هو:

د ٣٥

ج ٢١٠

ب ٢١

أ ٣

$${}^3P_3 = {}^3P_1 \times {}^2P_1 \times {}^1P_1 = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

د ٢١٦٠

ج ١٨٠

ب ٩٠

أ ٢٤

٤ عدد الطرق الممكنة لاختيار ٣ كتب من مجموعة من ٧ كتب مختلفة هو:

د 7P_3

ج ${}^7P_3 - {}^3P_3$

ب 7P_3

أ ${}^7P_3 - 1$


$$\frac{{}^7P_3}{{}^3P_3 \times {}^4P_4} = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{35}{24}$$

د ٧٢٠

ج ١٢٠

ب ١٥

أ ٤٨



التوافيق

قانون التوافيق $ق_n ق_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ أو $ق_n ق_r = \frac{n!}{r!}$
ق الترتيب غير مهم

ملاحظة: $ق_n ق_0 = 1$ ، $ق_n ق_n = 1$ ، $ق_n ق_r = ق_n ق_{n-r}$ ملاحظة

١ في محافظة ٢١ صيدلية والمطلوب اختيار ٤ صيدليات منها لتأمين دوام ليلي. بكم طريقة ممكنة يمكن اختيار الصيدليات الأربع؟

$$ق_{٢١} ق_٤ = \frac{٢١!}{٤!(٢١-٤)!} = \frac{٢١!}{٤!١٧!} = ٤٩٥$$

٢ في الصف الحادي عشر ٢٠ طالباً، وفي الصف العاشر ٢٤ طالباً. أراد معلم الرياضة اختيار ٦ طلاب من الصف الحادي عشر و٥ طلاب من الصف العاشر لتشكيل فريق كرة القدم. كم عدد الفرق التي بإمكانه تشكيلها؟

الترتيب غير مهم

$$\text{عدد الطرق الممكنة لتشكيل الفرق} = ق_{٢٠} ق_٦ \times ق_{٢٤} ق_٥ = \frac{٢٠!}{٦!١٤!} \times \frac{٢٤!}{٥!١٩!} = \frac{٢٠ \times ٢١ \times ٢٢ \times ٢٣ \times ٢٤}{١ \times ٢ \times ٣ \times ٤ \times ٥} \times \frac{١٥ \times ١٦ \times ١٧ \times ١٨ \times ١٩ \times ٢٠}{١ \times ٢ \times ٣ \times ٤ \times ٥ \times ٦} = ٣٨٧٦٠ \times ٤٢٥٠٤ = ١٦٤٧٤٥٥٠٤ \text{ طريقة}$$

٣ حل كل معادلة مما يلي حيث ن عدد صحيح موجب أكبر من ٢.

$$\begin{aligned} & ق_n ق_٢ = ق_n ق_١ = \frac{n!}{٢!(n-٢)!} = \frac{n!}{١!} = n! \quad \leftarrow ق_n ق_٢ = ق_n ق_١ \\ & ق_n ق_٢ = ق_n ق_١ = \frac{n!}{٢!(n-٢)!} = \frac{n!}{١!} = n! \quad \leftarrow ق_n ق_٢ = ق_n ق_١ \\ & ق_n ق_٢ = ق_n ق_١ = \frac{n!}{٢!(n-٢)!} = \frac{n!}{١!} = n! \quad \leftarrow ق_n ق_٢ = ق_n ق_١ \\ & ق_n ق_٢ = ق_n ق_١ = \frac{n!}{٢!(n-٢)!} = \frac{n!}{١!} = n! \quad \leftarrow ق_n ق_٢ = ق_n ق_١ \\ & ق_n ق_٢ = ق_n ق_١ = \frac{n!}{٢!(n-٢)!} = \frac{n!}{١!} = n! \quad \leftarrow ق_n ق_٢ = ق_n ق_١ \\ & ق_n ق_٢ = ق_n ق_١ = \frac{n!}{٢!(n-٢)!} = \frac{n!}{١!} = n! \quad \leftarrow ق_n ق_٢ = ق_n ق_١ \\ & ق_n ق_٢ = ق_n ق_١ = \frac{n!}{٢!(n-٢)!} = \frac{n!}{١!} = n! \quad \leftarrow ق_n ق_٢ = ق_n ق_١ \\ & ق_n ق_٢ = ق_n ق_١ = \frac{n!}{٢!(n-٢)!} = \frac{n!}{١!} = n! \quad \leftarrow ق_n ق_٢ = ق_n ق_١ \\ & ق_n ق_٢ = ق_n ق_١ = \frac{n!}{٢!(n-٢)!} = \frac{n!}{١!} = n! \quad \leftarrow ق_n ق_٢ = ق_n ق_١ \\ & ق_n ق_٢ = ق_n ق_١ = \frac{n!}{٢!(n-٢)!} = \frac{n!}{١!} = n! \quad \leftarrow ق_n ق_٢ = ق_n ق_١ \end{aligned}$$

$$\varepsilon_r = \frac{!(n+r)}{!n} \quad \leftarrow$$

$$\varepsilon_r = \frac{(n+r)(n+1)!n}{n!} =$$

$$\epsilon r = (1+n)(r+n)$$

$$E_r = r + n^3 + n^r$$

ن^۱ + ن^۳ - ۴۰ = صفر

$(n+1)(n-0) = \text{صفر}$

إيمان = $\neg$ مرفوضة , $n=0$

$$0 = \dot{u} \therefore$$

$$I_o = \frac{(1-n)n}{1 \times r} \quad I_o = r^u \text{ ق } \blacktriangleleft$$

$$w_n = (1 - \alpha) \alpha^n$$

$$0x7 = (1-n)n$$

$$n=7$$

$$n = \frac{(1-n)n}{1 \times 2} \leftarrow n = \frac{J^n}{r!} \quad n = r^n \quad \leftarrow$$

$$n^r = n - n \quad n = (n-1)$$

ن=٠ مرفوضة أو ن=٣

٣ أوجد قيمة كل مما يلي:

$$q_0 = q \times 1 = \frac{1 \times f \times \mu \times \varepsilon \times \omega \times \gamma \times V \times \Lambda \times q \times 1}{1 \times f \times \mu \times \varepsilon \times \omega \times \gamma \times V \times \Lambda} = \frac{!1 \cdot}{! \Lambda} \leftarrow$$

$$\frac{!V}{!r} + \frac{!V}{!e} = \frac{!V}{(o-v)} + \frac{!V}{!(r-v)} = {}_oJ^v + {}_rJ^v \quad \blacktriangleleft$$

$$\frac{!r \times \text{w} \times \text{e} \times \text{o} \times \text{t} \times \text{v}}{!r} + \frac{!e \times \text{o} \times \text{t} \times \text{v}}{!e} =$$

$$r_{V^3} = r_{02} + r_1 =$$

ظل أ إذا كانت العبارة صحيحة وظل ب إذا كانت العبارة خاطئة:

ب	أ	العبارة
		إذا كان n ، ر عددين صحيحين موجبين حيث $n \geq r$ فإن ${}^n C_r = {}^n C_{n-r}$
		${}^9 C_9 = 1$
		عدد طرق اختيار ٣ صيدليات لتأمين دوام ليلي من بين ٨ صيدليات مختلفة
		${}^v C_r = ٤٢$
		${}^o C_r = ٢ \times {}^r C_r$

اختر الإجابة الصحيحة:

١ قيمة ن التي تحقق المعادلة : $١٠ = ٣^n$ هي:

د ٣

ج ٤

ب ٥

أ ٩

٢ إذا كان $١٥ = ٢^n$ فإن ن =

د ٧

ج ٣

ب ٦

أ ٥



صفوة معلمى الكويت



اختبار
الالكتروني
تدرب
و تعلم

نظرية ذات الحدين

لأي عدد صحيح موجب n ,

$$(a+b)^n = {}^nC_0 a^n b^0 + {}^nC_1 a^{n-1} b^1 + {}^nC_2 a^{n-2} b^2 + \dots + {}^nC_{n-1} a^1 b^{n-1} + {}^nC_n a^0 b^n$$

استخدم نظرية ذات الحدين لإيجاد مفكوك $(s+3)^0$

١

0C_0	0C_1	0C_2	0C_3	0C_4	0C_5	0C_6
١	٥	١٠	١٠	٥	١	
s^0	s^1	s^2	s^3	s^4	s^5	s^6
١	٣	٣	٣	٣	٣	٣

$$(s+3)^0 = s^0 + {}^0C_1 s^1 + {}^0C_2 s^2 + {}^0C_3 s^3 + {}^0C_4 s^4 + {}^0C_5 s^5 + {}^0C_6 s^6 = 1 + 3s + 3s^2 + 3s^3 + 3s^4 + 3s^5 + 3s^6$$

ملاحظة: الحد الذي ترتيبه $r+1$ يرمز له بالرمز: ${}^nC_{r+1} = {}^nC_r$

أوجد الحد السادس في مفكوك $(s+2)^v$

٢

$$\begin{aligned} \text{ح} &= {}^nC_{r+1} = {}^nC_r \\ {}^nC_r &= \frac{n!}{r!(n-r)!} \\ {}^nC_5 &= \frac{v!}{5!(v-5)!} \\ {}^nC_5 &= 252 \\ {}^nC_5 &= 252 \end{aligned}$$

أوجد الحد الثالث في مفكوك $(s+2)^v$

٣

$$\begin{aligned} \text{ح} &= {}^nC_{r+1} = {}^nC_r \\ {}^nC_r &= \frac{n!}{r!(n-r)!} \\ {}^nC_2 &= \frac{v!}{2!(v-2)!} \\ {}^nC_2 &= 10 \\ {}^nC_2 &= 10 \end{aligned}$$



ع أوجد الحد الخامس في مفكوك $(٢س + ص)^١$

ع

$$\begin{aligned} \text{ح} + \text{ر} &= ١ \Rightarrow \text{ق} \text{ ر} \text{ ب} \text{ ر} \\ \text{ن} &= ٠, \text{أ} = ٢س, \text{ب} = ص, \text{ر} + ١ = ٠ \Rightarrow \text{ر} = -١ \\ \text{ح} &= ٢ = \text{ق} \times \text{ر} \times (٢س) \times (ص) \\ ١٠ &= ٤ \times \text{س} \times \text{ر} \times \text{ص} \\ ٦٠ &= \text{س} \times \text{ص} \times \text{ر} \times \text{ق} \end{aligned}$$

و في مفكوك $(٢س - ص)^٨$ أوجد معامل س^٦

و

$$\begin{aligned} \text{ن} &= ٨٧, \text{أ} = ٣س, \text{ب} = -٢, \text{ر} = ? \\ \text{ح} &= ٣ = \text{ق} \times \text{ر} \times (٣س) \times (-٢) \\ ٢٨ &= ٣ \times \text{س} \times (-٢) \times \text{ق} \\ ٨١٦٤٨ &= \text{س} \times \text{ق} \times (-٢) \times ٣ \\ \text{معامل س} &= ٨١٦٤٨ \times (-٢) \times ٣ \end{aligned}$$

٦ أوجد معامل س^٤ في مفكوك $(٢س + ص)^٦$

٦

$$\begin{aligned} \text{ح} + \text{ر} &= ١ \Rightarrow \text{ق} \text{ ر} \text{ ب} \text{ ر} \\ \text{ح} + \text{ر} &= ١ \Rightarrow \text{ق} \text{ ر} \text{ ب} \text{ ر} \\ \text{س} &= -١ \\ \text{ر} - ١ &= -٤ \Rightarrow \text{ر} = -٣ \\ \text{ح} &= ٣ = \text{ق} \times \text{ر} \times (٢س) \times (-١) \\ \text{معامل س} &= ٦٠ = \text{ق} \times \text{ر} \times (-١) \times ٢ \end{aligned}$$

٧ أوجد مفكوك $(٢س - ص)^٣$ باستخدام نظرية ذات الحدين

٧

$$\begin{aligned} (٢س - ص)^٣ &= (٢س)^٣ - ٣(٢س)^٢(ص) + ٣(٢س)(ص)^٢ - (ص)^٣ \\ &= ٨س^٣ - ١٢س^٢ص + ٦سص^٢ - ص^٣ \\ &= ٨س^٣ - ١٢س^٢ص + ٦سص^٢ - ص^٣ \end{aligned}$$

صفوة لمى الكلويت

٨ أوجد مفكوك (س - ص) باستخدام نظرية ذات الحدين

$$(س - ص)^3 = 3^3 ق^3 (س)^3 (ص)^0 + 3^2 ق^2 (س)^1 (ص)^2 + 3^1 ق^1 (س)^2 (ص)^1 + 3^0 ق^0 (س)^3 (ص)^3$$

$$= 3^3 ق^3 س^3 - 3^2 ق^2 س^2 ص + 3^1 ق^1 س^2 ص^2 - 3^0 ق^0 س^3 ص^3$$

٩ أوجد الحد الثالث في مفكوك (س + ٢)

$$ح_٣ = 3^2 ق^2 (س)^2 (٢)^1$$

$$= 3^2 ق^2 س^2 ٢ = ١٢ ق^٢ س^٢$$

١٠ استخدم نظرية ذات الحدين لإيجاد مفكوك (س+٢)٤

$$(س+٢)^٤ = ٤ ق^٤ س^٤ + ٤ ق^٣ س^٣ (٢) + ٦ ق^٢ س^٢ (٢)² + ٤ ق س (٢)³ + (٢)⁴$$

$$= ١٦ ق س³ + ٢٤ ق س² + ٢٤ ق س + ٨ ق + ١٦$$

اختر الإجابة الصحيحة:

١ عدد حدود مفكوك (س+٢)⁴ هو:

- أ ١٠ ب ٨ ج ٩ د ٧

٢ إذا كان الحد ٢٨ س¹ ص¹ هو أحد حدود مفكوك (س-ص)ⁿ فإن قيمة ن هي:

- أ ١٢ ب ٨ ج ٤ د ٣

٣ إذا كان الحد ٥ س⁵ ص⁵ أحد حدود مفكوك (س+ص)ⁿ فإن قيمة ن هي:

- أ ٨ ب ٧ ج ٦ د ٢

٤ إذا كان ٨٠ س³ ص³ هو أحد حدود المفكوك (س+ص)ⁿ فإن قيمة ن تساوي :

- أ ٧ ب ٦ ج ٤ د ٥

٥ معامل س⁵ في مفكوك (٢س-٤ص)⁵

- أ ١٢٨٠ ب -٢٥٦٠ ج -٣٢٠ د ٥١٢٠

التجربة العشوائية وفضاء العينة

فضاء العينة لتجربة عشوائية هو المجموعة المكونة من جميع النواتج الممكنة للتجربة. نرسم لفضاء العينة بالرمز (ف) ونرمز لعدد عناصر فضاء العينة بالرمز ن(ف)

الناتج هو أي نتيجة من نتائج التجربة العشوائية أي أنه عنصر واحد من عناصر فضاء العينة

في الكيس الأول ٥ كرات متماثلة مرقمة من ١ إلى ٥ و في الكيس الثاني ٥ كرات متماثلة مرقمة من ٦ إلى ١٠. سحب عشوائياً كرة من الكيس الأول ثم سحب كرة من الكيس الثاني.

اكتب كل عناصر فضاء العينة

ف	٦	٧	٨	٩	١٠
١	(٦, ١)	(٧, ١)	(٨, ١)	(٩, ١)	(١٠, ١)
٢	(٦, ٢)	(٧, ٢)	(٨, ٢)	(٩, ٢)	(١٠, ٢)
٣	(٦, ٣)	(٧, ٣)	(٨, ٣)	(٩, ٣)	(١٠, ٣)
٤	(٦, ٤)	(٧, ٤)	(٨, ٤)	(٩, ٤)	(١٠, ٤)
٥	(٦, ٥)	(٧, ٥)	(٨, ٥)	(٩, ٥)	(١٠, ٥)

كم عدد النواتج الممكنة ؟

عدد النواتج الممكنة ن(ف) = ٢٥

تعريف

الحدث: هو مجموعة جزئية من فضاء العينة و قد يساويه.

أنواع الحدث :

الحدث البسيط: يحتوي على عنصر واحد

الحدث المركب : يحتوي على أكثر من عنصر.

الحدث المستحيل: هو مجموعة جزئية خالية من فضاء العينة ف ويرمز له بالرمز {} أو

الحدث المؤكد: هو مجموعة جزئية من فضاء العينة ف ويساويه

صفوة في الكوليت

في تجربة إلقاء قطعة نقود معدنية منتظمة ثلاث مَرَّات متتالية، أوجد:

٢

◀ اكتب حدث أ ظهور كتابتين وصورة

فضاء العينة (ف) = {(ص,ص,ص), (ص,ص,ك), (ص,ك,ص), (ك,ص,ص), (ك,ك,ص), (ص,ك,ك), (ك,ص,ك), (ك,ك,ك)}

ن(ف) = ٨

الحدث أ ظهور كتابتين وصورة = {(ك,ك,ص), (ك,ص,ك), (ص,ك,ك)}

◀ اكتب حدث ظهور كتابة واحدة على الأقل

ظهور كتابة واحدة على الأقل

ب = {(ص,ص,ك), (ص,ك,ص), (ك,ص,ص), (ك,ك,ص), (ص,ك,ك), (ك,ص,ك), (ك,ك,ك)}



صفوة معلمي الكويت



اختبار
الكروني
تدرب
و تعلم

تعيين احتمالات الحدث

احتمال وقوع الحدث

$$P(A) = \frac{\text{عدد النواتج للحدث}}{\text{عدد نواتج فضاء العينة}} = \frac{n(A)}{n(F)}$$

ن (أ) : عدد عناصر الحدث أ، ن (ف) : عدد عناصر الحدث ف.

خواص الاحتمال لحدث ما

$$(1) \quad 0 \leq P(A) \leq 1$$

(2) إذا كان $A = \{\}$ فإن $P(A) = 0$ ويسمى بالحدث المستحيل

(3) إذا كان $A = F$ فإن $P(A) = 1$ ويسمى بالحدث المؤكد

ما احتمال اختيار رقم هاتف عشوائياً مكون من ٧ أرقام مختلفة من عناصر المجموعة $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(F)} = \frac{3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7}{7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7} = \frac{360}{2401}$$



الاحداث المتنافية

تعريف

الحداث المتنافيان: $A \cap B = \emptyset$

قاعدة إضافية للأحداث المتنافية

إذا كان A, B حدثين في فضاء العينة فإن: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ إذا كان A, B حدثين متنافيين فإن: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ حيث $P(A \cap B) = 0$ والعكس صحيح

١ في تجربة إلقاء حجر نرد ما احتمال الحدث الحصول على عدد أصغر من ٢ أو من مضاعفات العدد ٣؟

ف = {١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦}

أ = {٢} ب = {٣, ٦} $\phi = (A \cap B)$ حدثان متنافيان

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

٢ إذا كان A, B حدثين متنافيين في فضاء العينة ف حيث: $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.35$ أوجد كلاً مما يلي :

 $P(A \cap B)$ أ , ب حدثان متنافيان إذن $P(A \cap B) = 0$ $P(A \cup B)$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0.4 + 0.35 = 0.75$$

 $P(\overline{A \cup B})$

$$P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0.75 = 0.25$$

اختر الإجابة الصحيحة:

١ م , ن حدثين متنافيين في فضاء العينة ف حيث: $P(M) = 0.6$, $P(N) = 0.2$ فإن $P(M \cup N)$

أ ٠,٨

ب ٠,٣٢

ج ٠,١٢

د ٠,٢

٢ إذا كان الحداث ع, ط متنافيين حيث $P(E) = \frac{3}{5}$ $P(T) = \frac{1}{3}$ فإن $P(E \cap T)$ تساوي:أ $\frac{1}{5}$ ب $\frac{14}{15}$ ج $\frac{4}{15}$

د صفر

متمم الحدث

✍️ متمم الحدث أ: ويرمز له بالرمز $\bar{A}$ احتمال عدم حدوث أ هو: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

١ في تجربة القاء حجر نرد منتظم مرتين متتاليتين أوجد احتمال الحصول على عددين مختلفين

نفرض الحدث أ الحصول على عددين مختلفين

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{30}{36} = \frac{5}{6}$$

٢ إذا كان م ، ن حدثين متنافيين في فضاء العينة ف حيث: $P(\bar{M}) = 0.55$ ، $P(N) = 0.2$ فأوجد:

◀ $P(M)$

$P(\bar{M}) = 1 - P(M)$

$$0.45 = 1 - 0.55$$

◀ $P(M \cap N)$

م ، ن حدثين متنافيين $P(M \cap N) = 0$

◀ $P(M \cup N)$

$$P(M \cup N) = P(M) + P(N) = 0.45 + 0.2 = 0.65$$

٣ إذا كان م ، ن حدثين في فضاء العينة ف حيث: $P(\bar{M}) = 0.45$ ، $P(N) = 0.32$ ، $P(M \cap N) = 0.18$ أوجد :

◀ $P(M)$

$P(\bar{M}) = 1 - P(M)$

$$0.55 = 1 - 0.45$$

◀ $P(M \cap N)$

$$P(M \cap N) = P(M) + P(N) - P(M \cup N)$$

$$0.18 = 0.55 + 0.32 - P(M \cup N)$$



اختر الإجابة الصحيحة: ع

١ في تجربة إلقاء حجر نرد منتظم مرة واحدة، فإن احتمال الحصول على عدد أكبر من أو يساوي ٣ هو:

أ $\frac{5}{6}$

ب $\frac{1}{6}$

ج $\frac{1}{2}$

د $\frac{2}{3}$

٢ في تجربة إلقاء حجر نرد منتظم مرة واحدة فإن احتمال الحصول على العدد ٤ أو عدد زوجي يساوي:

أ $\frac{1}{6}$


ب $\frac{1}{2}$

ج $\frac{1}{4}$

د $\frac{1}{12}$

ظل أ إذا كانت العبارة صحيحة وظل ب إذا كانت العبارة خاطئة: ٥

ب	أ	العبارة
		إذا كان الحدثان ع ، ط مستقلين ، ل (ع) = $\frac{1}{3}$ ، ل (ط) = $\frac{9}{10}$ فإن ل (ع ∩ ط) = ٠,١٥



الحداث المستقلان

يكون الحداث مستقلان إذا كان وقوع أحدهما ليس له أي تأثير على وقوع الآخر. $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

يلعب إبراهيم ويوسف لعبة رمي السهم. احتمال أن يصيب إبراهيم الهدف يساوي $\frac{2}{5}$ واحتمال أن يصيب يوسف الهدف يساوي $\frac{1}{3}$ رمى كل منهما سهمًا على الهدف، ما احتمال عدم إصابة الهدف؟

$$\begin{aligned} \text{احتمال أن يصيب إبراهيم ويوسف الهدف} &= P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) \\ \frac{2}{5} &= \frac{2}{5} - \frac{1}{3} + \frac{2}{5} = \\ P(A \cap B) &= \frac{2}{5} - \frac{1}{3} = \frac{1}{15} \end{aligned}$$

إذا كان م ، ن حدثين مستقلين في فضاء العينة ف حيث: $P(M) = 0.4$ ، $P(N) = 0.8$ فأوجد:

$$\begin{aligned} &P(N) < \\ &P(M) = 1 - P(\bar{N}) \\ &0.4 = 1 - 0.8 = \\ &P(M \cap N) < \\ &\text{الحداث مستقلان } P(M \cap N) = P(M) \times P(N) = 0.4 \times 0.8 = 0.32 \\ &P(M \cup N) < \\ &P(M \cup N) = P(M) + P(N) - P(M \cap N) = 0.4 + 0.8 - 0.32 = 0.88 \end{aligned}$$

إذا كان م ، ن حدثين مستقلين في فضاء العينة ف حيث: $P(M) = 0.4$ ، $P(N) = 0.32$ ، $P(M \cap N) = 0.128$ فأوجد:

$$\begin{aligned} &P(M) < \\ &P(M) = 1 - P(\bar{N}) \\ &0.4 = 1 - 0.6 = \\ &P(M \cup N) < \\ &P(M \cup N) = P(M) + P(N) - P(M \cap N) = 0.4 + 0.32 - 0.128 = 0.592 \end{aligned}$$

صفوة معلم الكويت

ع إذا كان م ، ن حدثين في فضاء العينة ف حيث: $\frac{1}{2} = P(M) , \frac{1}{3} = P(N) , \frac{0}{12} = P(\bar{M} \cap \bar{N}) = \frac{3}{4}$ فأوجد

ل $P(M \cap N)$

$$P(M \cap N) = 1 - P(\bar{M} \cap \bar{N}) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

ل $P(M \cup N)$

$$P(M \cup N) = P(M) + P(N) - P(M \cap N) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{5}{6}$$

و إذا كان م ، ن حدثين مستقلين في فضاء العينة ف حيث: $\frac{2}{5} = P(M) , \frac{1}{3} = P(N)$ فأوجد:

ل $P(M \cap N)$

$$P(M \cap N) = P(M) \times P(N) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{15}$$

ل $P(M \cup N)$

$$P(M \cup N) = P(M) + P(N) - P(M \cap N) = \frac{2}{5} + \frac{1}{3} - \frac{2}{15} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

٧ إذا كان م ، ن حدثين مستقلين في فضاء العينة ف حيث: $\frac{1}{2} = P(M) , \frac{3}{5} = P(N)$ فأوجد: ل $P(M \cap N)$

$$P(M \cap N) = P(M) \times P(N) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$$

∴ م، ن حدثين مستقلين

$$\therefore P(M \cap N) = P(M) \times P(N) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$$

٨ اختر الإجابة الصحيحة:

١ إذا كان م ، ن حدثان مستقلين في فضاء العينة ف حيث: $\frac{1}{4} = P(M) , \frac{3}{5} = P(N)$ فإن ل $P(M \cup N)$ =

د ١٢،

ج ٧،

ب ٥٨،

أ ٨٢،

٢ إذا كان الحدثان م ، ن مستقلين في فضاء العينة ف ، حيث $\frac{2}{5} = P(M) , \frac{1}{3} = P(N)$ فإن ل $P(M \cap N)$ يساوي:

د $\frac{11}{10}$

ج صفر

ب $\frac{2}{10}$

أ $\frac{3}{8}$

صفوة معلم الكلويت

٣ إذا كان م ، ن حدثان مستقلين في فضاء العينة ف حيث : ل (م) = ٠,٥ ، ل (م ∩ ن) = ٠,٢ فان ل (ن) :

- أ ٠,٧ ب ٠,٦ ج ٠,٤ د ٠,٣

٤ إذا كان الحدثان أ ، ب مستقلين ، حيث ل (أ) = $\frac{1}{3}$ ، ل (ب) = $\frac{3}{4}$ فإن ل (أ ∩ ب) يساوي :

- أ $\frac{1}{2}$ ب $\frac{5}{8}$ ج $\frac{1}{4}$ د $\frac{3}{4}$



صفوة معلمى الكويت

