

تجميع قوانين ونظريات الرياضيات

فصل أول صف 12 علمي

أولا (النهايات)

تعريف النهاية:

• ليكن c, L عددين حقيقيين، f دالة حقيقية معرفة في جوار أو جوار ناقص للعدد c نكتب: $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ وتعني أنه عندما تقترب x من c باطراد، فإن قيم $f(x)$ تقترب باطراد من L .

شرط وجود النهاية لاي داله:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$$

قواعد النهايات:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} k = k \text{ ثابت فإن:}$$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} x = c \text{ حيث } f(x) = x \text{ إذا كانت } c \text{ عدداً حقيقياً، فإن:}$$

إذا كانت k, c, M, L أعداداً حقيقية، $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$ و $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M \quad \text{قاعدة الجمع:}$$

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = L - M \quad \text{قاعدة الطرح:}$$

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = L \cdot M \quad \text{قاعدة الضرب:}$$

$$\lim_{x \rightarrow c} (k \cdot f(x)) = k \cdot L \quad \text{قاعدة الضرب في ثابت:}$$

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}, \quad M \neq 0 \quad \text{قاعدة القسمة:}$$

إذا كانت $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ دالة كثيرة الحدود، c عدد حقيقي، فإن:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c) = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_0$$

شرط نهاية المقام:

إذا كانت $f(x)$ ، $g(x)$ كثيرتي حدود، c عدد حقيقي، فإن: $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(c)}{g(c)}$ ، $g(c) \neq 0$

شرط نهائية ماتحت الجذر:

إذا كانت n عددًا صحيحًا موجبًا وكانت $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ موجودة فإن:

- a $\lim_{x \rightarrow c} (f(x))^n = \left(\lim_{x \rightarrow c} f(x) \right)^n$ b $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{c}$ (في حالة n عددًا زوجيًا يشترط أن يكون $c > 0$)
 c $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}$ (في حالة n عددًا زوجيًا يشترط أن تكون $\lim_{x \rightarrow c} f(x) > 0$)

نهايات الحالات الخاصة:

- لتكن: $f(x) = \frac{1}{x}$ فإن: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$
- لتكن: $f(x) = \frac{k}{x^n}$, $n \in \mathbb{Z}^+$, $k \in \mathbb{R}$ فإن: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{k}{x^n} = 0$
- إذا كان $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ وكان b عدد حقيقي فإن: $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm b] = \pm\infty$
- إذا كان $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ وكان b عدد حقيقي موجب فإن: $\lim_{x \rightarrow a} [b \cdot f(x)] = \pm\infty$
- وإذا كان b عدد حقيقي سالب فإن: $\lim_{x \rightarrow a} [b \cdot f(x)] = \mp\infty$

- لتكن: $f(x) = ax^n$, $n \in \mathbb{Z}^+$, $a \in \mathbb{R}^*$ فإن:
 - 1 إذا كان n عدد زوجي فإن: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} ax^n = \begin{cases} \infty & : a > 0 \\ -\infty & : a < 0 \end{cases}$
 - 2 إذا كان n عدد فردي فإن: $\lim_{x \rightarrow -\infty} ax^n = \begin{cases} -\infty & : a > 0 \\ \infty & : a < 0 \end{cases}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} ax^n = \begin{cases} \infty & : a > 0 \\ -\infty & : a < 0 \end{cases}$

إذا كانت كل من f, g دالة حدودية حيث: $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$, $g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_0$

فإن : $\text{a} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_n}{b_m} : n = m$ $\text{b} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 : n < m$

نهايات الدوال المثلثية:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0 \quad , \quad \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1 \quad , \quad \lim_{x \rightarrow 0} \tan x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos ax = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{bx} = \frac{a}{b} \quad , \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{bx}{\sin ax} = \frac{b}{a}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan ax}{bx} = \frac{a}{b}$$

ثانيا (الاتصال)

شرط اتصال الداله عند نقطه:

1 الدالة f معرفة عند $x = c$ أي $f(c)$ موجودة.

2 $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ موجودة

3 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$

وإذا لم يتحقق أي شرط من الشروط السابقة فنقول إن f منفصلة (ليست متصلة) عند $x = c$.

نظريات الأتصال:

إذا كانت f, g دالتين متصلتين عند $x = c$ ، فإن الدوال التالية هي دوال متصلة عند $x = c$

- | | | |
|---|----------------------------------|----------------|
| 1 | $f + g$ | الجمع: |
| 2 | $f - g$ | الطرح: |
| 3 | $k \cdot f$, $k \in \mathbb{R}$ | الضرب في ثابت: |
| 4 | $f \cdot g$ | الضرب: |
| 5 | $\frac{f}{g}$, $g(c) \neq 0$ | القسمة: |

الدوال التالية جميعها متصله:

- 1 الدالة $f: f(x) = k$ حيث k ثابت متصلة عند كل $c \in \mathbb{R}$.
- 2 الدالة كثيرة الحدود متصلة عند كل $c \in \mathbb{R}$.
- 3 الدالة الحدودية النسبية $\frac{f}{g}$ متصلة عند كل عدد حقيقي c في مجالها أي $c \in D$.
- 4 الدالة $f: f(x) = |x|$ متصلة عند كل $c \in \mathbb{R}$.
- 5 الدوال المثلثية الأساسية متصلة عند كل عدد حقيقي c في مجالها أي $c \in D$.

الدالة الجذرية $y = \sqrt[n]{x}$ متصلة عند كل $x = c: c \in \mathbb{R}^+$ ، n عدد صحيح زوجي موجب،
ومتصلة عند كل $x = c: c \in \mathbb{R}$ ، n عدد صحيح فردي أكبر من 1.
إذا كانت g دالة متصلة عند $x = c$ وكانت $g(c) > 0$
فإن الدالة: $f(x) = \sqrt{g(x)}$ متصلة عند $x = c$

الدوال المركبة:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

خطوات بحث اتصال الدوال المركبة عند نقطة:

$$(g \circ f)(x)$$

1:

نبحث اتصال الدالة الثانية f عند النقطة المعطاة.

إذا كانت f متصلة عند c

2:

نوجد صورته الدالة الثانية f عند النقطة المعطاة $f(c)$.

3:

ثم نبحث اتصال الدالة الأولى g عند الناتج من خطوه 2.

و g متصلة عند $f(c)$

فإن الدالة المركبة $g \circ f$ متصلة عند c .

خطوات بحث اتصال الدالة على فتره:

إذا كانت الدالة f معرفّة على الفترة $[a, b]$ فإن:

- 1 الدالة f متصلة على الفترة المفتوحة (a, b) ، إذا كانت f متصلة عند كل x في الفترة (a, b)
- 2 الدالة f متصلة عند a من جهة اليمين إذا كان: $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$
- 3 الدالة f متصلة عند b من جهة اليسار إذا كان: $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$

وإذا تحققت الشروط الثلاثة، فإنّ الدالة تكون متصلة على الفترة المغلقة $[a, b]$

خطوات بحث الاتصال للدالة على مجالها:

- 1- نوجد مجال الدالة.
- 2- نبحث اتصال الدالة عند كل فتره من فترات المجال.
- 3- نبحث اتصال الدالة عند النقطة في الفترة المغلقة من ناحية اليمين.
(عند الطرف المغلق ... وفي بعض الحالات الخاصة نبحث ناحية اليسار)
- 4- من 1 و 2 و 3 الدالة تكون متصلة على مجالها R أو على الفترة.

ملاحظه هامه:

إذا كانت الدالة g متصله على فترة ما، $g(x) \geq 0$ في هذه الفترة فإن الدالة $f(x) = \sqrt{g(x)}$ متصله على هذه الفترة.

تستخدم لحل فكره المسائل التاليه :

لتكن $f: f(x) = \sqrt{x^2 - 2x}$.

أوجد D_f (مجال الدالة f) ثم ادرس اتصال الدالة f على $[-5, 0]$.

الحل: نفرض أن $f(x) = \sqrt{g(x)}$ ، $g(x) = x^2 - 2x$

$$\therefore D_f = \{x : g(x) \geq 0\}$$

$$x^2 - 2x \geq 0$$

$$x^2 - 2x = 0 \quad \text{المعادلة المناظرة:}$$

$$x(x - 2) = 0$$

$$x = 0 , x = 2$$



ثالثا (الاشتقاق)

حساب ميل المماس باستخدام التعريف:

ميل المماس لمنحنى عند نقطة محددة يعطى بالقاعدة: $m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ حيث إن a هي الإحداثي السيني للنقطة على منحنى الدالة f حيث إن x_0, y_0 هما إحداثيا النقطة على المنحنى، m هي ميل المماس.

حساب المشتقة عند نقطة باستخدام التعريف:

مشتقة الدالة f عند $x = a$ هي $f'(a)$:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

شرط وجود النهاية.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

■ إذا وضعنا x بدلاً من a في تعريف المشتقة عند النقطة نحصل على $f'(x)$ حيث
ويمكن أن نرمز للمشتقة بأحد الرموز التالية: y' , $f'(x)$, $\frac{d}{dx}(f(x))$, $\frac{dy}{dx}$

حساب المشتقة عند نقطة باستخدام التعريف البديل:

مشتقة دالة f عند $x = a$ هي :

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

شرط وجود النهاية.

ويرمز لذلك بالرمز:

$$f'(a) \quad \text{أو} \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=a}$$

أما إذا كانت النهاية غير موجودة عند $x = a$ نقول إن الدالة f غير قابلة للاشتقاق عند $x = a$
(غير موجودة $f'(a)$)

المشتقة من جهة واحدة:

مشتقة الدالة f من اليمين يرمز لها بالرمز $f'_+(a)$ وهي:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad (\text{إن وجدت})$$

ومشتقة الدالة f من اليسار يرمز لها بالرمز $f'_-(a)$ وهي:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad (\text{إن وجدت})$$

إن الدالة لها مشتقة عند نقطة إذا وفقط إذا كانت المشتقتان لجهة اليمين ولجهة اليسار موجودتين ومتساويتين عند تلك النقطة.

ملاحظات هامة :

- نحصل على ركن عندما تكون المشتقتان من جهة اليمين ومن جهة اليسار عند التقاء الشعاعين غير متساويتين.
- نحصل على ناب عندما يكون ميل المماس للمنحنى عند نقطة تقاطع محددة يقترب من ∞ في إحدى الجهات ويقترب من $-\infty$ في الجهة الثانية ويوجد مماس رأسي عندها.
- نحصل على مماس رأسي عندما يكون المماس للمنحنى عند نقطة رأسيًا.
- إذا كانت الدالة f لها مشتقة عند نقطة، فإنها تكون متصلة عند هذه النقطة.
- معكوس النظرية ليس صحيحًا دائمًا، الدالة المتصلة قد يكون لها ركن أو ناب أو مماس عمودي ومن ثم لا تكون قابلة للاشتقاق عند نقطة معينة.

قواعد الاشتقاق :

- إذا كان $f(x) = c$ فإن $f'(x) = 0$ حيث c قيمة ثابتة.
- إذا كانت $f(x) = x$ فإن $f'(x) = 1$
- إذا كان $f(x) = x^n$ فإن $f'(x) = nx^{n-1}$ حيث n عدد صحيح موجب أو سالب.
- $(kf(x))' = k f'(x)$
- $(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$

مشتقة ضرب دالتين = الدالة الأولى $\times$ مشتقة الدالة الثانية + الدالة الثانية $\times$ مشتقة الدالة الأولى

$$(f(x) \cdot g(x))' = f(x) \cdot g'(x) + g(x) \cdot f'(x)$$

مشتقة قسمة دالتين = $\frac{\text{دالة المقام} \times \text{مشتقة دالة البسط} - \text{دالة البسط} \times \text{مشتقة دالة المقام}}{\text{مربع دالة المقام}}$

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' = \frac{g(x) \cdot f'(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}$$

تحويلات هامة جدا:

$F(x) = 6\sqrt{x}$ $= 6x^{1/2}$ $F'(x) = 6(1/2)x^{-1/2}$ $= 3x^{-1/2}$	$\sqrt{x} \rightarrow x^{1/2}$ $\sqrt[3]{x} \rightarrow x^{1/3}$ $\sqrt[7]{x^5} \rightarrow x^{5/7}$ هذه التحويلات
--	---

$F(x) = \frac{1}{x^9}$ $= x^{-9}$ $F'(x) = -9x^{-10}$	$\frac{1}{x} \rightarrow x^{-1}$ $\frac{1}{x^3} \rightarrow x^{-3}$ $\frac{5}{x^8} \rightarrow 5x^{-8}$ هذه التحويلات
---	--

في ثلاث حالات للاشتقاق:

- 1- لو مطلوب إيجاد المشتقة للدالة عند نقطة
((كده نجيب المشتقة يمين ويسار عند النقطة باستخدام التعريف)).
- 2- لو مطلوب نبحث او ندرس الاشتقاق للدالة عند نقطة
((كده نجيب الاول النهاية والاتصال ولو تحقق نوجد المشتقة باستخدام التعريف)).
- 3- لو مطلوب إيجاد المشتقة للدالة على مجالها او بدون اعطاء نقطه.
((وقتها نجيب مجال الدالة ونستخدم تطبيقات الاشتقاق يمين ويسار ونكتب كلمه تبحت ثم نحيب المشتقة عند نقطه البحث)).

معادله خط المماس وخط النازم :

يمكننا إيجاد ميل المماس لمنحنى الدالة f عند النقطة $(a, f(a))$ عن طريق إيجاد المشتقة عند هذه النقطة. وتكون معادلة المماس: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$
والمستقيم العمودي (النازم) على منحنى الدالة عند النقطة $(a, f(a))$ هو المستقيم العمودي على مماس المنحنى عند تلك النقطة ومعادلته:

$$y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a)$$

معادلة خط المماس ومعادلة خط الناقص
أو المعرجي

عند النقطة (x_1, y_1)

الصورة $F(x) \rightarrow$ له a
بالدخول لو غير
معطى بالسؤال
الحل

1) توجد $F'(x)$

2) $m = F'(x_1)$ $\rightarrow$ نعوذ في ناتج المشتقة
بدل x نضع x_1
معدل
المماس

نقيم التآزر من الناتج بأستخدام حساب المشتقة
بالأدلة الكتابية
هكذا "جدا"

3) معادلة خط المماس هي $y - y_1 = m(x - x_1)$
معطى

4) $m =$ معدل التغير أو الناقص

5) معادلة خط الناقص أو المعرجي $y - y_1 = m(x - x_1)$

أشتقاق الدوال المثلثية:

إذا كان $f(x) = \sin x$ فإن: $f'(x) = \cos x$

إذا كان $f(x) = \cos x$ فإن: $f'(x) = -\sin x$

إذا كان $f(x) = \tan x$ فإن: $f'(x) = \sec^2 x$

إذا كان $f(x) = \cot x$ فإن: $f'(x) = -\csc^2 x$

إذا كان $f(x) = \sec x$ فإن: $f'(x) = \sec x \cdot \tan x$

إذا كان $f(x) = \csc x$ فإن: $f'(x) = -\csc x \cdot \cot x$



Radian

Shift + [5]

الدالة الكاسية

$\frac{d}{dx} \sin x \rightarrow \cos x$

$\frac{d}{dx} \cos x \rightarrow -\sin x$

$\tan x$

↙ ↘

$\sec x$ $\sec x$

$\cot x$

↙ ↘

$\csc x$ $\csc x$

$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x = (\sec x)^2$

$\frac{d}{dx} \cot x = -\csc^2 x = -(\csc x)^2$

$\frac{d}{dx} \sec x = \tan x \cdot \sec x$

$\frac{d}{dx} \csc x = -\csc x \cdot \cot x$

على الألف الكاسية

$\sec x = \frac{1}{\cos x}$

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

← متطابقة فيثاغورس

$\csc x = \frac{1}{\sin x}$

$\cot x = \frac{1}{\tan x}$

قاعده السلسله:

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$F(x) = \checkmark \quad \text{و} \quad g(x) = \checkmark$$

$$(F \circ g)'(x) = F'(g(x)) \cdot g'(x)$$

① $F'(x)$ توجد

② لغرض بـ x و $g(x)$ في $F'(x)$

$$F'(g(x)) = \checkmark$$

③ $g'(x)$ توجد

④ $(F \circ g)'(x) =$ ضرب نتائج خطوات ②, ③

صورة أخرى لقاعدة السلسلة

إذا كانت $y = f(u)$, $u = g(x)$ فإن:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

يتم حسابها عند $u = g(x)$

قاعدة سلسلة القوى

إذا كانت $f(x)$ قابلة للاشتقاق على مجالها وكان n عدداً نسبياً فإن:

$$\frac{d}{dx}(f(x))^n = n(f(x))^{n-1} \cdot f'(x)$$

((قاعده سلسله القوى تعتمد على مشتقه ما بداخل القوس الذى له أس))

المشتقات ذات الرتب العليا:

هي مشتقات الدالة y من الرتب العليا إذا وجدت في مجال تعريفها. $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}, \frac{d^3y}{dx^3}, \dots, \frac{d^ny}{dx^n}$

في الاشتقاق الضمني نوجد مشتقة المتغير المستقل x ومشتقة المتغير التابع y ثم نوجد $\frac{dy}{dx}$.

رابعاً (تطبيقات الاشتقاق)

القيم القصوى المطلقة:

- إذا كانت f دالة مجالها D ، $c \in D$ فإن $f(c)$ تسمى:
- قيمة عظمى مطلقة للدالة f على D عندما: $f(c) \geq f(x)$, $\forall x \in D_f$
 - قيمة صغرى مطلقة للدالة f على D عندما: $f(c) \leq f(x)$, $\forall x \in D_f$

إذا كانت f دالة متصلة على فترة مغلقة $[a, b]$ فإن f تكون لها قيمة عظمى مطلقة وقيمة صغرى مطلقة على هذه الفترة.

القيم القصوى المحلية:

- لتكن $(c, f(c))$ نقطة داخلية للدالة f ، D فترة مفتوحة تحوي c ، $f(c)$ تكون:
- a** قيمة عظمى محلية عند c عندما: $f(c) \geq f(x)$ $\forall x \in D$
 - b** قيمة صغرى محلية عند c عندما: $f(c) \leq f(x)$ $\forall x \in D$

النقاط الحرجة:

النقطة الداخلية للدالة f $(c, f(c))$ تسمى نقطة حرجة عندما $f'(c) = 0$ أو $f'(c)$ غير موجودة.

إذا كانت للدالة f قيمة قصوى (عظمى أو صغرى) محلية عند $x = c$ فإن $(c, f(c))$ نقطة حرجة.

خطوات إيجاد القيم القصوى المطلقة خلال فترة:

خطوات إيجادها جبرياً على $[a, b]$:

- 1 إيجاد قيم الدالة عند النقاط الطرفية: $x = a$, $x = b$
- 2 إيجاد النقاط الحرجة للدالة f في الفترة (a, b) إن وجدت.
- 3 أكبر قيمة للدالة في الخطوتين 1 , 2 هي قيمة عظمى مطلقة في $[a, b]$ وأصغر قيمة للدالة هي قيمة صغرى مطلقة في $[a, b]$.

فترات التزايد والتناقص:

(تعتمد على أشاره المشتقة الأولى حول النقطة الحرجة في جدول التزايد والتناقص)

لتكن f دالة قابلة للاشتقاق على (a, b) .

- إذا كانت $f'(x) > 0$ عند كل x تنتمي إلى الفترة (a, b) ، فإن f تزايد على (a, b) .
- إذا كانت $f'(x) < 0$ عند كل x تنتمي إلى الفترة (a, b) ، فإن f تناقص على (a, b) .
- إذا كانت $f'(x) = 0$ عند كل x تنتمي إلى الفترة (a, b) ، فإن الدالة f ثابتة على (a, b) .

القيم القصوى المحلية:

(تعتمد على اتجاهات الأسهم في جدول التزايد والتناقص)

لتكن f دالة متصلة على مجالها وكانت $(c, f(c))$ نقطة حرجة.

- إذا كانت إشارة المشتقة f' تتغير من الموجب إلى السالب عند $x = c$ فإن f يكون لها قيمة عظمى محلية عند c .
- إذا تغيرت إشارة f' من السالب إلى الموجب عند $x = c$ فإن f يكون لها قيمة صغرى محلية عند c .

إذا لم تتغير إشارة f' عند $x = c$ فإن f لا يكون لها قيمة قصوى محلية عند c .

التقعر:

(تعتمد على أشاره المشتقة الثانية حول نقطه الانعطاف في جدول التقعر)

إذا وقع منحنى الدالة أعلى جميع مماساته على فترة I فإنه يكون مقعراً لأعلى على I .
وإذا وقع منحنى الدالة أسفل جميع مماساته على فترة I فإنه يكون مقعراً لأسفل على I .
اختبار التقعر:

a إذا كانت $\forall x \in I, f''(x) > 0$ فإن منحنى الدالة f مقعراً لأعلى على I .

b إذا كانت $\forall x \in I, f''(x) < 0$ فإن منحنى الدالة f مقعراً لأسفل على I .

نقطة الانعطاف:

نقطة الانعطاف:

تسمى النقطة $(c, f(c))$ نقطة انعطاف لمنحنى الدالة f إذا كانت f دالة متصلة عند c ، ومنحنى الدالة f يغير تقعره عند هذه النقطة من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى.

إذا كانت $(c, f(c))$ نقطة انعطاف لبیان الدالة f فإن $f''(c) = 0$ أو $f''(c)$ غير موجودة.

أختبار المشتقة الثانية:

إذا كانت $f'(c) = 0$ ، $f''(c) < 0$ ، فإن f تكون لها قيمة عظمى محلية عند $x = c$.
إذا كانت $f'(c) = 0$ ، $f''(c) > 0$ ، فإن f تكون لها قيمة صغرى محلية عند $x = c$.

خطوات دراسته تغير الدالة ورسم بيانها:

- 1 عيّن مجال الدالة f .
مجال دالة كثيرة الحدود هو $\mathbb{R}$ ولكنه يقتصر أحياناً على فترة من $\mathbb{R}$ خاصة في المسائل الحياتية.
- 2 أوجد النهايات عند الحدود المفتوحة لمجال الدالة f .
- 3 عيّن النقاط الحرجة للدالة f .
- 4 كوّن جدولاً لدراسة إشارة f' وتحديد فترات التزايد وفترات التناقص للدالة والقيم القصوى المحلية.
- 5 كوّن جدولاً لدراسة إشارة f'' وتحديد فترات التقعر لمنحنى الدالة ثم نقاط الانعطاف إن وجدت.
- 6 أوجد نقاطاً إضافية.
- 7 ارسم بيان الدالة f . استخدم نتائج الخطوات السابقة في الرسم.

خطوات حل مسائل تطبيقات القيم القصوى:

كُون نموذجًا رياضيًا للمسألة

ضع متغيرًا واحدًا يمثل الكمية المطلوب الحصول على قيمتها العظمى أو قيمتها الصغرى.
ثم اكتب دالة باستخدام المتغير بحيث تعطي قيمتها القصوى المعلومات التي نبحث عنها.

(دائما تكن $F(X)$ هي العلاقة المراد تكون أكبر أو أصغر ما يمكن)

أوجد مجال الدالة. وحدد قيم المتغير التي تكون معقولة في المسألة.

حدد النقاط الحرجة ويمكن إيجاد النقاط الطرفية:
أوجد أين تكون المشتقة صفرية أو أين لا يكون لها وجود.

طبق اختبار المشتقة الثانية

(بالتعويض بالنقاط الحرجة في المشتقة الثانية ونحدد القيم القصوى المطلقة على حسب اشارته ناتج التعويض في المشتقة الثانية)

فسر الحل: ترجم نتيجتك الرياضية إلى الموقف في المسألة، ثم قرر ما إذا كانت النتيجة معقولة.

صفوة معلم الكونت

خامسا (الإحصاء)

إن درجة الثقة أو مستوى الثقة هو احتمال $(1 - \alpha)$ أن تكون فترة الثقة تحوي القيمة الحقيقية لمعلمة المجتمع قيد الدراسة، وعادة يعبر عنها كنسبة مئوية. أما α فهي نسبة الخطأ في التقدير وتسمى مستوى المعنوية أو مستوى الدلالة. فمثلاً:

إذا كانت $\alpha = 0.05$ حينها تكون درجة الثقة $1 - \alpha = 0.95$ أي 95%

المعلمة هي ثابت يصف المجتمع أو يصف توزيع المجتمع كالمتوسط الحسابي μ أو الانحراف المعياري σ . الإحصاءة هو اقتران تتعين قيمته من العينة كالمتوسط الحسابي $\bar{x}$ أو الانحراف المعياري لها S .

$Z_{\frac{\alpha}{2}}$ هي القيمة الحرجة المستخرجة من جدول التوزيع الطبيعي المعياري. $\bar{x}$ هو المتوسط الحسابي للعينة.

S هو الانحراف المعياري للعينة. $t_{\frac{\alpha}{2}}$ هي القيمة الحرجة المستخرجة من جدول التوزيع t .

الفرض الإحصائي: هو ادعاء معين مبني على حثيات معقولة حول معلمة من معالم المجتمع مثل المتوسط الحسابي μ أو الانحراف المعياري σ .

المقياس الإحصائي هو قيمة وحيدة محسوبة من العينة تحت شروط معينة.
اختبارات الفروض الإحصائية (اختبار المعنوية) هي طريقة معيارية لاختبار ادعاء ما حول معلمة من معالم المجتمع.

الخطوات المتبعة لإجراء اختبار الفروض الإحصائية:

- 1 صياغة الفروض الإحصائية (فرض العدم H_0 والفرض البديل H_1).
- 2 التحقق من الانحراف المعياري σ للمجتمع (معلوم أم غير معلوم) وتحديد حجم العينة (n) ومن ثم إيجاد المقياس الإحصائي للاختبار (Z أو t)، (مسترشداً بالجدول التالي):

الانحراف المعياري (σ)	المقياس الإحصائي (Z أو t)	حجم العينة (n)
معلوم	$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$	لا يشترط حجم معين للعينة
غير معلوم	$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$	$n > 30$
	$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$	$n \leq 30$

- 3 تحديد مستوى المعنوية α وحساب القيمة الجدولية $Z_{\alpha/2}$ من جدول التوزيع الطبيعي المعياري أو القيمة الجدولية $t_{\alpha/2}$ من جدول t ذي درجات حرية.
- 4 تحديد منطقة القبول: $(-Z_{\alpha/2}, Z_{\alpha/2})$ أو $(-t_{\alpha/2}, t_{\alpha/2})$ كما هو موضح بالشكل.
- 5 اتخاذ القرار الإحصائي (قبول فرض العدم) أو (رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل).

ملاحظة: ستقتصر دراستنا على مستوى ثقة 95%.

Statistics

الإحصاء

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{\frac{1-\alpha}{2}} ; -Z_{\frac{\alpha}{2}} = -Z_{\frac{1-\alpha}{2}} \quad (\text{القيمة الحرجة})$$

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (\text{الخطأ المعياري للمجتمع})$$

$$E = Z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (\text{هامش الخطأ - توزيع طبيعي})$$

$$(\bar{x} - E, \bar{x} + E) \quad \text{فترة الثقة للمتوسط الحسابي}$$

$$t_{\frac{\alpha}{2}} = t_{1-\frac{\alpha}{2}} \quad (\text{التوزيع } t)$$

$$E = t_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \quad (\text{هامش الخطأ - توزيع } t \text{ الانحراف المعياري } \sigma \text{ غير معلوم})$$

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \quad (\text{المقياس الإحصائي - توزيع طبيعي})$$

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \quad (\text{المقياس الإحصائي - توزيع طبيعي - الانحراف المعياري } \sigma \text{ غير معلوم})$$

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \quad (\text{المقياس الإحصائي - توزيع } t \text{ - الانحراف المعياري } \sigma \text{ غير معلوم})$$

سادسا قوانين وتحليلات من سنوات سابقه نحتاج اليها في حل المسائل

$$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$$

$$x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$$

$$x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$$

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$$

$$(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

$$(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$$

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad , \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a > 0:$$

$$|x| = a : x = a \text{ أو } x = -a$$

$$|x| < a : -a < x < a$$

$$|x| > a : x > a \text{ أو } x < -a$$

$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

$$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

(أحمد نصار)

$F(x) = ax^2 + bx + c$

معامل رئيسي

معادلة حدودية من الدرجة الثانية في الصورة العامة

أرقام ثابتة $a, b, c \rightarrow$

لتحليل معادلة من الدرجة الثانية

أولاً بالآلة الحاسبة $\rightarrow$ (Mode, 5, 3)

$F(x) = (x - x_1)(x - x_2) = 0$

هناضع ناتج الآلة الحاسبة بعكس الإشارة

هناضع ناتج الآلة الحاسبة بنفس الإشارة

هناضع ناتج الآلة الحاسبة بعكس الإشارة

هناضع ناتج الآلة الحاسبة بنفس الإشارة

هناضع ناتج الآلة الحاسبة بعكس الإشارة

هناضع ناتج الآلة الحاسبة بنفس الإشارة

الضرب في المرافق للجذر التربيعي أو التكعيبي

أحمد نصار

لكل عددين a, b هنا جدا جدا

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b}) \cdot (\sqrt{a} + \sqrt{b})$$

$$= (\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2$$

$$= a - b$$

المرافق دائمًا نفس القوس مع تغيير إشارة الرقم الثاني

من + ← - ومن - ← +

مربع الأول

مربع الثاني

أحمد نصار

المرافق للجذر التكعيبي

$$\sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[3]{x^2} = \sqrt[3]{x^3} = x$$

$$\sqrt[3]{5x} \cdot \sqrt[3]{(5x)^2} = \sqrt[3]{(5x)^3} = 5x$$

المرافق

المرافق

((مذكره مجانية ... المرجع : الكتاب المدرسي وكراسة
التمارين وزارة التربية والتعليم الكويتية))