

السهم الذهبى

فى

الرياضيات



55137938



الصف الحادى عشر علمى

الفصل الدراسى الاول



55137938

- لكل عدد حقيقي موجب، جذران تربيعيان أحدهما موجب والآخر سالب.
- أي أن إذا كان $A^2 = x \leq$ فإن، $A = \pm \sqrt{x}$, $x > 0$.
- لكل عدد حقيقي جذر تكعبي حقيقي واحد.

$$(\sqrt[3]{x})^3 = \sqrt[3]{x^3} = x, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

مثال 1 أوجد الجذر التكعيبي لكل مما يلي دون استخدام الآلة الحاسبة: -

- ① -8
- ② 125
- ③ $-\frac{375}{24}$
- ④ 0.064

أوجد الجذر التكعيبي لكل مما يلي دون استخدام الآلة الحاسبة: -

حاول ان تحل

a -27

b 64

c -0.008

d $\frac{343}{216}$

حتى يكون التعبير الجذري في أبسط صورة يجب مراعاة ما يلي:

- ألا يكون للمجذور عوامل مرفوعة لقوة أكبر من أو تساوي دليل الجذر.
- فمثلاً $\sqrt{8a^6b^7}$ ليس في أبسط صورة.
- ألا يكون المقام جذراً. مثل: $\frac{5}{\sqrt{2}}$ ليس في أبسط صورة.
- ألا يكون المجذور كسراً. مثل: $\sqrt{\frac{4}{7}}$ ليس في أبسط صورة.
- أن يكون دليل الجذر أصغر عدد صحيح موجب ممكن.
- مثال: $\sqrt[10]{32}$ ليس في أبسط صورة.

تبسيط الجذور



انتبه



55137938

مثال 2

بسط كلا من التعبيرات الجذرية التالية لكل عدد حقيقي x :

① $\sqrt{4x^6}$

② $\sqrt[3]{8x^3} + 3x$

تذكر:

$$\sqrt{x^2} = |x|$$

$$|x| = \begin{cases} x : x > 0 \\ 0 : x = 0 \\ -x : x < 0 \end{cases}$$

بسط كلا من التعبيرات الجذرية التالية حيث x, y عدنان حقيقيان:

① $\sqrt{9x^2y^4}$

② $\sqrt[3]{-27x^6} + 3x^2$

③ $\sqrt{x^8y^6}$

جمع وطرح التعبيرات الجذرية

- لجمع التعبيرات الجذرية وطرحها، يجب أن تكون متشابهة
- يكون التعبيران الجذريان متشابهين عندما يكون لهما دليل الجذر نفسه والمجذور نفسه.
- يجب وضع التعبيرات الجذرية في أبسط صورة مما يسمح لنا بمعرفة ما إذا كانت متشابهة أم لا.



① $3\sqrt{32} - \sqrt{98}$

أوجد الناتج في أبسط صورة :

مثال 4

2 $\sqrt{18} + \sqrt{50} - \sqrt{72}$

إمتحان final

3 $\sqrt{75} - 4\sqrt{18} + 2\sqrt{32}$

إمتحان final

كراسة التمارين

4 $\sqrt[3]{128} + \sqrt[3]{54} - 2\sqrt[3]{250}$

1 $8\sqrt[3]{8} + 2\sqrt[3]{128}$

أوجد الناتج في أبسط صورة :

حاول ان تحل

2 $2\sqrt{75} - \sqrt{48}$

3 $\sqrt{12} + \sqrt{147} - \sqrt{27}$

4 $\sqrt[3]{320} + \sqrt[3]{40} - \sqrt[3]{135}$

مُعَلِّمٌ كَوِيَّةٌ
صَبَّوْهُ: مِي مَارِيَّة

ضرب وقسمة الجذور التربيعية والجذور التكعيبية

الجذور التكعيبية	الجذور التربيعية
$\forall x, y \in \mathbb{R}$ $\sqrt[3]{x^3} = x$ $(\sqrt[3]{x})^3 = x$ $\sqrt[3]{x \cdot y} = \sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[3]{y}$ $\sqrt[3]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{y}}, y \neq 0$	$\forall x, y \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ $\sqrt{x^2} = x = x$ $(\sqrt{x})^2 = x$ $\sqrt{x \cdot y} = \sqrt{x} \cdot \sqrt{y}$ $\sqrt{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}}, y \neq 0$


بسط كل من التعبيرات الجذرية الآتية

مثال 5

① $\sqrt{72x^3}, x \geq 0$

② $\sqrt[3]{80n^5}$

مُعَلِّمٌ كَوِيْتٌ
صَفْوَةُ مِي كَوِيْتٌ



بسّط كل من التعبيرات الجذرية التالية

1 $\sqrt{50 x^4}$

2 $\sqrt[3]{18 x^3}$

1 $\sqrt{5x^3} \times \sqrt{40x}$, $x \geq 0$

بسّط كل من التعبيرات الجذرية التالية

مثال 6

2 $\sqrt[3]{5 x^3 y^4} \times \sqrt[3]{64 x^2 y^3}$

مُعَلِّمٌ كَوَيْتٌ
صَفْوَةُ مِي كَوَيْت

بسّط كل من التعبيرات الجذرية التالية

حاول ان تحل

1 $3\sqrt{7x^3} \times 2\sqrt{x^3 y^2}$, $x \geq 0$

2 $4\sqrt[3]{x^4 y} \times 3\sqrt[3]{x^2 y}$

بسّط كل من التعبيرات الجذرية التالية

حاول ان تحل

1 $\frac{\sqrt{243}}{\sqrt{27}}$

2 $\frac{\sqrt{12 x^4}}{\sqrt{3 x}}$, $x > 0$

مُعَلِّمٌ مَيَّانٌ

$$3 \frac{\sqrt[3]{128 x^{15}}}{\sqrt[3]{2 x^2}}, x \neq 0$$

بسط التعبيرات الجذرية الآتية



$$1 \frac{1 + \sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$



تبسيط كسر مقامه يتضمن جذراً

إذا كان x, y تعبيرين جذريين يمثلان أعداداً غير نسبية وكان ناتج ضرب x في y عدداً نسبياً فإن x, y مترافقان.

فمثلاً: $\sqrt{2}$ مرافق $\sqrt{2}$ ، لأن: $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$ حيث الناتج 2 عدداً نسبياً.

وكذلك $(3 + \sqrt{2})$ مرافق $(3 - \sqrt{2})$ ، لأن: $(3 - \sqrt{2})(3 + \sqrt{2}) = 9 - 2 = 7$ حيث الناتج 7 عدداً نسبياً.

وأيضاً $\sqrt[3]{5^2}$ مرافق لـ $\sqrt[3]{5}$ لأن: $\sqrt[3]{5} \times \sqrt[3]{5^2} = \sqrt[3]{5^3} = 5$ حيث الناتج 5 عدداً نسبياً.

$$2 \frac{\sqrt{2} - 1}{3 - \sqrt{2}}$$

صِفْوَةٌ مَعَ الْكُتُبِ

1) $\frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

بسّط التعبيرات الجذرية الآتية

حاول ان تحل

2) $\frac{3 - \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}}$

3) $\frac{1}{\sqrt[3]{7^2}}$

مُعَلِّمٌ كَوِيْتٌ
صَبَّوْهُ مِي مِي

كراسة التمارين

بسط التعبيرات الجذرية الآتية

$$\frac{5 + \sqrt{5}}{4 - 3\sqrt{5}}$$

$$\frac{4}{3\sqrt{3} - 2}$$

$$\frac{3}{\sqrt[3]{2}}$$

مُعَلِّمٌ كَوِيْتٌ
صَبَّوْهُ: مِي يَاسِيْن

أوجد قيمة التعبير : $x^2 - 6$ ، إذا كان $x = \frac{4}{\sqrt{5}-1}$



أوجد قيمة التعبير : $x^2 - x + 1$ ، إذا كان $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$



صِفْوَةٌ مَعَ الْكُتُبِ

الصورة الجذرية	الصورة الأسية.
$\sqrt{25} = {}^2\sqrt{25}$	$25^{\frac{1}{2}}$
$\sqrt[3]{27}$	$27^{\frac{1}{3}}$
$\sqrt[4]{64}$	$64^{\frac{1}{4}}$



مثال 1

بسّط كل عدد من الأعداد التالية مستخدماً الصورة الجذرية:

a $125^{\frac{1}{3}}$

b $5^{\frac{1}{2}} \times 5^{\frac{1}{2}}$

c $10^{\frac{1}{3}} \times 100^{\frac{1}{3}}$



حاول ان تحل

بسّط كل عدد من الأعداد التالية مستخدماً الصورة الجذرية:

a $64^{\frac{1}{3}}$

b $(2^{\frac{1}{2}})(2^{\frac{1}{2}})$

c $(8^{\frac{1}{2}})(2^{\frac{1}{2}})$



1

صَفْهُ مَعَ الْكُتُبِ

حاول ان تحل

2 اكتب العدد $64^{\frac{4}{3}}$ بالصورة الجذرية.

حاول ان تحل

1 $x^{0.4}$

2 $y^{\frac{3}{8}}, \forall y \geq 0$

3 اكتب بالصورة الجذرية كلاً من:

b اكتب بالصورة الأسية كلاً من:

2 $(\sqrt{y})^3, \forall y \geq 0$

1 $\sqrt[3]{x^2}$

ليكن n, m عددين نسبيين، a, b عددين حقيقيين حيث a^n, b^n, b^m أعداداً حقيقية.

القانون	المثال
$b^m \cdot b^n = b^{m+n}$	$8^{\frac{1}{3}} \times 8^{\frac{2}{3}} = 8^{\left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}\right)} = 8^{\frac{3}{3}} = 8^1 = 8$
$(b^m)^n = b^{m \cdot n}$	$(5^{\frac{1}{2}})^4 = 5^{\left(\frac{1}{2} \times 4\right)} = 5^2 = 25$
$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$	$(4 \times 5)^{\frac{1}{2}} = 4^{\frac{1}{2}} \times 5^{\frac{1}{2}} = 2 \times 5^{\frac{1}{2}}$
$b^{-n} = \frac{1}{b^n}, b \neq 0$	$9^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{9^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{3}$
$\frac{b^m}{b^n} = b^{m-n}, b \neq 0$	$\frac{9^{\frac{3}{2}}}{9^{\frac{1}{2}}} = 9^{\left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\right)} = 9^{\frac{2}{2}} = 9^1 = 9$
$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0$	$\left(\frac{-125}{27}\right)^{\frac{1}{3}} = \frac{-125^{\frac{1}{3}}}{27^{\frac{1}{3}}} = \frac{-5}{3}$



قوانين الأسس النسبية

قوانين الجذور النونية

إذا كان: $\sqrt[n]{x}, \sqrt[n]{y}$ عددين حقيقيين، فإن:

1 $\sqrt[n]{x} \cdot \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{x \cdot y}$


2 $\frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} = \sqrt[n]{\frac{x}{y}}, y \neq 0$

3 $\sqrt[n]{\sqrt[m]{x}} = \sqrt[n \cdot m]{x}, \sqrt[n]{\sqrt[m]{x}} \in \mathbb{R}$

مثال 5

بسط كلاً مما يلي مستخدماً قوانين الأسس:

a $(-32)^{\frac{3}{5}}$



b $(x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{5}{6}}) \div x^{\frac{2}{3}}, x > 0$

حاول اءحل

5 بسط كلاً من الأعداد التالية مستخدماً قوانين الأسس:

a $25^{-\frac{3}{2}}$



c $\left(\frac{16x^{14}}{81y^{18}}\right)^{\frac{1}{2}}, x \geq 0, y > 0$

بسّط كلّاً من التعبيرات الجذرية التالية:

6

حاول أن تحل

a ${}^5\sqrt{9} \times {}^5\sqrt{27}$

b $\frac{{}^3\sqrt{243}}{{}^3\sqrt{3}}$

c $\sqrt{{}^3\sqrt{729}}$

d $({}^4\sqrt{x} \cdot {}^4\sqrt{y^3})^{-12}, x, y \in \mathbb{Q}^+$

مُعَلِّمٌ كَوْنِيٌّ
صَبَّوْنٌ مِي مِي

التكرير
يحول المعلم لاختيطة

a

b

$$\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{5}$$

a

b

$$16^{\frac{-3}{4}} = 32^{\frac{-3}{5}}$$

a

b

المقدار: $\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3}$ يساوي $\sqrt[3]{5}$

a

b

$$(x^{-\frac{1}{2}})(x^{\frac{1}{3}}) = x^{-\frac{1}{6}} \quad \text{حيث } x > 0$$

a

b

$$\sqrt[4]{\sqrt{x}} = x, x > 0$$

a

b

$$|m| \times \sqrt{m^2} = m^2, \quad \text{لكل عدد حقيقي } m$$

إذا كان $n > 0$ فإن التعبير الذي لا يكافئ $\sqrt[4]{4n^2}$ هو :

Ⓐ $(4n^2)^{\frac{1}{4}}$

Ⓑ $2n^{\frac{1}{2}}$

Ⓒ $(2n)^{\frac{1}{2}}$

Ⓓ $\sqrt{2n}$

$$\left(\sqrt[4]{x^{-2}y^4}\right)^{-2} = \quad : x \neq 0, y \neq 0$$

Ⓐ $|x^{-1}|y^2$

Ⓑ $|x|y^{-2}$

Ⓒ xy^2

Ⓓ $x^{-2}y^2$

إذا كان $x > 0$ ، فإن التعبير $\frac{(x^{\frac{5}{3}})(40^{\frac{1}{3}})}{(5x^2)^{\frac{1}{3}}}$ يساوي :

Ⓐ $8x$

Ⓑ $\frac{8}{5}x$

Ⓒ $2x$

Ⓓ $\frac{1}{5}x$

إذا كان $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ فإن :

(a) $\varphi^2 + \varphi = 1$

(b) $\varphi^2 + 1 = \varphi$

(c) $\varphi + \varphi^2 + 1 = 0$

(d) $\varphi^2 = \varphi + 1$

كراسة التمارين

رجاءً رج المخ
جيداً قبل الحلPlease Shake The Brain
Well Before Solving.

a

b

$$(3 - 2\sqrt{2})^{27} \times (3 + 2\sqrt{2})^{27} = 1$$

إذا كان $x + y = 2$, $x^2 - xy + y^2 = 4$, فإن $\sqrt[6]{x^3 + y^3}$ يساوي:

(a) $\sqrt{2}$

(b) $\sqrt[3]{2}$

(c) $\sqrt[3]{6}$

(d) 2

إن قيمة التعبير $\frac{\sqrt[3]{x^6} \cdot \sqrt[4]{x^5}}{x^3 \cdot \sqrt[8]{x^2}}$, $x > 0$ تساوي:

(a) x

(b) $\frac{1}{x}$

(c) 1

(d) $\sqrt{x}$

إذا كان $x \in \mathbb{R}^-$ فإن $\frac{1}{x} \cdot |x|$ يساوي:

(a) -1

(b) -x

(c) 1

(d) x

لوضع التعبير الجذري $\sqrt[3]{\frac{5}{4}}$ في أبسط صورة نضرب كلاً من البسط والمقام في:

(a) $\sqrt{2}$

(b) $\sqrt[3]{2}$

(c) 2

(d) 4

التعبير الجذري الذي في أبسط صورة هو:

(a) $\sqrt[3]{216}$

(b) $\frac{2}{\sqrt[3]{2}}$

(c) $\sqrt[3]{9}$

(d) $\sqrt{\frac{2}{3}}$

صِفْوَةٌ مَعَالِمِيَّةٌ

التَّكْوِينُ
يَحْوِلُ الْعِلْمَ لِحَقِيقَةٍ

لحل معادلة جذرية اتبع الخطوات التالية:
الخطوة الأولى: أفصل الجذر إلى أحد طرفي المعادلة.
الخطوة الثانية: حدد شرط الحل

— إذا كان دليل الجذر عددًا زوجيًا فإن قيمة ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي الصفر
وكلاً من طرفي المعادلة أكبر من أو يساوي الصفر أيضًا.

— إذا كان دليل الجذر عددًا فرديًا فإن قيمة ما تحت الجذر ينتمي إلى $\mathbb{R}$.

الخطوة الثالثة: ارفع طرفي المعادلة إلى أس مناسب يحذف الجذر.

الخطوة الرابعة: تأكد من أن الحل يحقق الشرط.

أولاً: المعادلات الجذرية

انتبه!

$$3 + \sqrt{x} = 10$$

معادلة جذرية

$$(x - 2)^{\frac{1}{2}} = 1$$

معادلة جذرية

$$\sqrt{3} + x = 1$$

ليست معادلة جذرية

أوجد مجموعة حل كل من المعادلات الآتية

مثال 1

a $2 + \sqrt{3x - 2} = 6$

إمتحانه final

الحل

المعادلات تحتوي على x



$$2\sqrt{x - 3} - 3 = 9$$

إمتحانه final

$$2 + \sqrt{3x + 6} = 8$$

b $6 + \sqrt{x - 1} = 3$

الحل

a $\sqrt{5x + 4} - 7 = 0$

حاول اءءءل أوءء مءءوءة ءل ءل من المءاءلات الءالفة:



(a) $3\sqrt{x} + 3 = 15$ ءل ءلاً من المءاءلات الءالفة: ءرأسه الءمارفه



مُعَلِّمٌ كَوِيْتٌ
صَبَّوْهُ: مِي مَارِيَا

$$\sqrt{x+3} - 5 = 0$$

امءءاه final

(e) $\sqrt{3-4x} - 2 = 0$



أوجد مجموعة الحل: $5 + \sqrt{x-3} = x$

إمتحان final

مثال 3

المعادلات تحتوي على x في الطرفين

صِفْوَةٌ مَعَالِمُ الْكُوَيْتِ

$\sqrt{x+2} = x$

إمتحان final

حاول ان تحل

$$\sqrt{5x-1} + 3 = x$$



أوجد مجموعة الحل:

حل كلاً من المعادلات التالية: (a) $\sqrt{11x+3} - 2x = 0$



إمتحانه final

صِفْوَةٌ مَعَالِكِيَّة



a $\sqrt{8x} - 2\sqrt{4x - 16} = 0$



أوجد مجموعة الحل لكل معادلة:

المعادلات تحتوي على جذرين



b $\sqrt{x} + \sqrt{2x - 4} = 0$



صِفْوَةٌ مَعَالِكِيَّةٌ

حاول ان تحل

أوجد مجموعة الحل لكل معادلة:

a $\sqrt{5x} - \sqrt{2x+9} = 0$



إمتحانه final

b $\sqrt{x-7} + \sqrt{3x-21} = 0$



مُعَلِّمٌ كَوِيَّةٌ
صَبَّوْهُ بِمِيَاوِيَّةٍ

كراسة التمارين

(f) $\sqrt{10x} - 2\sqrt{5x - 25} = 0$



يوجد قيمة مطلقة ولا يوجد شرط حل

$$(x^{\frac{m}{n}})^{\frac{n}{m}} = |x|$$

إذا كان m عددًا زوجيًا فإن :

يوجد شرط حل ولا يوجد قيمة مطلقة

$$(x^{\frac{m}{n}})^{\frac{n}{m}} = x$$

إذا كان m عددًا فرديًا فإن :

ملاحظة: مقام الأس النسبي هو دليل الجذر.



$$2(x - 2)^{\frac{2}{3}} = 50$$



أوجد مجموعة الحل:

مثال 2

a

$$2(x + 3)^{\frac{3}{2}} = 54$$



أوجد مجموعة الحل:

حاول ان تحل

b) $(1 - x)^{\frac{2}{5}} - 4 = 0$



(d) $(x + 1)^{\frac{3}{2}} - 2 = 25$

حل كلاً من المعادلات التالية:

كراسة التمارين



(j) $2(x - 1)^{\frac{4}{3}} + 4 = 36$



مُعَلِّمٌ كَوْنِي

إمتحان final

$$3(x - 5)^{\frac{4}{3}} = 48$$



$$2(x - 4)^{\frac{2}{5}} - 8 = 0$$



إمتحان final

مُعَلِّمٌ كَوِيْتٌ
صَبَّوْهُ: مِيَايِي

تذكر:

إذا كان $ab = 0$ فإن
 $a = 0$ أو $b = 0$

تذكر:

$a^0 = 1$ حيث $a \neq 0$

ليكن a عدد حقيقي حيث $a \notin \{-1, 0, 1\}$
 m, m عدنان صحيحان
 إذا كان $a^m = a^n$ ، فإن $m = n$

ثانياً: المعادلات الأسية

حل كلاً من المعادلات التالية:

حاول ان تحل

a $3^x = 243$

الحل

b $\left(\frac{1}{4}\right)^x = \frac{1}{128}$

الحل

c $\left(\frac{2}{3}\right)^x = \frac{81}{16}$

الحل

أوجد مجموعة حل كل معادلة من المعادلات التالية:

مثال

a $3^{x^2-1} = 27$

إمتحان final

b $7^{x^2-3x} = \frac{1}{49}$

الحل

c $6^{2x-8} = 1$

مُعَلِّمٌ كَوَيْتٌ
صَفْوَةُ مِي كَوَيْتٌ

حل كل معادلة من المعادلات التالية:

حاول ان تحل

a $5^{x^2-4} = 1$

b $3^{x^2+5x} = \frac{1}{81}$

إمتحان final

c $2^{x^2-4} = 32$



$6^{x^2-3x} = 1$

أوجد مجموعة حل المعادلة الآتية:-

$2^{(x^2-6)} = \frac{1}{32}$

إمتحان final

مُعَلِّمَاتُ
صَفْوَةُ مِيَايَا

حل كلا من المعادلات الأسية التالية :-

كراسة التمارين

(d) $3^{x^2-5x} = \frac{1}{9^2}$

(i) $(3^x - 27)(2^x - 1) = 0$

(g) $5^x = 125\sqrt{5}$

(j) $\left(\frac{2}{5}\right)^{x-1} = \left(\frac{125}{8}\right)^x$

إمتحان final

مجموعة حل $(\sqrt{x^{20}})^{\frac{1}{5}} - x^2 = 0$ هي :

(a) $\{0\}$

(b) $\mathbb{R}$

(c) $\mathbb{R}^+$

(d) $\mathbb{R}^-$

مجموعة حل : $\sqrt[3]{x-2} = \sqrt{x-2}$ هي :

(a) $\{2\}$

(b) $\{1, 2\}$

(c) $\{1, 2, 3\}$

(d) $\{2, 3\}$

(a)

(b)

مجموعة حل $7^{3-x} = 1$ هي $\{3\}$

تساعدنا القواعد التالية على تحديد مجال الدالة:

- 1 مجال الدالة كثيرة الحدود هو مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$.
- 2 مجال الدالة الحدودية النسبية هو مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ عدا مجموعة أصفار المقام.
- 3 مجال الدالة $f(x) = |x|$ هو مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$.
- 4 مجال الدالة $f(x) = \sqrt[n]{g(x)}$ حيث n عدد زوجي هو مجموعة الأعداد الحقيقية التي تحقق الشرط $g(x) \geq 0$.
- 5 مجال الدالة $f(x) = \sqrt[n]{g(x)}$ حيث n عدد فردي هو مجال الدالة g .
- 6 مجال الدالة $f(x) = g(x) \pm h(x)$ هو مجموعة الأعداد الحقيقية المشتركة بين مجالي الدالتين g, h .
أي أن $\text{مجال } f = \text{مجال } g \cap \text{مجال } h$.
- 7 مجال الدالة $f(x) = g(x) \cdot h(x)$ هو مجموعة الأعداد الحقيقية المشتركة بين مجالي الدالتين g, h .
أي أن $\text{مجال } f = \text{مجال } g \cap \text{مجال } h$.
- 8 مجال الدالة $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$ هو مجموعة الأعداد الحقيقية المشتركة بين مجالي الدالتين g, h عدا أصفار المقام $(h(x) \neq 0)$.
أي أن $\text{مجال } f = (\text{مجال } g \cap \text{مجال } h) / \text{مجموعة أصفار المقام}$.



أوجد مجال كل دالة ممايلي:-

مثال 2

a $f(x) = 2x^3 - 4x - \sqrt{2x - 6}$



b $f(x) = (2x^2 + x) \sqrt{8 - 2x}$



مُعَلِّمٌ كَوْنِي

صَفْوَةُ مَرْيَمِ الْكُوَيْتِ

c $h(x) = \frac{\sqrt[3]{1+x}}{x^2-1}$



d $u(x) = \frac{4}{\sqrt{-x}}$



a $f_1(x) = \frac{2x+5}{x-4}$



حاول ان تحل أوجد مجال كل دالة مما يلي:

b $f_2(x) = x^3 - 4x^2 - 4 + \sqrt{x-9}$



مُعَلِّمَاتُ
صَفْوَة مِي كَوَيْت

c

$$f_3(x) = \frac{\sqrt{5-4x}}{x^2+4}$$



d

$$f_4(x) = \sqrt[3]{\frac{x^2-5x}{x}}$$



أوجد مجال الدالة:-

إمتحان final

$$f(x) = \frac{\sqrt[3]{7-5x}}{x+2}$$



مُعَلِّمَاتُ
صَفْوَة مِي كُوَيْت

$$h(x) = \frac{\sqrt[3]{1+x}}{x^2-1}$$



إمتحان final

$$g(x) = \frac{\sqrt{2-x}}{x^2-4}$$



إمتحان final

$$f(x) = \frac{\sqrt{x-2}}{x-3}$$



إمتحان final

مُعَلِّمَاتُ الْكَوَيْتِ
صَفْوَةُ مِصْبُوح

$$f(x) = \frac{\sqrt{3+x}}{2x+6}$$



إمتحان final

في التمارين (5-1)، ظلل (a) إذا كانت العبارة صحيحة و (b) إذا كانت العبارة خاطئة.

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(1) مجال الدالة $f(x) = \sqrt{(x-2)^2}$ هو $\mathbb{R}$

(2) مجال الدالة $f(x) = \frac{3}{\sqrt{2x-6}}$ هو $[3, \infty)$

(3) مجال الدالة $f(x) = \sqrt{-x}$ هو $(-\infty, 0]$


(4) مجال الدالة $f(x) = \frac{1}{x^2} \sqrt{x+3}$ هو $[-3, \infty)$

(5) مجال الدالة $f(x) = |x| - 2$ هو $\mathbb{R}$


في التمارين (11-6)، ظلل رمز الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة.

(6) أيًا مما يلي لا يمثل بيان دالة:


(a)




(b)



(c)



(d)



(7) مجال الدالة $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+2x+1}$ هو:

(a) $\mathbb{R}$ (b) $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ (c) $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ (d) $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$

(8) مجال الدالة $f(x) = \frac{\sqrt{x^2}}{x}$ هو:

(a) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ (b) $[0, \infty)$ (c) $(-\infty, 0)$ (d) $(0, \infty)$

(9) مجال الدالة $f(x) = \frac{x-1}{x-\sqrt{x}}$ هو:

(a) $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ (b) $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ (c) $\mathbb{R} - \{0\}$ (d) $(0, \infty) \setminus \{1\}$

(10) مجال الدالة $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x+1}-1}$ هو:

(a) $(0, \infty)$ (b) $[1, \infty)$ (c) $(-1, \infty)$ (d) $[-1, \infty) \setminus \{0\}$

(11) لتكن $f(x) = x\sqrt{x}$, $g: [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$ فإن مجال الدالة $f \cdot g$ هو:

(a) $[-2, 2]$ (b) $[0, 2]$ (c) $(0, 2)$

(d) ليس أيًا مما سبق صحيحًا



الصورة العامة للدالة التربيعية هي:

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0$$

حد مطلق (ثابت) حد من الدرجة الأولى حد من الدرجة الثانية

تعريف الدالة الخطية:

الدالة $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = ax + b$$

$$y = ax + b \quad \text{أو}$$

حيث $a \in \mathbb{R}, a \neq 0$ و $b \in \mathbb{R}$ تسمى دالة خطية وبيانها خط مستقيم.

الدالة الخطية تكون من الدرجة الأولى

حدّد ما إذا كانت الدالة خطية أم تربيعية.

حاول أن تحل

a $f(x) = 2x(x - 3)$

c $f(x) = (2x + 3)^2 - 4x^2 - 7x$

b $f(x) = (x - 2)(2x + 1)$

d $f(x) = 3(x^2 - 4x) - 3x^2 + 4$

كراسة التمارين

في التمارين (1-5)، ظلّل (a) إذا كانت العبارة صحيحة وظلل (b) إذا كانت العبارة خاطئة.

(1) الدالة $f(x) = kx^2 + x - 3$, $k \in \mathbb{Z}$ يمكن أن تكون دالة خطية.(2) الدالة $f(x) = x + \frac{|x|}{x}$ هي دالة خطية.(3) النقطة $A(1, 6)$ تنتمي إلى منحنى الدالة: $f(x) = (3x)(2x) + 6$ (4) الدالة $y = x(1 - x) - (1 - x^2)$ هي دالة خطية.(5) الدالة $f(x) = \pi^2 - x$ هي دالة تربيعية.

في التمارين (6-10)، ظلّل رمز الدائرة الدال على الإجابة الصحيحة.

(6) الدالة التربيعية التي حدها الثابت يساوي -3 فيما يلي هي:

(a) $y = (3x + 1)(-x - 3)$

(b) $y = x^2 - 3x + 3$

(c) $f(x) = (x - 3)(x - 3)$

(d) $y = -3x^2 + 3x + 9$

(7) أي دالة مما يلي ليست دالة تربيعية:

(a) $y = (x - 1)(x - 2)$

(b) $y = x^2 + 2x - 3$

(c) $y = 3x - x^2$

(d) $y = -x^2 + x(x - 3)$

(8) أي نقطة مما يلي تنتمي إلى منحنى دالة $f(x) = 3x^2 - 5x + 1$ ؟

(a) (3, 12)

(b) (-1, -1)

(c) (2, 3)

(d) (-2, 22)

(9) تكون الدالة $f(x) = (a^2 - 4)x^2 - (a - 2)x + 5$ دالة تربيعية لكل a تنتمي إلى:

(a) $\mathbb{R}$

(b) $\mathbb{R} - \{-2, 2\}$

(c) $\mathbb{R} - \{2\}$

(d) $\mathbb{R} - \{-2\}$



استاذ نادر الصباغ

معادلة الدالة التي تمثل قطعاً مكافئاً رأسه $(0, 0)$ هي: $y = ax^2$
 لإيجاد قيمة a ، استخدم إحداثيات نقطة على المنحنى غير نقطة الرأس
 معادلة محور تماثل هذا القطع المكافئ هي $x = 0$



كل نقطة مما يلي تقع على قطع مكافئ رأسه نقطة الأصل.


اكتب معادلة تربيعية لهذا القطع المكافئ واذكر ما إذا كان بيانه مفتوحاً إلى أعلى أم إلى أسفل.

حاول أن تحل

a $E(4, 2)$



b $D(1, -5)$



2 البيان المقابل يمثل دالة: $y = ax^2$
 أوجد معادلة هذه الدالة.

حاول أن تحل



صِفْوَهْ مَعَالِكِي

معادلات بعض القطوع المكافئة بدلالة إحداثيات رؤوسها وخواصها


معادلة القطع المكافئ بدلالة إحداثيات رأسه (h, k) تكون على صورة $y = a(x - h)^2 + k, a \neq 0, h, k \in \mathbb{R}$

بعض خواص القطوع المكافئة

المعادلة على الصورة: $y = a(x - h)^2 + k$ ، هي دالة مكتوبة بدلالة إحداثيات الرأس، وهذه المعادلة تمدك بالمعلومات التالية:

- رأس المنحنى هو النقطة (h, k) ، ومحور التماثل هو الخط: $x = h$.
- تكون فتحة القطع المكافئ إلى الأعلى عندما تكون a موجبة، وتكون فتحة القطع المكافئ إلى الأسفل عندما تكون a سالبة.
- إذا كان $|a| < 1$ ، فإن الرسم سوف يكون أوسع من رسم الدالة: $y = x^2$.
- إذا كان $|a| > 1$ ، فإن الرسم سوف يكون أضيق من رسم الدالة: $y = x^2$.

مثال 3


في الشكل المقابل اكتب معادلة القطع المكافئ الذي رأسه $V(3, 4)$ ويمر بالنقطة $P(5, -4)$ 

صِفْوهُ: مَعَالِمُ الْكَوَيْتِ

حاول ان تحل

الحل

3 أوجد معادلة القطع المكافئ في الرسم المقابل

أكتب معادلة القطع المكافئ الذي رأسه $V(-3, 4)$ ويمر بالنقطة $P(-1, 0)$

إمتحان final

الحل


صِفْوَةٌ مَعَالِمِيَّةٌ

يمكن استخدام خصائص القطوع المكافئة لرسم بيان الدالة التربيعية

خطوات الرسم

- نوجد رأس القطع (h,k)
- نوجد معادلة محور التماثل. $X = h$
- نحدد فتحة القطع لافترى أم لاسفل
- نوجد نقطة على القطع بوضع $x=0$ ونوجد قيمة y
- نوجد انعكاس هذه النقطة على محور التماثل

مثال 4 _ ارسم منحنى الدالة: $y = 2(x + 1)^2 - 2$ مستخدمًا خواص القطوع المكافئة.




4 ارسم منحنى الدالة: $y = (x + 3)^2 + 1$.

حاول ان تحل





مُعَلِّمَاتُ
صَفْوَة مِي كَوَيْت



مثال 5

ارسم منحنى الدالة : $y = -0.5(x - 2)^2 + 3$ مستخدماً خواص القطوع المكافئة

إمتحانه final

حاول ان تحل 5 ارسم منحنى الدالة : $y = -2(x - 3)^2 - 1$ 

صِفْوَةٌ مَعَالِي كَوَيْتٍ

● إذا كانت النقطة (a, b) تنتمي إلى بيان دالة فإن النقطة (b, a) تنتمي إلى بيان معكوس هذه الدالة. ولكي ترسم معكوس الدالة بياناً اعكس الترتيب لكل زوج مرتب ينتمي لبيان الدالة.

● معكوس الدالة الخطية هو دالة خطية أيضاً

● مدى العلاقة r هو مجال معكوس هذه العلاقة ومجال r هو مدى معكوسها.

● المستقيم $y = x$ هو خط انعكاس لبيان S وبيان معكوسها.

ارسم بيان الدالة $y = \frac{x-4}{2}$ ومعكوسها ثم اكتب معادلة المعكوس.

مثال 1

الحد

1 ارسم الدالة $y = -3x + 5$ ومعكوسها، ثم اكتب معادلة المعكوس

حاول ان تحل

الحد

مُعَلِّمُ الْكُوَيْتِ
صَفْوَةُ مِي

طريقة أخرى لإيجاد معكوس الدالة جبريًا وهي التبديل بين متغيرات الدالة y و x ثم الحل بالنسبة إلى y .
إذا كانت الدالة تستخدم الرمز $f(x)$ عوض عن $f(y)$



انتبه

$$y = 5x - 4$$

أوجد معكوس الدالة

مثال 2



a $y = \frac{2x-1}{3}$



أوجد معكوس الدالة

حاول ان تحل

b $y = 2(x+1) - 3$



$f(x) = (x+3)^2 - 4$ أوجد معكوس الدالة



مُعَلِّمٌ مُتَمَيِّزٌ

كراسة التمارين

اكتب معادلة المعكوس - $y = \frac{x+5}{3}$ (7)



أوجد معكوس الدالة:

$$y = \sqrt[5]{x+3}$$



إمتحان final

$$f(x) = x^2 + 3$$

أوجد معكوس الدالة:



مثال 3

صِفْوَةٌ مَعَالِمُ الْكُوَيْتِ

$$y = 5x + 15$$

أوجد معكوس الدالة

إمتحان final

دوال الجذر التربيعي

المعادلة $y = \sqrt{x}$ دالة جذر تربيعي. مجالها $[0, \infty)$. والمدى هو $[0, \infty)$ لأن $y \geq 0$

$$y = \sqrt{x-h} + k$$

ينتج من إزاحة لبيان دالة المرجع $y = \sqrt{x}$ كالتالي:


- عندما تكون h, k موجبتين فإن الإزاحة تكون بعدد h من الوحدات يمينًا وعدد k من الوحدات إلى الأعلى.
- وعندما تكون h سالبة يزاح البيان إلى اليسار.
- وعندما تكون k سالبة يزاح البيان إلى الأسفل.

التركيز
يحول العلم لحيثيفة

ارسم الدالة: $y = \sqrt{x-4} - 2$ ، وعيّن المجال والمدى للدالة.

مثال 4

الحد



ارسم بيانًا: $y = \sqrt{x-2} + 1$

a

4

حاول ان تحل

عيّن المجال والمدى للدالة.


الحد

معلم الكويت

كراسة التمارين



ارسم كل دالة جذر تربيعي. ثم اذكر المجال والمدى. (14) $y = -\sqrt{x+3} - 2$



في التمارين (5-1)، ظلل (a) إذا كانت العبارة صحيحة و (b) إذا كانت العبارة خاطئة.

(1) إذا كانت النقطة $M(x, y)$ تنتمي لبيان الدالة f فإن النقطة $N(y, x)$ تنتمي لبيان معكوس هذه الدالة.

(a)

(b)

(a)

(b)

(2) إذا كانت $f(x) = x + 1, g(x) = x - 1$ فإن الدالتين كل منهما معكوس للأخرى.

(a)

(b)

(3) المستقيم $y = x$ هو خط انعكاس لبيان دالة f وبيان معكوسها.

(a)

(b)

(4) إذا مر بيان دالة بنقطة الأصل فإن بيان معكوسها يمر أيضًا بنقطة الأصل.

(a)

(b)

(5) لا يتغير مجال دالة الجذر التربيعي بعد إزاحة بيانها 3 وحدات يمينًا.

في التمارين (10-6)، ظلل رمز الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة:

(6) إذا انتمت النقطة $A(2, 3)$ إلى بيان دالة فإن النقطة التي تنتمي إلى بيان معكوس تلك الدالة هي:

(a)

 $(-2, 3)$

(b)

 $(2, -3)$

(c)

 $(3, -2)$

(d)

 $(3, 2)$

(7) بيان الدالة $y = \sqrt{x+2} - 2$ هو انسحاب لبيان الدالة $y = \sqrt{x}$:

(a)

وحدتين إلى اليسار ووحدين للأعلى

(b)

وحدتين إلى اليسار ووحدين للأسفل

(c)

وحدتين إلى اليمين ووحدين للأعلى

(d)

وحدتين إلى اليمين ووحدين للأسفل

(9) معكوس الدالة $y = 5x - 1$ هو:

(a)

 $y = 5x + 1$

(b)

 $y = \frac{x+1}{5}$

(c)

 $y = \frac{x}{5} + 1$

(d)

 $y = \frac{x}{5} - 1$

(10) مجال معكوس الدالة $y = \sqrt{x+3} - 1$ هو:

(a)

 $\mathbb{R}$

(b)

 $(-1, \infty)$

(c)

 $(-\infty, 1)$

(d)

 $[-1, \infty)$ 

مثال 1

أوجد مجموعة حل المتباينة:

$$x^2 - x - 6 < 0$$



مُعَلِّمٌ كَوْنِي

صَفْوَةُ مِي مَي

1 أوجد مجموعة حل المتباينة: $x^2 + 4x + 3 \leq 0$.

حاول ان تحل

إمتحان final



صِفْوَةٌ مَعَالِكِيَّة

إمتحان final

أوجد مجموعة حل المتباينة : $x^2 + 4x + 3 < 0$

مثال 2

أوجد مجموعة حل المتباينة: $-x^2 + 7x - 10 \leq 0$ 

$$-x^2 + 5x - 6 > 0$$

إمتحان final

2 أوجد مجموعة قيم x التي تحقق المتباينة: $-2x^2 + 5x - 3 > 0$ حاول ان تحل



صِفْوَةٌ مَعَالِمِيَّةٌ

$$2x^2 - 3x - 5 \geq 0$$

إمتحان final

إمتحان final

أوجد مجموعة حل المتباينة : $x^2 - 4 \geq 0$ 

إمتحان final

أوجد مجموعة حل المتباينة

$$x^2 - 7x - 3 \leq 5$$



مُعَلِّمٌ كَوَيْتٌ
صَبَّوْهُ بِمِيَاكِتِ

أوجد مجموعة حل المتباينة :

$$(x - 3)(2x + 5) > 0$$



إمتحان final

تطبيق على مجال الدالة

a أوجد مجال كل دالة مما يلي . $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$



مثال 4

مُعَلِّمُ الكَوَيتِ
صَفْوَةُ مِيَايِي

b $g(x) = \sqrt{-x^2 + 4x - 3}$



حاول ان تحل

أوجد مجال كل دالة مما يلي:

b

4

1 $h(x) = \sqrt{x^2 - x}$



مُعَلِّمٌ كَوْنِي
صَفْوَةُ مِيَايِي

2 $q(x) = \sqrt{9 - x^2}$



$$\frac{3x+7}{x+2} \geq 2$$

أوجد مجموعة حل المتباينة:

مثال 5



مُعَلِّمٌ كَوِيَّةٌ
صَبَّوْهُ: مِي مَي

حاول ان تحل

5

$$\frac{3x-5}{-2x+3} \geq 0 \text{ أوجد مجموعة حل المتباينة:}$$



$$\frac{x^2+5x}{x+3} > -2 \text{ أوجد مجموعة حل المتباينة:}$$

6

حاول ان تحل



مُعَلِّمٌ كَوْنِي

$$\frac{x^2 - 5x + 6}{x - 3} > 0$$



أوجد مجموعة حل المتباينة

مثال 7

$$\frac{x^2 - 49}{x + 7} \leq 0$$

أوجد مجموعة حل المتباينة: 7

حاول ان تحل



مُعَلِّمٌ كَوْنِي
صَفْوَةٌ مِيَاوِيَّةٌ

إمتحان final

$$\frac{2x+6}{x+2} \geq 0 \quad : \quad \text{أوجد مجموعة حل المتباينة}$$



$$\frac{x+3}{x+2} \geq 0$$

إمتحان final

$$\frac{3x+7}{x+2} \geq 0 \quad : \quad \text{أوجد مجموعة حل المتباينة}$$



إمتحان final

مُعَلِّمَاتُ الْكَوَيْتِ
صَفْوَةُ مِصْبُوح

إمتحان final

(a)

(b)

(1) $y = \sqrt{x^4}$ دالة قوى

(a)


(b)

(2) $y = x\sqrt{x}$ دالة زوجية

تكون دوال القوى على الشكل:

$y = ax^n, a \neq 0, n \in \mathbb{Z}^+$

الدالة الزوجية والدالة الفردية




تعريف

تكون الدالة $y = f(x)$ التي مجالها D دالة زوجية إذا وفقط إذا كان:

1 $\forall x \in D, -x \in D$

2 $f(-x) = f(x)$

في مستوى الإحداثيات، المحور الصادي هو محور تماثل (تناظر) لبيان كل دالة زوجية. فمثلاً: $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x^2, h(x) = x^4$ هما دالتان زوجيتان مجال كل منهما $\mathbb{R}$.



تعريف

تكون الدالة $y = f(x)$ التي مجالها D دالة فردية

إذا وفقط إذا كان:

1 $\forall x \in D, -x \in D$

2 $f(-x) = -f(x)$

في مستوى الإحداثيات نقطة الأصل هي نقطة تماثل

(تناظر) لبيان كل دالة فردية.

فمثلاً: $\forall x \in \mathbb{R}$ ، الدالة: $f(x) = x^3$ هي دالة فردية.

مثال 3

بين ما إذا كانت كل دالة مما يلي زوجية أو فردية أو ليست زوجية وليست فردية.

a $f(x) = 2x^7$

b $y = -x^8$

c $y = (x+2)^2$

d $h(x) = 4$

مُعَلِّمَاتُ الْكَوَيْتِ
صَفْوَةُ مَرْيَمُ الْكُوَيْتِ

حاول ان تحل

3

بين ما إذا كانت كل دالة مما يلي زوجية أو فردية أو ليست زوجية وليست فردية.

a $f_1(x) = x^5$

b $f_2(x) = x$

c $f_3(x) = 2x^4$

d $f_4(x) = (x + 3)^3$

معكوس العلاقة (r^{-1})

- إذا كانت علاقة r تربط عنصراً a من المجال بعنصر b من المدى، فمعكوس العلاقة يربط العنصر b بالعنصر a .
- إذا كان (a, b) عنصراً من العلاقة r فإن (b, a) هو عنصر من معكوس العلاقة r^{-1} .
- مجال معكوس العلاقة (r^{-1}) هو مدى العلاقة r .
- المستقيم الذي معادلته $y = x$ هو خط تناظر بين النقاط التي تمثل العلاقة r والنقاط التي تمثل معكوسها.



إمتحان نادر الصباغ

إمتحان final

- المستقيم الذي معادلته $y = x$ هو خط تناظر بين النقاط التي تمثل العلاقة r والنقاط التي تمثل معكوسها.

- إذا انتمت النقطة $A(2, 3)$ الى بيان دالة فإن النقطة التي تنتمي الى بيان معكوس تلك الدالة هي

a $(-2, 3)$

b $(2, -3)$

c $(3, -2)$

d $(3, 2)$

إمتحان final

إمتحان final

أوجد معكوس الدالة: $y = 5x^3$

5

أوجد معكوس الدالة: $y = 2x^4$

مثال 5

مثال 6

أوجد معكوس الدالة: $f(x) = \sqrt{x+2}$

6

أوجد معكوس الدالة: $f(x) = \sqrt{x-4}$

3-2 الدوال الحدودية

انتبه

تكون الدالة كثيرة الحدود في الصورة العامة

عندما تكون الحدود مرتبة تنازلي حسب درجة كل حد فيها

دالة كثيرة حدود

$$P(x) = 2x^3 - 5x^2 - 2x - 5$$

المعامل الرئيسي حد تكعيبي حد تربيعي حد خطي حد ثابت

مثال 1

اكتب كل كثيرة حدود بالصورة العامة ثم صنفها تبعاً للدرجة وعدد الحدود.

a $-7x + 5x^4$

b $5x^3 - (4x^2 + 5x^3) + 2x^2$

c $(2l - 5)(l^2 - 1)$

الحد

1 اكتب كل كثيرة حدود بالصورة العامة ثم صنفها تبعاً للدرجة وعدد الحدود.

a $4x - 6x + 5$

b $3x^3 + x^2 - (4x + 2x^3)$

c $6 - 2x^5$

حاول ان تحل

مثال

اكتب التعبير: $(x + 1)(x + 2)(x + 5)$ في شكل كثيرة حدود في الصورة العامة.

1 **حاول ان تحل** اكتب التعبير: $(x + 1)(x + 1)(x - 2)$ في شكل كثيرة حدود في الصورة العامة.



2 **حاول ان تحل** حلل كثيرة الحدود: $12x^3 - 12x^2 + 3x$ إلى عوامل



نظرية العامل

المقدار $(x - a)$ هو عامل خطي لكثيرة الحدود $\Leftrightarrow a$ صفر من أصفار كثيرة الحدود.

5 مثال اكتب دالة كثيرة حدود حيث أصفارها: 3, 3, -2 في الصورة العامة



c **حاول ان تحل 5** اكتب دالة كثيرة حدود في الصورة العامة حيث 3 صفر مكرر مرتين و 1- صفر بسيط.



3-4 قسمة كثيرات الحدود

القسمة المطولة

b $x - 8 \overline{) 2x^2 - 19x + 24}$

حاول ان تحل



اقسم:

مثال 1

a $x^2 + 6x + 8$ على $(x + 4)$



حاول ان تحل

2 تحقق ما إذا كان كل مقسوم عليه هو من عوامل المقسوم.

b $(x^3 - x + 1) \div (x + 1)$



تحقق ما إذا كان $(x + 4)$ عامل من عوامل كثيرة حدود باستخدام القسمة المطولة

b $x^3 + 64$



إمتحان final

القسمة التركيبية

مثال 3

استخدم القسمة التركيبية لقسمة $x^3 - 3x^2 - 6x + 8$ على $(x + 2)$ ثم أوجد باقي العوامل.

الحد

حاول ان تحل

3 a استخدم القسمة التركيبية لقسمة $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ على $(x + 2)$

b استخدم الإجابة في a لتحليل $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ إلى عوامل.

الحد

صِفْوَه مَعَالِكِي

حاول ان تحل

4

استخدم القسمة التركيبية لقسمة $x^3 + 4x^2 + x - 6$ على $(x + 1)$ 

نظرية الباقي

إذا قسمت كثيرة الحدود $f(x)$ من الدرجة $n \geq 1$ على $(x - a)$ حيث a ثابت، فإن باقي القسمة هو $f(a)$

إمتهان final

باستخدام نظرية الباقي أوجد باقي قسمة

مثال 7

 $f(x) = x^4 - 5x^2 + 4x + 12$ على $(x + 4)$

ثم تحقق باستخدام القسمة التركيبية.

استخدم نظرية الباقي لإيجاد باقي قسمة $f(x) = 2x^4 + 6x^3 - 5x^2 - 60$

7

حاول ان تحل

على $(x + 1)$ ، ثم تحقق من صحة الإجابة باستخدام القسمة التركيبية.

عن طريق

التحليل

التحليل بالتقسيم

الاصفار النسبية الممكنة

حل المعادلات بالتحليل

مثال 1

أوجد مجموعة حل المعادلة $3x^3 + 6x^2 - 9x = 0$ بالتحليل

الحل

حاول ان تحل

1

a

أوجد مجموعة حل المعادلة: $4x^3 - 16x^2 - 20x = 0$ بالتحليل.

الحل

حاول ان تحل

2

أوجد مجموعة حل كل معادلة مما يلي:

a $2x^3 = 3x - 5x^2$

الحل

b $x^3 - x^2 - 3x = 0$

الحل

مُعَلِّمَاتُ
صَفْوَةُ مِصْبُوحَاتِ

إمتحان final

التحليل بالتقسيم

a $x^3 + 3x^2 = x + 3$



أوجد مجموعة حل المعادلة:

مثال 3

b $x^3 - 3x = 6 - 2x^2$



3 أوجد مجموعة حل المعادلة: $x^3 + 2x^2 - 4x = 8$

حاول ان تحل

إمتحان final

مُعَلِّمَاتُ
صَفْوَة مِي كَوَيْت

أوجد مجموعة حل المعادلة $x^3 + 3x^2 - 4x - 12 = 0$ (11)

تظهر أهمية هذه النظرية إذا أردنا معرفة أصفار حدودية ولا يمكننا استخدام طريقة التحليل أو التقسيم.

الاصفار النسبية الممكنة

أوجد مجموعة حل كل من المعادلات التالية: $x^3 - 4x^2 + 3 = 0$ a

إمتحان final



صِفْوَةٌ مَعَالِكِيَّة

b $x^4 - 3x^3 + x^2 + 3x = 2$



صِفْوَةٌ مَعَالِكِيَّةٌ

1 $x^3 + x^2 - 4x - 4 = 0$

4 أوجد مجموعة حل المعادلة:

حاول ان تحل



إمتحان final

صِفْوَةٌ مَعَالِكِيَّة

كراسة التمارين

إمتحان final

استخدم الأصفار النسبية الممكنة لإيجاد مجموعة حل المعادلة :

$$x^3 - 3x + 2 = 0$$



أوجد مجموعة حل المعادلة :

كراسة التمارين

إمتحان final

$$x^3 - 7x + 6 = 0$$



مُعَلِّمُ الْيَوْمِ
صَبَّوْحَةُ مِي

إمتهان final

حل المعادلة : $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$ باستخدام نظرية الاصفار النسبية الممكنة

مُعَلِّمُ الْيَوْمِ

التركيز

يَحُولُ الْعِلْمَ لِحَقِيقَةٍ

الدالة: $y = ab^x$ (عدد ثابت)
(الأساس)


$$\forall x \in \mathbb{R}$$

$$a \in \mathbb{R}^*$$

$$b \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$$


تسمى دالة أسية.

تضاؤل أسّي



عندما تكون $0 < b < 1$ ، فإن الدالة تمثل
تضاؤلاً أسياً، وتكون b هي عامل التضاؤل.

نمو أسّي



عندما تكون $b > 1$ ، فإن الدالة تمثل
نموّاً أسياً، وتكون b هي عامل النمو.

مثال 1: مثل بياننا الدالة: $y = 2^x$. ثم بين ما إذا كانت الدالة تمثل نمواً أسياً أو تضاؤلاً أسياً وحدد العامل.

مثال 1

الحد


مُعَلِّمٌ كَوْنِيٌّ
صَفْوَةٌ مِي كَوْنِيَّةٌ

حاول ان تحل

1 مثل بيانياً كلّاً من الدوال التالية، ثم بين ما إذا كانت تمثل نمواً أسيّاً أو تضاعواً أسيّاً وحدد العامل.

a $y = 4(2)^x$

b $y = 3^x$



مثال 2

مثل بيانياً الدالة: $y = 4\left(\frac{1}{2}\right)^x$. ثم بين ما إذا كانت الدالة تمثل نمواً أسيّاً أو تضاعواً أسيّاً وحدد العامل.

الحل

مُعَلِّمُ الْكُوفَةِ
صَفْوَةُ مِيكَائِيلَ

حاول ان تحل

2

مثّل بيانيًا ثم بيّن ما إذا كانت الدالة تمثل نموًا أسيًا أو تضاعفًا أسيًا وحدّد العامل.



a

$$y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$$



مثال 4

اكتب دالة أسية: $y = a b^x$ يمر بيانها بالنقطتين: $P(2, 4)$ ، $Q(3, 16)$ 

حاول ان تحل

4

اكتب دالة أسية بالصورة $y = ab^x$ يمر بيانها بالنقطتين: $H(2, 4)$ ، $S(3, 16)$ 

مكتبة
صفيحة
مكتبة

التمثيل البياني للدوال الأسية



إيتا نادر الصباغ

نلاحظ أن بيان الدالة $y = b^{-x}$ حيث $b > 0$, $b \neq 1$ ينتج من انعكاس لبيان الدالة $y = b^x$ في المحور الصادي.

بيان الدالة $y = -b^x$ حيث $b > 0$, $b \neq 1$ ينتج من انعكاس لبيان الدالة $y = b^x$ في المحور السيني.

في التمارين (1-5)، ظلّل (a) إذا كانت العبارة صحيحة، و (b) إذا كانت العبارة خاطئة.

- | | | |
|-----|-----|--|
| (a) | (b) | (1) جميع الدوال الأسية على الصورة: $y = ab^x$ $a \neq 0$, $b > 0$, $b \neq 1$ متقاطعة. |
| (a) | (b) | (2) بيان الدالة $y = -2^x$ هو انعكاس في محور السينات لبيان الدالة $y = 2^x$ |
| (a) | (b) | (3) بيان الدالة $y = -(3)^x$ هو انعكاس في محور الصادات لبيان الدالة $y = -(3)^{-x}$ |
| (a) | (b) | (4) بيان الدالة $y = 3(5)^{x-2}$ هو انسحاب لبيان الدالة $y = 3(5)^x$ بمقدار وحدتين جهة اليمين. |
| (a) | (b) | (5) بيان الدالة $y = 3(2)^x$ يقطع جزءاً من محور الصادات قدره 3. |

التمثيل البياني للدوال الأسية

مثال 4 مثل بيانياً كل من: $y = 3^x$, $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ في نفس المستوى الإحداثي.



الحل

مُعَلِّمُ الْكَلِمَاتِ
صَفْوَةُ مِي كَوَيْت

حاول ان تحل

2 a

مثل بيانياً في نفس المستوى الإحداثي.

1 $y = -4(2)^x$


2 $y = 4(2)^x$

الحل



مثال 3 مثل بيانياً الدالة: $y_1 = 8\left(\frac{1}{2}\right)^x$ ومنها مثل بيانياً الدالة: $y_2 = 8\left(\frac{1}{2}\right)^x + 3$

الحل




مُعَلِّمٌ كَرِيمٌ
صَفْوَةُ مِي (أ) كَرِيمٌ

إمتحانه final

مثل بيانيا الدالة: $y_1 = 2^x$ ومنها مثل بيانيا الدالة: $y_2 = (2)^{x+3} - 2$


الحل



إمتحانه final

مستخدما دالة المرجع مثل بيانيا الدالة : $y = (3)^{x-3} + 1$

الحل



مُعَلِّمَاتُ
صَفْوَة مِيكَائِيل

إمتحان final

مثل بيانياً الدالة : $y = 2^{x-1} + 2$ مستخدماً دالة المرجع


الحل



إمتحان final

مستخدماً دالة المرجع مثل بيانياً الدالة الأسية التالية : $y = 3^x + 4$

الحل



مُعَلِّمَاتُ
صَفْوَة مِي كَوَيْت

تعريف

$$\forall y \in \mathbb{R}^+ , b \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$$

$$y = b^x \iff \log_b y = x$$

يتعين عدد حقيقي x بحيث يكون:

تدريب

أكمل الجدول التالي:

الصورة الأسية	الصورة اللوغاريتمية
$7^2 = 49$	$\log_7 49 = 2$
$10^3 = 1000$	$\log_{10} \dots = \dots$
$3^5 = 243$	$\log_3 \dots = \dots$
$4^{\dots} = \dots$	$\log_4 2 = \frac{1}{2}$
$\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$	$\log_5 \frac{1}{25} = -2$
$\dots$	$\dots$
$12^0 = 1$	

ملاحظة:

 $\log x$ هو اللوغاريتم المعتاد ذو الأساس 10 أي: $\log_{10} x$ تكتب $\log x$

فمثلاً: $\log_{10} 4 = \log 4$

الدوال اللوغاريتمية هي معكوسات الدوال الأسية.

كل من المنحنيين المرسومين انعكاس للآخر في الخط المستقيم $y = x$.

انتبه

التمثيل البياني للدوال اللوغاريتمية

تعريف: الدالة اللوغاريتمية

$$\forall x > 0 , b \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$$

$$f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \log_b x$$

فإن الدالة:

تسمى دالة لوغاريتمية أساسها b 

استأثر نادر الصباغ

مثال 4 أوجد مجال تعريف كل من الدوال التالية:

a $y = \log_5 (6x)$

b $f(x) = \log (3 - x)$

c $g(x) = \log_2 (x^2)$

d $h(x) = 4 \log_3 (5 - 3x)$

صَفْوَةُ مُعَالِمِي الْكُوَيْتِ

حاول أن تحل

4 أوجد مجال تعريف كل من الدوال التالية:

a $y = 2 + \log_5(x - 2)$

b $f(x) = \log_4(x^2 + 1)$

c $g(x) = \log_7(1 - x)$

كراسة التمارين

في التمارين (1-5)، ظلّل (a) إذا كانت العبارة صحيحة و (b) إذا كانت العبارة خاطئة.

- | | |
|-----|-----|
| (a) | (b) |
| (a) | (b) |
| (a) | (b) |
| (a) | (b) |
| (a) | (b) |

(1) إذا كانت $y = 3^x$ فإن $x = \log y$ (2) إذا كانت $\log_2(-y) = x$ فإن $y = 2^{-x}$ (3) إذا كانت $4^x = 5$ فإن $2x = \log_2 5$ (4) مجال الدالة $f(x) = \log(x^2)$ هو $\mathbb{R}$ (5) بيان الدالة $y = \log_3 x$ هو انعكاس في المستقيم $y - x = 0$ لبيان الدالة $y = 3^x$

في التمارين (6-11)، ظلّل رمز الدائرة الدال على الإجابة الصحيحة.

(6) معكوس الدالة $y = \log_2 x$ هو:

- | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| (a) $y = \log_x 2$ | (b) $y = x^2$ | (c) $y = 2^x$ | (d) $y = \log 2^x$ |
|--------------------|---------------|---------------|--------------------|


(7) مجال الدالة $y = \log|x - 1|$ هو:

- | | | | |
|------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| (a) $\mathbb{R}$ | (b) $\mathbb{R}^+$ | (c) $(1, \infty)$ | (d) $\mathbb{R}/\{1\}$ |
|------------------|--------------------|-------------------|------------------------|


(8) مجال الدالة $y = \log(x^2 + 1)$ هو:

- | | | | |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| (a) $\mathbb{R}$ | (b) $\mathbb{R}^+$ | (c) $[1, \infty)$ | (d) $(1, \infty)$ |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|

مثال 5

استخدم خواص الانعكاس لرسم بيان الدالة: $y = \log_2 x$ ومعكوسها.

5 حاول ان تحل استخدم خواص الانعكاس لرسم بيان الدالة: $y = \log_3 x$ ومعكوسها.



مُعَلِّمٌ كَوَيْتٌ
صَفْوَةٌ مِائِيَّةٌ




التمثيل البياني للدالة: $y = \log_b(x - h) + k$ هو انسحاب لبيان دالة المرجع: $y = \log_b x$ ، h وحدة أفقيًا، k وحدة رأسيًا.

مثال

ارسم بيان الدالة: $y = \log_6(x + 2) - 3$ مستخدمًا دالة المرجع.



إمتحانه final




6 ارسم بيان الدالة: $y = \log_3(x - 3) + 1$ مستخدمًا دالة المرجع.

حاوله تحل



مُعَلِّمَاتُ
صَفْوَة مِي كُوَيْت



خواص اللوغاريتمات



أَشْتَاكِي نَادِر الصَّبَاغ

$$\forall m, n, b \in \mathbb{R}^+, b \neq 1$$

$$\log_b m n = \log_b m + \log_b n$$

خاصية الضرب

$$\log_b \frac{m}{n} = \log_b m - \log_b n$$

خاصية القسمة

$$\log_b m^k = k \log_b m, k \in \mathbb{R}$$

خاصية القوى

ملاحظات:

$$① \log_b 1 = 0$$

$$② \log_b b = 1$$

$$③ \log_b b^m = m$$

حيث m, b عدنان حقيقيان موجبان $b \neq 1$

أعد كتابة كل مقدار لوغاريتمي مما يلي بصورة لوغاريتم واحد.

a

1

حاول ان تحل

$$① \log_5 2 + \log_5 6$$

$$② 3 \log_b 4 - 3 \log_b 2$$

$$③ 4 \log_3 2 - \log_3 5 + \log_3 10$$

مثال 2

أوجد مفكوك كل لوغاريتم مما يلي حيث x, y عدنان حقيقيان موجبان.

$$a \log_5 \left(\frac{x}{y} \right)$$

$$b \log(3x^4)$$

$$c \log \sqrt{\frac{25}{x}}$$

لحل معادلات أسية يمكننا أخذ لوغاريتم كل من طرفي المعادلة.

$$\forall a, b \in \mathbb{R}^+, m \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$$

$$a = b \Leftrightarrow \log_m a = \log_m b$$

حل معادلات أسية

مثال 1

$$7^{3x} = 20$$



حل المعادلة التالية، ثم تحقق:

1 حل كل معادلة مما يلي مقرباً إجابتك إلى أقرب جزء من ألف:

حاول ان تحل

a $3^x = 4$

b $6^x = 21$

c $3^{x+4} = 101$

حاول ان تحل

a $t^{\frac{7}{2}} = 128, t > 0$

b $\sqrt[3]{u^4} - 5 = 11, u > 0$

● لحساب اللوغاريتم لأي أساس موجب لا يساوي الواحد، يمكنك استخدام خاصية تغيير الأساس.

قاعدة تغيير الأساس

$$\forall m, b, c \in \mathbb{R}^+, b \neq 1, c \neq 1$$

$$\log_b m = \frac{\log_c m}{\log_c b}$$

استخدم قاعدة تغيير الأساس لإيجاد قيمة $\log_3 15$ ثم حوّل إلى لوغاريتم للأساس 2

مثال 3

الحل

أوجد قيمة $\log_3 400$ ثم حوّلها إلى لوغاريتم للأساس 8

a

3

حاول ان تحل

الحل

صِفْوَةٌ مَعَالِمُ الْكُوَيْتِ

حاول ان تحل

4

استخدم قاعدة تغيير الأساس لحل المعادلة: $7^{5x} = 3000$ 

حل معادلات لوغاريتمية

كل معادلة تتضمن تعبيراً لوغاريتمياً تسمى معادلة لوغاريتمية ووضعتها على الصورة:

$$\log_b y = x \quad \forall y, b \in \mathbb{R}^+, b \neq 1$$

ويكون حلها بما يحقق هذه الشروط لذا يتوجب إيجاد مجال التعريف (شرط الحل) أو التحقق من القيم الناتجة.

حل المعادلة: $\log(3x + 1) = 5$

مثال 5

حل المعادلة: $\log(7 - 2x) = -1$

5

حاول ان تحل



في بعض الحالات، عليك استخدام خواص اللوغاريتمات لتبسيط التعابير قبل حل المعادلة.

$$2 \log x - \log 3 = 2$$

حل المعادلة:

مثال 6



إمتحان final


حل المعادلة: $\log x^2 - \log 3 = 2$, $x \in (0, \infty)$

$$\log 6 - \log 3x = -2$$

6



حاول ان تحل



b $\log_2(x-1) - \log_2(x+3) = \log_2\left(\frac{1}{x}\right)$, $x \in (1, \infty)$ حل المعادلة:



مثال 7

إمتحان final

مُعَلِّمُ الْيَوْمِ
صَفْوَةُ مِي الْيَوْمِ

c $\log_{x+1} 32 = 5, x \in (0, \infty)$



7 أوجد مجموعة حل كل من المعادلات التالية:

حاول ان تحل

a $\log x^2 - \log(x^2 - x) = 1, x \in (1, \infty)$



إمتحان final

b $\log_4(x+6) - \log_4 12 = \log_4 2 - \log_4(x-4), x \in (4, \infty)$



مُعَلِّمَاتُ
صَفْوَة مِي كَوَيْت

كراسة التمارين

حل المعادلة : $\log_{(2x-1)} 49 = 2$, $x \in (1, \infty)$ 

إمتحان final

حل المعادلة : $\log_{2x-1} 49 = 2$, $x \in (\frac{1}{2}, \infty) \setminus \{1\}$

أوجد مجموعة حل المعادلة :

إمتحان final

 $\log(x) + \log(x-3) = \log 4$, $x \in (3, \infty)$

أوجد مجموعة حل المعادلة :

إمتحان final

 $\log(x+21) + \log x = 2$, $x \in (0, \infty)$ 

مُعَلِّمٌ كَرِيمٌ
صَبَّوْهُ بِمِائَةِ كَرَامَةٍ

أوجد مجموعة حل المعادلة :

$$\log (2x) + \log (x-3) = \log 8 \quad , \quad x \in (3, \infty)$$



كراسة التمارين

إمتحانه final

حل المعادلة التالية : $\log x - \log (x-1) = 1$ 

إمتحانه final

مُعَلِّمٌ لِكُلِّ تَلَامِيذٍ
صَبُوحٌ مِثْلِي

تدريب

أكمل ما يلي حيث $k, m, n \in \mathbb{R}^+$

1 $\ln(mn) = \dots$

(خاصية

2 $\ln \frac{m}{n} = \dots$

(خاصية

3 $\ln m^k = \dots$

(خاصية

4 $\ln e = \dots$

5 $\ln e^k = \dots$

6 $e^{\ln k} = \dots$



أستاذ نادر الصباغ

$8e^{2x} = 20$



استخدم اللوغاريتم الطبيعي لحل:

مثال 1

حاول ان تحل 1 استخدم اللوغاريتم الطبيعي لحل: $e^{4(x+1)} = 32$

مُعَلِّمُ الْكُتُبِ
صَفْوَةُ مِيَايَا

مثال 3

حل المعادلة:

$$\ln(3x + 5) = 4$$



3 حل كلاً من المعادلات التالية:

حاول ان تحل

a $e^{\frac{2x}{5}} + 7.2 = 9.1$



b $5 + \ln\left(\frac{x+2}{3}\right) = 7$



مُعَلِّمٌ كَوْنِي
صَفْوَةُ مِي كَوْنِي

مثال 4

$$7e^{2x} + 2.5 = 13$$



استخدم اللوغاريتم الطبيعي لحل

4 استخدم اللوغاريتم الطبيعي لحل المعادلتين التاليتين:

حاول ان تحل

a $e^{x+1} = 30$



b $2^{2x-3} + 4 = 7$



إمتحانه final

مُعَلِّمَاتُ الْكَوَيْتِ
صَفْوَةُ مِصْبُوح

حل المعادلة التالية : (20) $\ln(4x - 1) = 36$



إمتحان final

كراسة التمارين

$\ln(4x - 1) = 3$

حل المعادلة :



إمتحان final

حل المعادلة : $\ln(4x - 1) = 5$

إمتحان final

حل المعادلة : $\frac{1}{2} \ln x + \ln 2 - \ln 3 = 3, x \in (0, \infty)$



إمتحان final

كراسة التمارين

مُعَلِّمُ الْيَوْمِ
صَفْوَةُ مِيَايُوت

$$2e^{(3x-2)} + 4 = 16 \quad \text{حل المعادلة :}$$



كراسة التمارين

إمتحان final

$$9e^{2x} - 3 = 24 \quad \text{حل المعادلة:}$$



إمتحان final

$$\ln(x-1)^2 = 3 \quad \text{حل المعادلة:}$$




كراسة التمارين

مُعَلِّمٌ كَرِيمٌ
صَبَّوْهُ مِائِي كَوَيْتٍ


متجه الموضع

تعريف



القطعة الموجهة $\overrightarrow{OM}$ التي بدايتها نقطة الأصل ونهايتها $M(x, y)$ تسمى «متجه الموضع» ويمثلها الزوج المرتب (x, y)

تعريف



$\overrightarrow{AB}$ قطعة موجهة في المستوى الإحداثي

حيث $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$

متجه الموضع لهذه القطعة هو القطعة الموجهة $\overrightarrow{OM}$

حيث $M(x_B - x_A, y_B - y_A)$

ليكن: $A(1, -3)$, $B(2, 2)$, $C(2, 3)$, $D(-2, -1)$ 1

مثال 1

a عيّن الزوج المرتب الذي يمثل متجه الموضع لكل من: $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BD}$

b متجه الموضع $\overrightarrow{DC}$ يمثل القطعة الموجهة $\overrightarrow{KD}$. أوجد إحداثيات K



صِفْوَةٌ مَعَالِمُ الْكُوَيْتِ

تكافؤ قطعتين موجهتين تكون القطعتان الموجهتان متكافئتان إذا كان لهما نفس الطول ونفس الاتجاه

إذا كان $\vec{OM}$ متجه الموضع حيث (x_M, y_M) ، فيرمز لهذا المتجه بالرمز $\vec{M}$ ويكتب على الصورة $\vec{M} = \langle x_M, y_M \rangle$ وتسمى y_M مركبة المتجه $\vec{M}$ المركبة الأفقية (السينية)، x_M المركبة الرأسية (الصادية) للمتجه $\vec{M}$

2 إذا كانت $F(5, 13), E(3, 11), D(-2, -7)$

حاول ان تحل

فأوجد مركبات كل من المتجهات التالية: $\langle \vec{EF} \rangle, \langle \vec{ED} \rangle, \langle \vec{DE} \rangle$

الحل

طول (معيار) متجه واتجاهه

تعريف

لكل متجه $\vec{OM}$ متجه الموضع حيث، فيرمز للنسبة، والقياسي متجه $M(x_M, y_M)$ فيرمز $\vec{M}$ وكتب مركبتي x_M, y_M


لكل متجه $x, y \vec{U}$ = معيار (طول) $\vec{U}$ ، $\|\vec{U}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$ ويعطى بالعلاقة:

يحدد اتجاه المتجه $\vec{U}$ بالزاوية الموجبة θ التي يصنعها المتجه مع الاتجاه الموجب لمحور السينات حيث $360^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

إذا كانت α زاوية الإسناد للزاوية θ فإن:

$$\theta = \begin{cases} \alpha, & x > 0, y > 0 \\ 180^\circ - \alpha, & x < 0, y > 0 \\ 180^\circ + \alpha, & x < 0, y < 0 \\ 360^\circ - \alpha, & x > 0, y < 0 \end{cases}$$

وتحدد زاوية الإسناد α بالعلاقة: $\tan \alpha = \left| \frac{y}{x} \right|$



التكرير
يحول العلم ليحقيقه

أوجد معيار المتجه وقياس الزاوية θ التي يصنعها المتجه مع الاتجاه الموجب لمحور السينات.

a $\vec{m} = \langle 2, 2 \rangle$



b $\vec{n} = \langle -1, -2 \rangle$

c $\vec{p} = \langle -2, 3 \rangle$



d $\vec{q} = \langle 1, -4 \rangle$

مُعَلِّمٌ كَوَيْتٌ
صَبَّوْهُ بِرِيٍّ كَوَيْتٌ

إمتحان final

إذا كان المتجه $\vec{t} = \langle -1, -3 \rangle$ أوجد:(i) طول المتجه $\vec{t}$ (ii) قياس الزاوية θ التي يصنعها المتجه $\vec{t}$ مع الاتجاه الموجب لمحور السينات

الحل


مُعَلِّمٌ كَوِيْتٌ
صَبَّوْهُ بِمِيَاهِ الْيَمِينِ

تعريف

المتجه $\vec{U} = \langle x, y \rangle$ هو متجه وحدة إذا كان معياره يساوي الوحدة أي أن:

$$\|\vec{U}\| = \sqrt{x^2 + y^2} = 1$$

متجه الوحدة

فمثلاً $\langle 1, 0 \rangle$ ، $\langle 0, 1 \rangle$ ، $\langle -1, 0 \rangle$ ، $\langle \frac{4}{5}, \frac{3}{5} \rangle$ متجهات وحدة.المتجه $\langle 0, 0 \rangle$ هو متجه معياره صفر وليس له اتجاه معلوم ويرمز له بالرمز $\vec{0}$.لكل نقطة A في المستوى يكون $\vec{AA}$ متجهاً صفرياً.مثال 4 إذا كان $\vec{u} = \langle \frac{2}{\sqrt{5}}, y \rangle$ فأوجد قيمة y بحيث يصبح $\vec{u}$ متجه وحدة.4 إذا كان $\vec{v} = \langle x, \frac{12}{13} \rangle$ فأوجد قيمة x بحيث يصبح $\vec{v}$ متجه وحدة.

مُعَلِّمٌ لِكُلِّ
صَفْوَةٍ مِائِيَّةٍ

ليكن $\vec{u} = \langle x, 4 \rangle$, $\vec{v} = \langle 2, -3 \rangle$ اوجد قيمة x بحيث يكون $\|\vec{u}\| = 5$ units



ليكن: $\vec{A} = \langle x_A, y_A \rangle$, $\vec{B} = \langle x_B, y_B \rangle$
 $\vec{A} = \vec{B} \iff x_A = x_B, y_A = y_B$

تساوي متجهين

5 إذا كانت $A(0,1)$, $B(1,3)$, $C(3,6)$, $D(4,8)$ في المستوى الإحداثي فأثبت أن: $\langle \vec{AB} \rangle = \langle \vec{CD} \rangle$

حاول ان تحل



6 ليكن المتجهان $\vec{A} = \langle -2x+3, 4y-1 \rangle$, $\vec{B} = \langle -1, 3 \rangle$ حيث x, y عددا حقيقيان.

أوجد قيمتا x, y اللتين تحققان $\vec{A} = \vec{B}$.

حاول ان تحل



خواص

- 1 يكون للمتجهين غير الصفرين $\langle \overrightarrow{AB} \rangle$, $\langle \overrightarrow{CD} \rangle$ الاتجاه نفسه إذا وفقط إذا وجد عدد حقيقي موجب k يحقق $\langle \overrightarrow{AB} \rangle = k \langle \overrightarrow{CD} \rangle$
- 2 يكون للمتجهين غير الصفرين $\langle \overrightarrow{AB} \rangle$, $\langle \overrightarrow{CD} \rangle$ اتجاهين متعاكسين إذا وفقط إذا وجد عدد حقيقي سالب k يحقق $\langle \overrightarrow{AB} \rangle = k \langle \overrightarrow{CD} \rangle$
- 3 تكون النقاط A, B, C على استقامة واحدة إذا وفقط إذا وجد عدد حقيقي غير صفري k يحقق $\langle \overrightarrow{AB} \rangle = k \langle \overrightarrow{AC} \rangle$



$$\begin{aligned} \blacksquare \text{ المتجه } \langle \overrightarrow{BA} \rangle \text{ هو متجه معاكس للمتجه } \langle \overrightarrow{AB} \rangle \\ \blacksquare \langle \overrightarrow{AB} \rangle = -\langle \overrightarrow{BA} \rangle \end{aligned}$$

- 9 باستخدام خواص المتجهات أثبت أن النقاط $K(0, -1)$, $L(2, 3)$, $M(-2, -5)$ على استقامة واحدة.

حاول ان تحل



جمع المتجهات وطرحها

5-2

جمع المتجهات هندسيا لأي ثلاث نقاط في المستوى العلاقة: $\langle \overrightarrow{LM} \rangle + \langle \overrightarrow{MN} \rangle = \langle \overrightarrow{LN} \rangle$ علاقة شال.

a $\vec{L} = \langle \overrightarrow{AC} \rangle + \langle \overrightarrow{BA} \rangle + \langle \overrightarrow{CB} \rangle$ مثلث ABC أو جد:



مثال 3

b $\vec{K} = \langle \overrightarrow{AB} \rangle + \langle \overrightarrow{CA} \rangle + \langle \overrightarrow{BC} \rangle + \langle \overrightarrow{AB} \rangle$

حاول ان تحل

3

مضلع ABCD أوجد:

a $\langle \overrightarrow{AB} \rangle + \langle \overrightarrow{CD} \rangle + \langle \overrightarrow{BC} \rangle =$

b $\langle \overrightarrow{AD} \rangle + \langle \overrightarrow{CA} \rangle + \langle \overrightarrow{BC} \rangle + \langle \overrightarrow{DB} \rangle =$

مجموع متجهين جبرياً

تعريف

إذا كان $\vec{A} = \langle x_A, y_A \rangle$, $\vec{B} = \langle x_B, y_B \rangle$ متجهين في المستوى الإحداثي فإن مجموع هذين المتجهين هو المتجه $\langle x_A + x_B, y_A + y_B \rangle$ ويرمز له بالرمز $\vec{A} + \vec{B}$

أي أن: $\vec{A} + \vec{B} = \langle x_A + x_B, y_A + y_B \rangle$

حاول ان تحل

4

إذا كان $\vec{A} = \langle 4, -2 \rangle$, $\vec{B} = \langle -7, 5 \rangle$ فأوجد.

a $\vec{A} + \vec{B}$

b $3\vec{A} + 5\vec{B}$

مُعَلِّمٌ لِكُلِّ تَلَامِيذٍ



انتبه

$$\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B})$$

طرح المتجهات

■ المتجه $\langle \vec{BA} \rangle$ هو متجه معاكس للمتجه $\langle \vec{AB} \rangle$

$$\langle \vec{AB} \rangle = -\langle \vec{BA} \rangle$$

حاول ان تحل

5 $ABCD$ مضلع في المستوي. أوجد:

a $\langle \vec{AB} \rangle + \langle \vec{CD} \rangle - \langle \vec{AD} \rangle - \langle \vec{CB} \rangle$

b $\langle \vec{AB} \rangle - \langle \vec{AC} \rangle + \langle \vec{BC} \rangle + \langle \vec{AD} \rangle$

تعريف

إذا كان $\vec{A} = \langle x_A, y_A \rangle$, $\vec{B} = \langle x_B, y_B \rangle$ متجهين في المستوى الإحداثي فإن:

$$\langle \vec{A} - \vec{B} \rangle = \langle \vec{A} + (-\vec{B}) \rangle = \langle x_A - x_B, y_A - y_B \rangle$$

طرح المتجهات جبرياً

حاول ان تحل

6 إذا كان $\vec{A} = \langle -3, 0 \rangle$, $\vec{B} = \langle 5, -9 \rangle$ فأوجد:

a $\vec{A} - \vec{B}$

b $-3\vec{A} + 4\vec{B}$



الحل

مُعَلِّمَاتُ
صَفْوَة مَرْمَى الْكُوَيْت

قانون

إذا كان $\vec{A} = \langle x_A, y_A \rangle$, $\vec{B} = \langle x_B, y_B \rangle$ متجهين في المستوى الإحداثيفإن $\vec{A} \cdot \vec{B} = x_A \cdot x_B + y_A \cdot y_B$ فإذا كان: $\vec{A} = \langle x_A, y_A \rangle$ فإن $\vec{A} \cdot \vec{A} = x_A^2 + y_A^2 = \|\vec{A}\|^2$

نتيجة (1)

$$\vec{A} \neq \vec{0}, \vec{B} \neq \vec{0}$$

$$\vec{A} \perp \vec{B} \Leftrightarrow \vec{A} \cdot \vec{B} = 0 \quad \text{حيث}$$

مثال 3

إذا كانت $A(-2, -3)$, $B(1, 1)$, $C(-3, -1)$ هي رؤوس المثلث ABC .a اكتب كلاً من المتجهين $\langle \vec{CB} \rangle$, $\langle \vec{CA} \rangle$ بدلالة متجهي الوحدة $\vec{i}$, $\vec{j}$.b أوجد قيمة $\langle \vec{CA} \rangle \cdot \langle \vec{CB} \rangle$ c أثبت أن المثلث ABC قائم في $\hat{C}$

إمتحان final



صِفْوَةٌ مَعَالِيكَ

حاول ان تحل

3

إذا كانت النقاط $A(6, -1), B(3, 2), C(2, 1)$ a اكتب كلاً من المتجهين $\vec{BA}, \vec{BC}$ بدلالة متجهي الوحدة $\vec{i}, \vec{j}$ b أوجد قيمة $\vec{BA} \cdot \vec{BC}$ c أثبت أن المثلث ABC قائم في $\widehat{B}$

إنتهاء final



مثال 4

إذا كان $\vec{A} = \langle -2, 3 \rangle, \vec{B} = \langle 1, y \rangle$ وكان $\vec{A} \perp \vec{B}$ فأوجد قيمة y 

مُعَلِّمٌ كَوَيْتٌ
صَفْوَةُ مَرْيَمِ الْكَوَيْتِ

حاول ان تحل

4 إذا كان $\vec{A} = \langle 3, -1 \rangle$, $\vec{B} = \langle x, -2 \rangle$ وكان $\vec{A} \perp \vec{B}$ فأوجد قيمة x 

نتيجة (2)

$$\vec{A} \parallel \vec{B} \Leftrightarrow \vec{A} = k \vec{B} \quad \text{حيث } \vec{A} \neq \vec{0}, \vec{B} \neq \vec{0}$$

$$\vec{A} \parallel \vec{B} \Leftrightarrow x_A \cdot y_B - x_B y_A = 0 \quad \text{ملاحظة:}$$

$$\text{حيث: } \vec{A} = \langle x_A, y_A \rangle, \vec{B} = \langle x_B, y_B \rangle, \vec{A} \neq \vec{0}, \vec{B} \neq \vec{0}$$

- a أثبت أن: $\vec{A} \parallel \vec{B}$ حيث $\vec{A} = \langle -7, 5 \rangle$, $\vec{B} = \langle 14, -10 \rangle$
- b إذا كان $\vec{A} \parallel \vec{B}$ حيث $\vec{A} = \langle 6, -8 \rangle$, $\vec{B} = \langle 2, y \rangle$ فأوجد قيمة y

مثال 5



مُعَلِّمٌ لِكُلِّ تَلَامِيذٍ

صَفْوَةٌ مِمَّى لِكُلِّ يَوْمٍ

حاول ان تحل

- 5 a أثبت أن: $\vec{A} \parallel \vec{B}$ حيث $\vec{A} = \langle 3, -2 \rangle$, $\vec{B} = \langle 6, -4 \rangle$
- b إذا كان $\vec{A} \parallel \vec{B}$, $\vec{A} = \langle \frac{7}{3}, \frac{2}{3} \rangle$, $\vec{B} = \langle x, \frac{4}{5} \rangle$ فأوجد x



الحل

- 6 $\vec{A}, \vec{B}$ متجهان في المستوي، حيث $\|\vec{A}\| = 3, \|\vec{B}\| = 4, \vec{A} \cdot \vec{B} = 5$
- أوجد قيمة $(3\vec{A} - 2\vec{B}) \cdot (-\vec{A} + 3\vec{B})$

حاول ان تحل



الحل

مُعَلِّمَاتُ الْكَوَيْتِ
صَفْوَةُ مِصْبُوحٍ

قانون

قياس الزاوية بين متجهين

إذا كان $\vec{A}, \vec{B}$ متجهين وكان $\vec{A} \neq \vec{0}, \vec{B} \neq \vec{0}$ فإن:

$$\cos(\vec{A}, \vec{B}) = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{\|\vec{A}\| \cdot \|\vec{B}\|}, \quad 0^\circ \leq m(\vec{A}, \vec{B}) \leq 180^\circ$$

إذا كان $\|\vec{A}\| = 5, \|\vec{B}\| = 6, \vec{A} \cdot \vec{B} = 15$ فأوجد قياس الزاوية $(\vec{A}, \vec{B})$

مثال 7

إذا كان $\|\vec{A}\| = 3, \|\vec{B}\| = 2, \vec{A} \cdot \vec{B} = -3\sqrt{3}$ فأوجد قياس الزاوية $(\vec{A}, \vec{B})$

7

حاول ان تحل

أوجد قياس الزاوية المحددة بالمتجهين: $\vec{A} = \langle 2, 2\sqrt{3} \rangle, \vec{B} = \langle -4, 4\sqrt{3} \rangle$

مثال 8



مُعَلِّمٌ كَوَيْتٌ
صَفْوَةٌ مِائِي كَوَيْتٌ

حاول ان تحل

8

أوجد قياس الزاوية المحددة بالمتجهين: $\vec{A} = \langle 6, 3 \rangle, \vec{B} = \langle 3, -1 \rangle$ 

إمتحانه final

إذا كان $\vec{u} = \langle 2, 4 \rangle$, $\vec{v} = \langle x, -3 \rangle$ أوجد:قيمة x بحيث يكون $\vec{v}$ متعامد مع $\vec{u}$

إمتحانه final



مُعَلِّمٌ كَوِيَّةٌ
صَبَّوْهُ بِمِيَاهِ الْيَمِينِ

إمتحان final

إذا كان المتجه $\vec{t} = \langle -1, -3 \rangle$ أوجد:(i) طول المتجه $\vec{t}$ (ii) قياس الزاوية θ التي يصنعها المتجه $\vec{t}$ مع الاتجاه الموجب لمحور السينات

إمتحان final

أوجد قياس الزاوية المحددة بالمتجهين :

$$\vec{A} = \langle 2, 2\sqrt{3} \rangle, \vec{B} = \langle -4, 4\sqrt{3} \rangle$$



مُعَلِّمٌ كَوْنِي
صَفْوَةُ مِيَايِي

$$\vec{u} = \langle 0, 2 \rangle, \vec{v} = \langle 2, 2 \rangle$$

إذا كان :

إمتحانه final

$$\vec{u} \cdot \vec{v} \quad (3)$$

$$\|\vec{u}\| \quad (1) \quad \text{فأوجد :}$$

$$\vec{u}, \vec{v} \quad (4) \quad \text{قياس الزاوية بين المتجهين}$$

$$\|\vec{v}\| \quad (2)$$



$$\vec{A} = \langle 2, 3 \rangle, \vec{B} = \langle -1, 2 \rangle \quad \text{إذا كان}$$

إمتحانه final

$$(1) \quad 2\vec{A} + 3\vec{B}$$

$$(2) \quad \vec{A} \cdot \vec{B}$$

$$(3) \quad \|\vec{A}\|$$

فأوجد :



مُعَلِّمٌ كَرِيمٌ
صَفْوَةُ مَرْيَمُ

إذا كان: $\vec{A} = \langle -3, 4 \rangle$ ، $\vec{B} = \langle 0, 3 \rangle$ (1) أوجد $2\vec{A} - \vec{B}$ (2) أوجد الزاوية بين المتجهين $\vec{A}, \vec{B}$ 

كراسة التمارين

في التمارين (1-6)، ظلّل (a) إذا كانت العبارة صحيحة و (b) إذا كانت العبارة خاطئة.

- (1) إذا كان $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ ، فإن $\vec{u} \perp \vec{v}$ (a) (b)
- (2) إذا كان $\vec{u} \perp \vec{v}$ ، $\vec{u} = \langle -2, x \rangle$ ، $\vec{v} = \langle 5, 1 \rangle$ ، فإن $x = -10$ (a) (b)
- (3) إذا كان $\vec{u} \cdot \vec{w} = -5$ ، $\vec{v} \cdot \vec{w} = 3$ ، فإن $(\vec{u} - \vec{v}) \cdot \vec{w} = -8$ (a) (b)
- (4) إذا كانت $A(-1, 2), B(2, 3), C(-4, 5)$ ، فإن $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -6$ (a) (b)
- (5) إذا كانت $L(-3, 4), M(0, 5)$ ، فإن $\|\vec{LM}\| = 10$ (a) (b)
- (6) $\vec{A} = \langle 2, -3 \rangle$ ، $\vec{B} = \langle 1, 0 \rangle$ متجهان في المستوى حيث $\cos(\vec{A}, \vec{B}) = 2\frac{\sqrt{13}}{13}$ (a) (b)

في التمارين (7-14)، ظلّل رمز الدائرة الدال على الإجابة الصحيحة:

(7) إذا كان $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3$ ، $\vec{u} = \langle 2, -2 \rangle$ ، $\vec{v} = \langle -1, m \rangle$ ، فإن m تساوي:

علم الإحصاء

علم يهتم بجمع البيانات وفرزها وتنظيمها وتصنيفها وعرضها جدولياً أو بيانياً وتحليلها واستقراء النتائج بهدف اتخاذ قرارات مناسبة مبنية على استنتاجات.

مراحل البحث الإحصائي هي:

(١) جمع البيانات (٢) عرض البيانات "جدولي وبياني" (٣) وصف البيانات وتحليلها (٤) تفسير النتائج واتخاذ قرارات

مثال 1 في كل من المجتمعات الإحصائية التالية حدد نوع المجتمع (منته أو غير منته) ووحدة الدراسة.

a طلاب الصف الحادي عشر في مدارس دولة الكويت.

b الطيور على سطح الأرض.

حاوله تحل

1 في كل من المجتمعات الإحصائية التالية حدد نوع المجتمع (منته أو غير منته) ووحدة الدراسة.

a لاعبو فرق كرة السلة في دولة الكويت.

b مجتمع الأسماك في مياه الخليج العربي.

أساليب جمع البيانات

(١) الحصر الشامل: هو عملية جمع بيانات جميع مفردات المجتمع الإحصائي محل الدراسة

(٢) المعاينة: هي عملية اختيار جزء من مفردات المجتمع بطريقة مدروسة تجعل هذه المفردات تمثل المجتمع وتحقق أهداف الدراسة.

مثال 2 هل يمكن استخدام الحصر الشامل في دراسة المجتمعات الإحصائية التالية أم لا؟ اذكر السبب.

a دراسة كمية الدهون الموجودة في الدم.

b دراسة نسبة عدد الطلاب الذين لون عيونهم أزرق إلى عدد طلاب صفك.

أنواع البيانات

أنواع البيانات	الصفات	أمثلة
بيانات كمية	اسمية	لون العيون - لون الشعر
	مرتبة	المستوى العلمي - الدرجات التقديرية
بيانات كمية	متقطعة	عدد طلاب الفصل - نقاط مباراة كرة السلة
	مستمرة	أطوال القامات - الأوزان - درجات الحرارة

حدد نوع البيانات لكل مما يلي:

مثال 3

a عدد أهداف الدوري العام لكرة القدم في أحد المواسم.

b ترتيب الدول بحسب الميداليات التي حصلت عليها في دورة من دورات الألعاب الأولمبية.

c درجات الحرارة في شهر سبتمبر في مطار الكويت.

d لون سيارات معلمي مدرسة ما.

حاول ان تحل

3 حدد نوع البيانات في كل مما يأتي:

a عدد أعضاء فريق كرة القدم.

b الوظيفة (ضابط، محاسب، محام، تاجر، مدرس، ...)

c أطوال قامات طلاب الصف الحادي عشر.

d تقديرات الطلاب في مادة اللغة الإنجليزية في جامعة الكويت.

طرق جمع البيانات

■ الملاحظة والملاحظة ■ الاستبانة

■ البريد العادي أو البريد الإلكتروني ■ الهاتف المنزلي أو الهاتف النقال

■ المقابلة الشخصية ■ الوثائق والسجلات

■ الأبحاث التاريخية والأرشيف ■ قواعد البيانات

■ مواقع التواصل الاجتماعي

6-2 العينات

■ العينة العشوائية هي جزء من المجتمع الإحصائي يتم اختيارها عشوائيًا بطريقة علمية دون تحيز كي تمثل هذا المجتمع أفضل تمثيل

1- العينة العشوائية البسيطة

عدد العاملين في مؤسسة هو 90 موظفًا مرقمين من 1 إلى 90. يراد اختيار 7 موظفين لأداء فريضة الحج على نفقة المؤسسة ويتم اختيارهم بطريقة عشوائية. المطلوب سحب عينة عشوائية بسيطة باستخدام جدول الأعداد العشوائية ابتداءً من الصف السادس والعمود الرابع.

مثال

في إحدى المؤسسات التعليمية يوجد 80 طالبًا مرقمين من 1 إلى 80.

المطلوب سحب عينة عشوائية بسيطة حجمها 7 طلاب لدراسة بعض الأمور في المؤسسة باستخدام جدول الأعداد العشوائية ابتداءً من الصف الأول والعمود الثاني.

$$\frac{m}{n} = \frac{\text{حجم العينة}}{\text{حجم المجتمع الإحصائي}} = \text{كسر المعاينة}$$

2 - العينة العشوائية الطبقية

حجم العينة من كل طبقة = كسر المعاينة × حجم الطبقة المناظرة

لدراسة الأداء الوظيفي والكفاءة عند الموظفين في إحدى المؤسسات، تم سحب عينة عشوائية طبقية مكونة من 80 فردًا من أصل 1600 موظف موزعين كما يبين الجدول التالي:

إداريون	تقنيون وفنيون	عمال ومستخدمون	المجموع
100	300	1200	1600

مثال 2

إمتهاد final

ما حجم كل عينة عشوائية بسيطة مسحوبة من كل طبقة؟

الحل

مُعَلِّمُ الْكُتُبِ
صَفْوَةُ مِيكَائِيلَ

حاول ان تحل | لدراسة الأداء الوظيفي والكفاءة لدى الموظفين في أحد المصارف، تم سحب عينة طبقية مكونة من 7 أفراد من 35 موظفاً كما يبين الجدول التالي:

امتحان final

المجموع	مستخدمون	محاسبون ومدققون	مدراء أقسام
35	5	20	10



ما حجم كل عينة عشوائية بسيطة مسحوبة من كل طبقة؟

حاول ان تحل

3 في إحدى المستشفيات يوجد 80 إدارياً مرقمين من 1 إلى 80 ، 140 طبيباً مرقمين من 81 إلى 220 ، 240 ممرضاً مرقمين من 221 إلى 460، 40 عاملاً مرقمين من 461 إلى 500.

المطلوب سحب عينة عشوائية طبقية مكونة من 25 فرداً لدراسة كفاءة العاملين وذلك بتكوين عينات عشوائية بسيطة باستخدام جدول الأعداد العشوائية.



صِفْوَةٌ مَعَالِمُ الْكُوَيْتِ

$$\frac{\text{حجم المجتمع الإحصائي}}{\text{حجم العينة}} = \text{طول الفترة}$$

3- العينة العشوائية المنتظمة

إمتحان final

مثال 5

يبلغ عدد طلاب إحدى مدارس الكويت 700 طالب مرقمين من 1 إلى 700. أراد مدير المدرسة إرسال 10 طلاب لحضور ندوة حول «حماية الحيوانات المهددة بالانقراض». المطلوب سحب عينة عشوائية منتظمة حجمها 10 باستخدام جدول الأعداد العشوائية ابتداءً من الصف الثاني والعشرون والعمود الثالث.




حاول ان تحل

5 يبلغ عدد طلبة الصف الحادي عشر علمي في إحدى المدارس 140 طالباً مرقمين من 1 إلى 140. المطلوب سحب عينة عشوائية منتظمة حجمها 7 لزيارة إحدى دور المسنين وتقديم الهدايا لهم بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد باستخدام جدول الأعداد العشوائية ابتداءً من الصف السادس والعمود التاسع.




صِفْوَةٌ مَعَالِمُ الْكُوَيْتِ



من خواص المنحنى التوزيع الطبيعي:

- أن يكون على شكل ناقوس (جرس) متماثل حول المتوسط الحسابي.
- أن تتساوى فيه قيم المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال.
- أن ينحدر طرفاه تدريجيًا ويمتدان إلى ما لانهاية ولا يلتقيان مع المحور الأفقي أبدًا.

القاعدة التجريبية



حوالي 68% من البيانات تقع على الفترة $[\bar{x} - \sigma, \bar{x} + \sigma]$

حوالي 95% من البيانات تقع على الفترة $[\bar{x} - 2\sigma, \bar{x} + 2\sigma]$

حوالي 99.7% من البيانات تقع على الفترة $[\bar{x} - 3\sigma, \bar{x} + 3\sigma]$

امتحانه final

مثال 1

إذا كان المتوسط الحسابي لأرباح إحدى الشركات الصغيرة 350 دينارًا والانحراف المعياري 110 والمنحنى التكراري لأرباح هذه الشركة هو على شكل الجرس (توزيع طبيعي).

a طبق القاعدة التجريبية.

b هل وصلت أرباح الشركة إلى 690 دينارًا؟ فسّر ذلك.



صِفْوَةٌ مَعَالِكِي

حاول ان تحل

إمتحان final

1 لاحظت شركة تجارية أن المتوسط الحسابي لأرباحها 475 دينارًا بانحراف معياري 115 دينارًا.

a طبق القاعدة التجريبية.

b هل وصلت أرباح هذه الشركة إلى 750 دينارًا؟ فسر ذلك.



مثال 2

يعلن مصنع لإنتاج البطاريات المستخدمة في السيارات أن متوسط عمر البطارية من النوع (A) هو 60 شهرًا بانحراف معياري 10 أشهر. على افتراض أن المنحنى الممثل لتوزيع عمر البطاريات يقترب كثيرًا من التوزيع الطبيعي.

a طبق القاعدة التجريبية.

b أوجد النسبة المئوية للبطاريات من النوع (A) التي يزيد عمرها عن 50 شهرًا بفرض أن ما يعلنه المصنع صحيحًا.

c أوجد النسبة المئوية للبطاريات من النوع (A) والتي يقل عمرها عن 40 شهرًا بفرض أن ما يعلنه المصنع صحيحًا.



صِفْوَةٌ مَعَالِمُ الْكُوَيْتِ

حاول اءءء

2

يعلن مصنع لإنتاج المصابيح الكهربائية أن متوسط عمر المصباح الكهربائي من النوع (A) هو 700h بانحراف معياري 100h على افتراض أن المنحنى الممثل لتوزيع عمر المصابيح الكهربائية يقترب كثيراً من التوزيع الطبيعي.

a طبق القاعدة التجريبية.

b أوجد النسبة المئوية للمصابيح الكهربائية من النوع (A) التي يزيد عمرها عن 500h



إمتحاه final

إذا كان المتوسط الحسابي لأرباح إحدى المؤسسات الصناعية 1250 دينار والانحراف المعياري 225 دينار والمنحنى التكراري لهذه الأرباح هو على شكل الجرس (توزيع طبيعي) طبق القاعدة التجريبية

(2) هل وصلت أرباح هذه المؤسسة إلى 2000 دينار ؟



صِفْوَه مَعَالِكِي

$$z = \frac{x - \bar{x}}{\sigma}$$

قيمة المفردة - المتوسط الحسابي

الانحراف المعياري

= القيمة المعيارية

مثال 1

في أحد الاختبارات نال أحد الطلاب درجة 16 من 20 في مادة الرياضيات حيث المتوسط الحسابي 13 والانحراف المعياري 5 ونال أيضاً 16 من 20 في مادة الكيمياء حيث المتوسط الحسابي 14 والانحراف المعياري 4. ما القيمة المعيارية للدرجة 16 مقارنة مع درجات كل مادة؟ أيهما أفضل؟



- 1 حاول أن تحل
- جاءت إحدى درجات طالب في مادة الفيزياء 15 حيث المتوسط الحسابي 14 والانحراف المعياري 3.8 وفي مادة الكيمياء 15 حيث المتوسط الحسابي 13 والانحراف المعياري 7.8 ما القيمة المعيارية للدرجة 15 مقارنة مع درجات كل مادة؟ أيهما أفضل؟



صِفْوَةٌ مَعَالِمِ الْكُوَيْتِ

إمتحان final

مثال 2

في نتيجة نهاية العام الدراسي حصلت الطالبة ماضي على 64 درجة في مادة اللغة العربية حيث المتوسط الحسابي 69 والانحراف المعياري 8. وحصلت على 48 درجة في مادة الجغرافيا حيث المتوسط الحسابي 56 والانحراف المعياري 10



في أي المادتين كانت ماضي أفضل؟

إمتحان final

في نتيجة نهاية العام الدراسي نال أحد الطلاب على 15 درجة في مادة الرياضيات حيث المتوسط الحسابي للدرجات 13 والانحراف المعياري 2.5 ، ونال أيضا على 13 درجة في مادة الكيمياء حيث المتوسط الحسابي للدرجات 11.5 والانحراف المعياري 2.4



صِفْوَةٌ مَعَالِمِ الْكُوَيْتِ

جدول الأعداد العشوائية

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	28138	28596	04819	50138	12598	96878	55684	01488	58963	25896	36987	47856	20150	18965
2	01055	53625	47739	51063	08445	33254	22542	50954	73949	11945	29947	86107	35420	77076
3	79603	31075	71532	38497	08236	78411	18237	48743	81472	31761	49582	70411	64708	59416
4	79261	96010	82558	15977	15827	55768	29668	73188	65198	24483	16219	63827	05092	47495
5	00005	37153	07206	78041	09457	97003	49739	75180	74018	90951	96161	31749	23314	55471
6	59282	86004	13259	59537	75702	66287	77941	27095	46176	67215	93007	84125	89302	92843
7	20119	41234	01600	61772	57765	43965	60952	86606	47653	71502	85121	56804	03494	98302
8	67205	41113	34514	03273	95516	68365	79855	50202	66262	31348	37260	56557	15116	38645
9	06244	02595	08941	24615	92256	43007	05022	48195	91554	42525	30499	92203	70717	92685
10	46210	35683	67486	77091	58196	08010	54826	97006	76740	76343	93982	66126	91164	53560
11	80851	80252	02993	92649	12421	00480	53258	45140	57226	10428	36478	24600	01401	29179
12	74684	98726	87312	70956	49731	45504	70689	57849	77383	53581	05100	07629	04450	54826
13	82136	32120	31733	10371	01132	25110	67123	59517	89996	58905	75260	21509	87839	68376
14	73419	88893	89748	44745	46390	54781	31307	62656	69777	24494	91659	29133	46122	75769
15	66082	76594	77480	38397	64521	18712	50625	39027	39168	07835	13446	17758	19166	86050
16	72300	93912	87548	69024	17509	52647	64335	84663	79524	34618	72718	51651	10486	81509
17	46805	82648	27550	65291	27181	92637	13539	87601	15442	70131	62278	99491	41647	11029
18	59068	93270	15829	34926	46252	90487	92734	04850	90175	84906	46435	91518	86972	25705
19	63089	93954	30250	80347	81506	53768	75611	62054	89867	16083	45585	39555	96236	37875
20	54384	64888	28929	46575	08301	86288	52656	19225	65019	74795	25915	71637	49063	17695
21	41219	63211	39429	15290	78067	66741	08485	64653	87698	04983	47255	72768	90770	82930
22	20939	02271	71831	53134	73002	86087	98213	24484	08574	34915	03881	26259	83583	55337
23	66587	02998	73357	00128	97188	71660	47602	52022	28157	21602	30212	53762	94149	66526
24	71255	04641	38419	79552	62599	76281	10226	60287	16627	85028	41218	20667	63917	49254
25	08584	91510	57892	75011	49221	69960	90413	62400	23239	76854	66983	15964	70808	41341
26	31552	70340	48274	81006	74831	19177	49160	50762	89666	93535	12381	29770	33895	90381
27	02779	92197	83606	60964	65448	64964	19444	31357	16774	68021	46076	43831	09372	71527
28	22739	38348	29275	50087	91312	68984	37018	03447	05352	00798	61243	86397	98949	07622
29	21255	64526	97920	04791	77315	49905	74232	67222	89562	14683	81533	60057	31164	21824
30	95796	88317	77167	07879	03499	00804	27377	18693	75652	32509	38279	28588	16753	86119
31	75902	33821	35579	75020	78575	43912	99570	79216	04682	53316	95976	11938	56490	43868
32	36028	73731	05339	82203	22856	72459	00237	17627	50326	98629	71967	48402	61549	83717
33	06836	03795	80497	34107	29215	17117	69538	63274	96690	78884	38149	84592	67096	84551
34	35984	71052	01657	19690	99783	13513	37517	96508	49098	86592	10874	18125	00876	14549
35	87635	49443	55077	18157	20552	27316	12591	68157	34316	20447	53989	40096	69123	74210
36	41484	58832	43633	92072	54522	60783	05639	78371	20340	90174	90549	60250	80858	97632
37	65736	34031	37846	47294	50168	96397	50329	17390	04554	96190	02594	44229	24198	03064
38	16118	88260	28975	20036	77353	96179	08143	29222	57871	01292	52420	07130	11896	94088
39	62064	36947	31193	72328	10262	75428	50450	31620	17855	27018	75910	60965	39988	73389
40	23472	61332	48829	99113	90538	74066	38628	09270	72856	71411	78860	50745	42966	27424
41	05654	41781	99888	60787	56313	83221	82631	91989	32577	68175	24897	23456	16419	41727
42	83428	17512	78322	01942	42061	60659	32746	95367	20551	99885	79334	03732	97058	80356
43	65126	87369	56266	48697	33094	07522	92724	05676	91022	64262	24239	60242	01049	42945
44	28042	84729	34846	05880	34188	27048	30623	23204	05034	93136	19192	91674	47022	48523
45	53148	70847	48117	16103	83773	13224	76143	39148	06742	08298	52014	61711	79466	78334

تابع جدول الأعداد العشوائية

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	13560	38973	76536	54464	57626	10247	67051	83850	93002	30930	83842	09990	39203	85693
47	74560	04842	75720	98173	35124	18019	70681	73624	86300	76894	55504	20022	27144	03239
48	27449	10887	55047	76702	62587	20131	63452	96127	15802	65271	74663	37237	95812	19427
49	44413	47571	63342	67062	19900	42511	71024	44364	02775	41081	33177	09580	71047	33820
50	64512	50481	41107	21553	86471	16380	45959	16065	75195	31120	33822	43200	82566	43078
51	00095	29635	33618	55201	12075	97285	80296	92250	92579	69296	68423	91353	35553	77036
52	09638	68500	84152	55279	29481	48723	87785	06304	53198	79425	41344	87395	54720	72911
53	08589	28972	20500	26761	61852	87387	17967	50345	20479	37841	16337	88163	38585	02798
54	54883	36854	75468	31821	08464	13393	24322	56872	39507	16845	92039	13209	47035	57686
55	15444	18858	69256	81949	85766	20284	15914	76382	25665	84484	36409	87271	14949	12069
56	71565	25235	48604	04697	60513	89675	34337	06619	67509	03365	67431	43725	60359	33823
57	92871	06972	97272	98081	58945	98039	47815	55173	93203	03385	58309	47970	27985	73782
58	68849	33525	22034	44200	90628	39212	75363	00247	96303	51838	99956	34321	85809	87275
59	98827	81751	86350	27162	56861	00566	32360	52560	05152	97370	29229	98503	44100	59854
60	66803	20412	23097	36884	14158	51578	82839	04323	01877	91180	22403	31175	67942	14508
61	41516	62122	37492	78385	08100	01107	49028	80607	92813	75169	25796	12643	75026	04170
62	12162	72695	70213	28844	94220	04677	63128	96254	60006	42148	63974	24739	46064	93416
63	13274	51517	40925	25926	47062	06867	80018	43394	68316	19197	74832	95805	26126	29623
64	52918	26336	17452	70092	22425	68294	14624	12683	60030	18091	76824	45533	29768	59678
65	30361	58894	77995	22650	20266	21791	25773	37748	38058	73835	57440	33610	24749	56691
66	46377	07121	20251	41301	07635	66029	80470	25523	16429	40640	40041	79302	98712	95368
67	27423	28968	39623	90457	26780	14540	15082	90327	56459	77107	60727	26328	59556	93557
68	73886	44934	65197	86001	51613	92940	24998	35378	35732	05469	05791	07309	23107	37543
69	70336	30279	09961	58625	11044	73699	32481	85490	58333	12277	98355	86413	87883	23945
70	97903	34498	31282	11249	13179	41489	87962	89071	61922	02704	83626	67269	26568	09110
71	86205	97851	61543	40666	78098	05621	86072	21202	84985	65253	09306	56791	86227	73343
72	70718	31353	96295	21718	03495	83149	48733	21496	68430	91459	18409	86552	53261	30280
73	79073	05288	57087	27201	29661	08888	42984	96272	93656	50805	32057	36231	03532	64408
74	37479	85240	68508	36333	90080	46063	78129	96854	65844	71369	15432	66145	29223	87139
75	56009	81470	06181	98341	92406	61704	57770	28984	92858	88178	80042	83674	23736	64497
76	97012	75201	16764	31720	59414	81005	63959	15445	12347	71939	23651	29846	20962	77463
77	89839	94534	78223	94989	54376	61163	21914	19430	86856	38116	83201	10117	77879	04504
78	81048	37891	24924	18757	54550	54788	72430	24611	18643	55647	11806	78567	76679	58222
79	96743	96838	50696	57648	15325	72557	77193	50894	33206	44420	37986	84257	02031	65384
80	87649	00751	47483	48564	13103	20941	49793	68972	27994	75845	84616	37040	97110	95953
81	18173	87553	45854	18750	16506	57202	60428	61710	35887	19879	49893	04512	62556	63742
82	27613	72032	94334	38239	00395	05486	96365	01758	99314	41866	25760	74573	72169	25744
83	67517	04195	89100	21434	52923	90818	09206	19493	00233	62413	39127	76457	39419	35023
84	23574	88907	08133	85126	84643	94128	89259	18791	71035	84179	82500	92193	31383	34150
85	98721	90145	05695	14882	11827	56881	14143	68069	88481	08328	58607	81737	11660	96892
86	85556	83652	92934	55451	94792	45056	50732	83305	46303	37510	15539	52534	47250	75231
87	63282	48334	46961	05993	16605	63422	23375	44298	16226	10617	96722	42776	53376	94366
88	34033	36344	41107	77495	73985	79352	14844	44334	30781	16339	38031	28104	60054	05725
89	75567	31423	72507	48162	30150	44912	76250	12017	12136	47687	90279	67127	83889	87957
90	45101	69475	96924	76548	57756	14741	26052	42807	52824	61981	87866	35512	23771	43130

